

# Ail

Graminées annuelles, repousses de céréales, chiendent	<b>Agil</b>	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contre chiendent.
Dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	<b>Laguna</b>	3 l/ha	7	Application: pré-levée. Ne pas utiliser sur des sols sablonneux. <b>(SPe)</b>
Dicotylédones annuelles	<b>Lentagran</b>	2 kg/ha	56	2-3 semaines après le bouturage ou en post-levée jusqu'à BBCH 19. <b>(SPe)</b>
Cladosporiose, rouille, tache pourpre	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14	Max. 3 traitements par parcelle et année. <b>(SPe)</b>
Mildiou	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture avec le même groupe de matière active, (strobilurines). <b>(SPe)</b>
Thrips	<b>Audienz</b>	0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements par culture et année.
Pucerons, mouches blanches	<b>Piretro verde</b> 	2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements avec un intervalle de 7 jours. <b>(SPe)</b>
Pucerons, noctuelles, teigne, mouches mineuses, thrips	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	7 à 14 jours d'intervalle entre les traitements. Max. 2 traitements par culture. <b>(SPe)</b> Seulement avec autorisation spéciale.
Pucerons, thrips	<b>Siltac plus</b> 	0,15 %	7	2 à 3 traitements à des intervalle de 7 à 14 jours.
Inhibition de la germination	<b>Fazor</b>	3,5-4 kg/ha	14	Dès que les tiges commencent à verser au plus tard 30% à terre. Plus d'infos page 65.
Solution à base d'un extrait de bois de châtaigner.	<b>Dexa Pro</b>	4 l/ha		2-3 semaines après le bouturage ou en post-levée jusqu'à BBCH 19. <b>(SPe)</b>