




Cultures maraîchères

Maladies / Ravageurs		DA = Délai d'attente en jours
Asperges		Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.
Graminées annuelles, repousses de céréales, chiendent	Agil 0,75 - 2,5 l/ha	Après la période de coupe.
Dicotylédones et monocotylédones annuelles	Caravel 0,25 l/ha	Plantation en production: Après la période de récolte. Avant que les turions ne pointent.
Dicotylédones et monocotylédones annuelles	Caravel 0,25 l/ha	Jeunes plantations: pendant l'année de plantation. Avant que les turions ne pointent.
Herbicide dans les plantations récentes	Condoral SC 0,75 l/ha	Avant et après la récolte. (SPe)
Dicotylédones	Lentagran 2 kg/ha	Après la période de coupe.
Grillure estivale (stemphyliose), rouille de l'asperge	Bogard 0,5 l/ha	En été. Max. 4 traitements par année. (SPe)
Brûlure des feuilles de l'asperge, rouille de l'asperge	Diagonal 1 l/ha	Dans jeunes plantations ou plantations en production après la récolte. Max. 3 traitements.
Pourriture grise	Switch 0,1 kg/ha	Après la récolte. Max. 3 traitements.
Criocère de l'asperge, criocère à douze points de l'asperge, thrips	Audienz 0,2 l/ha	Après la récolte. Max. 3 traitements.
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde  2,5 l/ha	3 Max. 4 traitements par culture et année avec un intervalle d'au moins de 7 jours. (SPe)
Pucerons	Pirimor 0,5 kg/ha	Seulement après récolte. Max. 2 traitements.
Pucerons de feuillage, criocère à douze points de l'asperge, noctuelles terricoles ou vers gris, thrips, mouches mineuses	Techno 10 CS 0,1 l/ha	Après la récolte. Max. 2 traitements avec cette matière active. Seulement avec autorisation spéciale.
Noctuelles	XenTari   1 kg/ha	3 Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire.
Limaces	Amilon 5 5-7 kg/ha	Epandre après la levée.