



	Produkt				Anwendung	Hinweise		
	Brombeeren				WF = Wartezeit in Tagen	Bei Fungiziden und Insektiziden Basiswassermenge 1000 l/ha.		
	Himbeeren							
	Ribes-Arten							
	Schwarzer Holunder							
	Heidelbeeren							
Einj. Ungräser/Unkräuter	●	●	●		Galipan	2,5 l/ha	21	Im Frühjahr, vor dem Austrieb.
Einj. Ungräser/Unkräuter			●		Granat	2,5-6.25 l/ha	21	ausser Jostabeeren.
Einj. Ungräser, Quecke	●	●	●		Agil	0,75-2,5 l/ha		Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.
Ungräser, Unkräuter	●				Glifonex TF	2-10 l/ha		Einzelstockbehandlung
	●				Landmaster Supreme 480 TF	1,5-7,5 l/ha		
Winden		●	●		MCPB LG	0,4 % 4 l/ha		Nur Johannisbeere
Echter Mehltau			●		Diagonal	1 l/ha		Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	●	●			Diagonal	1 l/ha		Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	●	●			Cuproxat flüssig 	0,5-1,3 %		Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.
	●	●			Flowbrix 	0,25-0,6 %		
Blattfallkrankheit			●		Cuproxat flüssig 	0,25-0,75 %	21	Anwendung: Unmittelbar nach der Blüte und nach der Ernte.
			●		Flowbrix 	0,15-0,4 %	21	
Rost der Himbeere		●			Bogard	0,5 l/ha		Anwendung: Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Vor der Blüte und nach der Ernte. (GWS)
Echter Mehltau			●		Bogard	0,5 l/ha		
Echter Mehltau			●		Nimrod	0,1 %	14	Max. 5 Behandlungen. Nur Stachelbeeren.
Mondscheinigkeit			●		Diagonal	1 l/ha	21	Nur Johannisbeere
Mondscheinigkeit			●		Switch	0,1 % 1 kg/ha	7	Ausser Jostabeeren
Botrytis	●	●	●	●	Switch	1 kg/ha	14/7	Maximal 1 Behandlung pro Jahr. Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Rutenkrankheiten	●	●			Flint	0,2-0,5 kg/ha		Anwendung: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Roste	●	●			+ Penergetic p Reben	0,25 kg/ha 		
Zweig- und Beerenkrankheit			●	●	+ Vital  	1 l/ha		
Echter Mehltau			●					Ausgenommen Jostabeeren.
Graufäule (Botrytis cinerea)			●	●				
Mondscheinigkeit			●					Nur Stachelbeeren.
Falscher Mehltau	●				Booster	0,4 % 4 l/ha	21	Max. 2 Behandlungen.
Wurzelsterben		●			Booster	0,4 % 4 l/ha		Spritzen oder Giessen.
Blatffressende Raupen, Blattwespen, Frostspanner, Spanner, Thripse, Wanzen	●	●	●		Audienz 	0,02 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlung im Abstand von 7/10 Tagen.
Kirschessigfliegen	●	●	●	●	Audienz 	0,02 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Eulenraupen	●	●	●		XenTari  	0,1 % 1 kg/ha	3	Nur gegen junge Larvenstadien.
Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Spinnmilben			●		Spray Oil 7-E  	3,5 %		Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C).
Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse	●	●			Spray Oil 7-E  	3,5 %		Napfschildlaus hat beim Holunder keine Bewilligung.
Gallmilben	●	●			Celos 	2 % 1 %		Kurz vor dem Austrieb. Als 2. Behandlung bei starkem Befall nach Austrieb, bei 15-20 cm Trieblänge.
Blattläuse	●	●	●	●	Pirimor	0,04 %	21	Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C). (GWS)
Blütenstecher Himbeerkäfer		●			Techno 10 CS	0,02 %	21	(GWS) Anwendung: Vor der Blüte nach der Ernte. Giessen. Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)
		●			Techno 10 CS	0,01 %	21	
Spinnmilben (Eier und Larven)	●	●	●		Credo	0,04 %		
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	Siltac plus 	0,15 %		Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	Vista  	2 % 20 l/ha	7	Behandlung nach Bedarf wiederholen.