



	Produkt					Anwendung		Hinweise	
	Brombeeren							WF = Wartezeit in Tagen	
	Himbeeren								
	Ribes-Arten								
	Schwarzer Holunder								
	Heidelbeeren								
Einj. Ungräser/Unkräuter	•	•	•			Galipan	2,5 l/ha	21	Im Frühjahr, vor dem Austrieb.
Einj. Ungräser/Unkräuter			•			Granat	2,5-6.25 l/ha	21	ausser Jostabeeren.
Einj. Ungräser, Quecke	•	•	•			Agil	0,75-2,5 l/ha		Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.
Ungräser, Unkräuter	•					Glifonex TF	2-10 l/ha		Einzelstockbehandlung
	•					Landmaster Supreme 480 TF	1,5-7,5 l/ha		
Winden		•	•			MCPB LG	0,4 % 4 l/ha		Nur Johannisbeere
Echter Mehltau	•	•	•	•	•	Carbyc Pro	0,5-1%		Anwendung Stadium BBCH 12-89.
Echter Mehltau			•			Diagonal	1 l/ha		Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	•	•				Diagonal	1 l/ha		Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	•	•				Cuproxat flüssig	0,5-1,3 %		Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.
	•	•				Flowbrix	0,25-0,6 %		
Blattfallkrankheit			•			Cuproxat flüssig	0,25-0,75 %	21	Anwendung: Unmittelbar nach der Blüte und nach der Ernte.
			•			Flowbrix	0,15-0,4 %	21	
Rost der Himbeere		•				Bogard	0,5 l/ha		Anwendung: Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Vor der Blüte und nach der Ernte. (GWS)
Echter Mehltau			•			Bogard	0,5 l/ha		
Mondscheinigkeit			•			Diagonal	1 l/ha	21	Nur Johannisbeere
Mondscheinigkeit			•			Switch	0,1 % 1 kg/ha	7	Ausser Jostabeeren
Botrytis	•	•	•	•	•	Switch	1 kg/ha	14/7	Maximal 1 Behandlung pro Jahr. Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Rutenkrankheiten	•	•				Flint	0,2-0,3 kg/ha		Anwendung: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Roste	•	•				Penergetic p Reben + Vital	0,25 kg/ha 1 l/ha		
Zweig- und Beerenkrankheit			•	•					Ausgenommen Jostabeeren.
Echter Mehltau			•						Nur Stachelbeeren.
Graufäule (Botrytis cinerea)			•						
Mondscheinigkeit			•						
Falscher Mehltau	•					Booster	0,4 % 4 l/ha	21	Max. 2 Behandlungen.
Wurzelsterben		•				Booster	0,4 % 4 l/ha		Spritzen oder Giessen.
Blatrfressende Raupen, Blattwespen, Frostspanner, Spanner, Thripse, Wanzen	•	•	•		•	Audienz	0,02 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlung im Abstand von 7/10 Tagen.
Kirschessigfliegen	•	•	•	•	•	Audienz	0,02 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Eulenraupen	•	•	•		•	XenTari	0,1 % 1 kg/ha	3	Nur gegen junge Larvenstadien.
Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Spinnmilben			•		•	Spray Oil 7-E	3,5 %		Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C).
Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse	•	•		•		Spray Oil 7-E	3,5 %		Napfschildlaus hat beim Holunder keine Bewilligung.
Gallmilben	•	•				Celos	2 % 1 %		Kurz vor dem Austrieb. Als 2. Behandlung bei starkem Befall nach Austrieb, bei 15-20 cm Triebblänge.
Blattläuse	•	•	•	•	•	Pirimor	0,04 %	21	Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C). (GWS)
Blütenstecher		•				Techno 10 CS	0,02 %	21	
Himbeerkäfer		•				Techno 10 CS	0,01 %	21	(GWS) Anwendung: Vor der Blüte nach der Ernte. Giessen. Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)
Spinnmilben (Eier und Larven)	•	•	•		•	Credo	0,04 %		Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattsaugende Insekten	•	•	•	•	•	Siltac plus	0,15 %		
Blattläuse, Spinnmilben	•	•	•	•	•	Vista	2 % 20 l/ha	7	Behandlung nach Bedarf wiederholen.
Blattdünger	•	•	•	•	•	Hi-Grow	1 % 5 l/ha		Mischbar mit Fungiziden.