

Brachen und Stoppelfelder

Produkt	Anwendung	Hinweise
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Herbizide: Brache, Frässaaten, Mulchsaaten	Glifonex TF 2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.
Brache, Frässaaten, Mulchsaaten	Landmaster Supreme 480 TF 3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.
bei Winden, Blacken, Disteln	Dialen 0,5 l/ha	In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex TF oder 4 l/ha Landmaster Supreme. Letzte Anwendung Ende September.

Lein (Flachs)

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Herbizide: Unkräuter	Effican SG 1,1 kg/ha	Nachauflauf: im 2 - 4 Blattstadium der Unkräuter ab 5 cm der Kultur. (GWS)
Starterdünger	Level 2 0,8 l/ha 	5 cm Kulturhöhe. Mischbar mit Herbiziden.
Erdraupen	Techno 10 CS 0,075 l/ha	Nur mit Sonderbewilligung.

Wiesen und Weiden

Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha 		Mit Herbizid oder in Gülle.
Herbizide: a) Neusaaten	MCPB LG + Effican SG 2 l/ha 1,1 kg/ha	In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen. Keine Anwendung in Alexandriner und Perserklee. Ab 2-Blatt-Stadium des Klees.
Mit jungen Blackensämlingen	MCPB LG + Asulam LG 4 l/ha 1 l/ha	Keine Anwendung in Alexandriner und Perserklee. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Kleegrasmischungen	Lentagran 1 - 2 kg/ha	Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Luzerne	Effican SG 2 x 0,55 kg/ha	Splitbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen. (GWS)
Starterdünger	Level 2 0,8 l/ha 	Behandlung wenn Klee 4 echte Blätter hat. Mischbar mit Herbiziden.
b) Flächenbehandlung: Blacken	Asulam LG + Flüssigdünger 4 l/ha 4 l/ha	Anwendung Frühling und Herbst. Vor Bildung der Blütenstände. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Alpenblacken, Farne	Asulam LG + Flüssigdünger 6-8 l/ha 4 l/ha	Flüssigdünger fördert die Wirkung. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Blackensämlinge und andere breitblättrige Unkräuter	MCPB LG 4 - 6 l/ha	In Klee-gras-Neusaaten und Einsaaten vor 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt haben. Behandlung bei wüchsigem Wetter. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Disteln, Weisses Germer, Rumex-Arten	Duplosan KV Combi 2,5 - 3,25 l/ha	
c) Einzelstockbehandlung Blacken, Bärenklau, Kerbel, Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.	Blackex Mischverhältnis 1:2	Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und Spritzgeräten. Wartefrist: 3 Wochen, laktierende Tiere 2 Wochen.
Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer	Zwei 4-D 0,4 - 0,5 %	
Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter, Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln, Blacken.	Simplex 0,5-2,5 %	Rückenspritze/Handspritzgeräte, bis Ende August. Wartefrist: 3 Wochen.

Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV

Ackerkratzdistel, Stumpfblättriger Ampfer (Blacken), Gemeine Quecke, Winden	Glifonex TF Landmaster Spreme 480 TF 5 - 10 % 5 - 7,5 %	Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.
Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter, Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln, Blacken.	Simplex 0,5-2,5 %	Einzelstockbehandlung, bis Ende August. Wartefrist: 3 Wochen