




	Prodotti	Dosaggio	Osservazioni
<b>Campi incolti e stoppie</b>			
Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.			
<b>Erbicidi:</b> Maggese, prato, semina diretta	<b>Glifonex TF</b>	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 10 l/ha)
Maggese, prato, semina diretta	<b>Landmaster Supreme 480 TF</b>	3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 7,5 l/ha)
Convolvolo, romice, cardo	<b>Dialen</b>	0,5 l/ha	Unicamente in miscela con 5 l/ha Glifonex TF o 4 l/ha Landmaster Supreme 480 TF. Ultima applicazione a fine settembre.
<b>Lino</b>			
Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.			
<b>Erbicidi:</b> Dicotiledoni	<b>Effican SG</b>	1,1 kg/ha	In post-emergenza. Allo stadio 2-4 foglie delle malerbe a partire da 5 cm di altezza delle colture.
<b>Fertilizzante starter</b>	<b>Level 2</b>	0,8 l/ha 	5 cm di altezza delle colture. Miscibile con gli erbicidi.
Nottue terricole o vermi grigi	<b>Techno 10 CS</b>	0,075 l/ha	Solo con autorizzazione speciale.
<b>Prati e pascoli</b>			
<b>Erbicidi:</b> <b>a) Nuova semina</b>	<b>Azofix plus e Fosfix plus</b>	1-2 l/ha 	Mescolabile con gli erbicidi e liquame.
Nuova semina con romice giovane	<b>MCPB LG</b> <b>+ Effican SG</b>	2 l/ha 1,1 kg/ha	Nelle nuove semine, prima del primo taglio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche allattanti, 2 settimane per i bovini fuori dal periodo allattante.
Miscela trifoglio-graminacee	<b>MCPB LG</b> <b>+ Asulam LG</b>	4 l/ha 1 l/ha	Il trifoglio deve avere due foglie vere. Non utilizzarlo in gemme di trifoglio alessandrino e trifoglio persiana. Periodo di attesa: 3 settimane per bovine allattanti, 2 settimane per gli altri bovini.
Erba medica	<b>Lentagran</b>	1 - 2 kg/ha	In autunno, dopo l'ultima utilizzazione. Periodo di attesa: 3 settimane. 2 settimane per bovini fuori dal periodo di lattazione.
<b>Concime starter</b>	<b>Level 2</b>	0,8 l/ha 	5 cm di altezza della coltura. Mescolabile con gli erbicidi.
<b>b) Trattamento della superficie:</b>			
Romice	<b>Asulam LG</b> <b>+ Concime liquido</b>	4 l/ha 4 l/ha	Applicazione in primavera e autunno. Prima delle formazioni delle infiorescenze. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice alpino, felce	<b>Asulam LG</b> <b>+ Concime liquido</b>	4 l/ha 4 l/ha	Il concime liquido favorisce l'effetto. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice giovane e altri dicotiledoni annuali	<b>MCPB LG</b>	4 - 6 l/ha	Nelle nuove semine, prima del primo sfalcio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche con latte, 2 settimane per le mucche e i bovini fuori periodo di lattazione.
Specie di cardi	<b>Duplosan KV Combi</b>	2,5 - 3,25 l/ha	
<b>c) Trattamento pianta per pianta</b> Romice e malerbe a foglia larga. Ortiche, senecio jacobea.	<b>Blackex</b>	rapporto di miscelazione 1:2	Colorato in rosso. Trattare pianta per pianta. Periodo di attesa: 3 settimane per vacche con latte. 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Senecio tossico, veratro comune	<b>Deux 4-D</b>	0,4 - 0,5 %	
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giapponese, cardi vivaci, romici.	<b>Simplex</b>	0,5-2,5 %	Polverizzatore a spalla / apparecchio manuale, fino in agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.
<b>Superfici di compensazione della biodiversità</b>			
Cardi, romici dei tetti, agropiro comune, vilucchio.	<b>Glifonex TF</b> <b>Landmaster Supreme 480 TF</b>	5 - 10 % 5 - 7,5 %	Applicazione con apparecchio manuale senza polverizzatore a spalla.
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giapponese, cardi vivaci, romici.	<b>Simplex</b>	0,5-2,5 %	Trattamento pianta per pianta fino agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.