

## Cipolle / Scalogno

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

	Cipolle (condimento)	Cipolle vegetali	Erba cipollina	Scalogno			
	●	●	●	●	<b>Pendi</b>	2-3 l/ha	Prima della germinazione delle malerbe Diminuire la dose nei suoli leggeri. Profondità di semina minimo 3 cm.
Contro dicotiledoni	●	●	●	●	<b>Lentagran</b>	2 kg/ha	28 In post-emergenza a partire dallo stadio 3 foglie.
Contro graminacee annuali e gramigna	●	●	●	●	<b>Agil</b>	1 - 2,5 l/ha	56 2-2,5 l/ha contra gramigna.
Contro dicotiledoni e graminacee annuali	●	●	●	●	<b>Laguna</b>	3 l/ha	Pre-emergenza. Solamente nei bulbi piantati. (SPe)
Peronospora	●	●	●	●	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	14 Massimo 2 trattamenti all'anno. (SPe)
Botrite	●	●	●	●	<b>Switch</b>	1 kg/ha	14 Massimo 2 trattamenti all'anno. (SPe)
Marciume bianco della cipolla	●	●	●	●	<b>Switch</b>	1 kg/ha	1° trattamento allo stadio a 2 foglie 2° trattamento 3 settimane dopo (semina autunnale in primavera). (SPe)
Cladosporiosi, ruggine, macchie purpree	●	●	●	●	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14 Massimo 3 trattamenti all'anno (SPe)
Tripidi				●	<b>Audienz</b>	0,2 l/ha	7 Massimo 3 trattamenti per coltura/anno.
Mosca minatrice, tripidi	●	●	●	●	<b>Audienz</b>	0,4 l/ha	7 Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. (PSe)
Afidi, mosca bianca	●	●	●	●	<b>Piretro verde</b>	2,5 l/ha	3 Massimo 3 trattamenti per coltura. Trattare ad intervalli da 7 a 14 giorni. (PSe)
Afidi	●	●	●	●	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7 Non omologato nell'erba cipollina. (SPe)
Afidi delle foglie, nottue terricole, tignola del porro, mosca minatrice, tripidi	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14 Max. 3 traitements par culture. Trattare a intervalli di 7-14 giorni (PSe) Solo con autorizzazione speciale.
Contro gli insetti succhiatori	●	●	●	●	<b>Siltac plus</b>	0,15 %	Max. 3 trattamenti par coltura. Trattare ad intervalli di 7-14 giorni.
Nottue				●	<b>XenTari</b>	1 kg/ha	Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali a digiuno. (SPe)
Lumache	●	●	●	●	<b>Amilon 5</b>	7 kg/ha	Spandere sul terreno. Non sporcare le parti commestibili delle piante.
Campagnoli, talpe	●	●	●	●	<b>Campa</b> 1-5 cartucce / colonia		Chiudere bene le gallerie.
Anti-germinativo	●	●	●	●	<b>Fazor</b>	3,5-4 kg/ha	20-30% degli steli piegati. Per i dettagli vedere pagina 39 informazioni su Fazor.
	●	●	●	●	<b>Fetrilon-Combi 1</b>	1 kg/ha	Aggiungere alla poltiglia.
Vitalità e gestione dello stress	●	●	●	●	<b>Polygrün</b>	1 l/ha	2-3 trattamenti. Dallo stadio BBCH 14.
	●	●	●	●	<b>+ Vital</b>	1 l/ha	
	●	●	●	●	<b>+ Penergetic p</b> coltura orticole	0,1 kg/ha	
	●	●	●	●	<b>Azofix plus et Foxfix plus</b> 1 l/ha		