

Equip®

Foramsulfuron



- **Herbizid zur Bekämpfung von zahlreiche Ungräsern wie Hirsen, Ray-Gras und Unkräuter**
- **vorwiegend Blattwirkung, nach 2 Stunden regenfest**
- **sehr gute Verträglichkeit**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Wirkungsspektrum

Sehr gute bis gute Wirkung:

Acker-Fuchsschwanz, Ausfallgetreide, Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Flughafener, Gemeine Quecke, Gemeiner Windhalm, Hühnerhirse, Trespen, Italienisches Raygras, Acker-Senf, Acker-Vergissmeinnicht, Amarant-Arten, Echte Kamille, Einjähriges Bingelkraut, Hederich, Kleinblütiges Franzosenkraut, Klettenlabkraut, Rote Taubnessel, Schwarzer Nachtschatten, Vogelmiere, Vogel-Wicke.

Gute Wirkung bei günstigen Bedingungen:

Gabelblütige Hirse; Acker-Gänsedistel, Acker-Hellerkraut, Acker-Kratzdistel, Ausfallsonnenblume, Gänsefuss-Arten, Hirtentäschelkraut, Hundspetersilie, Pfirsichblättriger Knöterich, Ambrosia.



Produkteprofil

Formulierung: OD - Öldispersion

Wirkstoff: Foramsulfuron 2.34% (22.5 g/l)

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 07



GHS 09

Wirkungsweise

Equip® ist ein Nachauflauf-Herbizid für Moor- und Mineralböden mit hauptsächlich Blattwirkung zur Bekämpfung von zahlreichen Ungräsern und diverser Unkräuter in Maiskulturen. Der systemische Wirkstoff Foramsulfuron gehört zur chemischen Gruppe der Sulfonylharnstoffe (Aceto-Lactase-Synthese-Hemmer). Der enthaltene Safener (Isoxadifen-Ethyl) sichert eine gute Verträglichkeit gegenüber Maispflanzen. Equip® wird rasch durch die grünen Pflanzenteile aufgenommen und ist bereits nach zwei Stunden regenfest. Nach der Anwendung wird zuerst ein Wachstumsstillstand beobachtet und nach anfänglicher Verfärbung stirbt die Unkrautflora innerhalb von 3-5 Wochen langsam ab. Günstige Wachstumsbedingungen fördern die Wirkstoffaufnahme. Equip® kann sowohl alleine wie auch in Mischung mit anderen Herbiziden wie z.B. Temsa SC angewendet werden. Der Zusatz von Netzmittel oder Herbizidöl ist in der Regel nicht notwendig.

Anwendung

Mais: 1-2 l/ha gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Nachauflauf. Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Sortenempfindlichkeit gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin beachten.

Mais: 1-1.5 l/ha gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Nachauflauf. Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Niedrige Aufwandmenge nur in Tankmischung gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin. Sortenempfindlichkeit gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin beachten.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

Mischbarkeit

Equip® kann mit unseren Pflanzenschutzmitteln kombiniert werden.