Colture orticole

Leu+Gygax AG

Erbette da cucina

	Prezzemolo	Erba Cipollina	Basilico	Salvia	Aneto	Cumino			GA = Giorni di attesa	
Graminacee annuali	●						**Agil**	0,75-1,25 l/ha	21	In post-emergenza
Malerbe e graminacee annuali	●				●		**Caravel**	0,15 l/ha	90	In pre-emergenza, subito dopo la semina.
Malerbe e graminacee annuali		●				●	**Goltix 700 SC**	2-4,5 l/ha	40	Trattamento split
Malattie fungine delle foglie, alternaria, septoriosi, ticchiolatura	●	●	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	21	Massimo 3 trattamenti per parcella e per anno.
Alternaria, septoriosi, ruggine	●	●					**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Funghi patogeni del suolo [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●	●	●	●	●	●	**Prestop**	500 g/m^3		Prima della semina o dell'impianto, possono essere mescolati al substrato.
Elmintosporiosi	●	●	●	●	●	●	**Quiz Pro** 0,225 %	+ **Magna Bon** 1		2 trattamenti per avviare la coltura.
Peronospora delle erbette	●	●	●	●	●	●	**Revus**	0,6 l/ha	7	Max. 1/6 trattamenti per parcella e anno.
Crisomelidi, mosca minatrice, tripidi, altiche, Nottue terricole o vermi grigi,	●	●	●	●	●	●	**Audienz**	0,02% 0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Afidi, mosche bianche	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde**	1,5 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Afidi della foglia	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Insetti succhiatori	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,1-0,15 l/ha		Ripetere a distanza di 5-7 giorni.
Afidi, altiche, nottue terricole o vermi grigi, tignola del porro, mosca minatrice, psilla della carota, tripidi	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura. Solo con autorizzazione speciale.
Afidi (afidi tubolari), ragnetto	●	●	●	●	●	●	**Vista**	2 % 20 l/ha	7	Applicare secondo le necessità, se necessario ripetere.
Nottue	●	●	●	●	●	●	**XenTari**	1 kg/ha	3	Non applicare in condizioni di freddo. Solo sui giovani stadi larvali.
Limacce del genere Deroceras, Limacce del genere Arion	●	●	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Non sporcare le parti di piante commestibili.
Talpidi (fam.) Campagnoli	●	●	●	●	●	●	**Campa**	1-5 cartucce/colonia		Chiudere bene le gallerie.
Rinforzamento delle piante	●	●	●	●	●	●	**Fence N**	1,5-3 l/ha		Utilizzare allo stadio BBCH 12-49.
Concime con mangesio	●	●	●	●	●	●	**Olimag**	0,4-0,8 %		Utilizzare allo stadio BBCH 12-49.
Fertilità del terreno	●	●	●	●	●	●	**Penergetic b**	0,3-0,5/ha		Prima della semina o trapianto.
Salute dei vegetali	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p legumi**	0,1 kg/ha		Ripetere più volte.
Salute dei vegetali	●	●	●	●	●	●	**Vital**	1 l/ha		Microorganismi effettivi.
Stimolatore biologico	●	●	●	●	●	●	**HBR**	1-2 l/ha		Riduce lo stress climatico.
Umate di potassio organico	●	●	●	●	●	●	**LiqHumus 18**	35 l/ha		Forma l'humus.
Riduzione dello stress per i primi afidi	●	●	●	●	●	●	**Pidel**	4 l/ha		Applicazione: al primo avvistamenti di afidi
Stimolatore bio	●	●	●	●	●	●	**Polygrün**	1,5-3 l/ha		Estratti di alghe.
Concime fogliare	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,4 %		Concime a base di calcio.
Concime fogliare	●	●	●	●	●	●	**Kickstart**	0,1 l/ha		Oligo-elementi.