

Konserven- und Eiweisserbsen

Vor der Saat

Voraufbau

Keimblatt -
2-Blatt
10-123-4 Blatt
13-14Bildung
Blütenknospen
51-59Hülsenbildung
71-79

Hinweise



Unkrautbekämpfung

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich)

Laguna
3 l/haEffican SG 0,8 -1,1 kg/ha
+ Pendi 0,9 l/ha

Laguna 1 l/ha

Splitbehandlung möglich. (GWS)

Laguna nur in Eiweisserbsen einsetzen. (GWS)

Einjährige Unkräuter und Ungräser

Caravel 0,25 l/ha

Nur in Erbsen mit Hülsen.

Voraufbau und Nachaufbau
Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)

Bolero 1 l/ha

Bolero 1 l/ha + Effican SG 1,1 kg/ha

Im Nachaufbau mischbar mit Effican SG. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen. (GWS)

Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln

MCPB LG 4 l/ha

Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen.
Mischbar mit Effican SG.

Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke

Agil 1 - 2,5 l/ha

Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospe **Quecke 1,75-2,5 l/ha.**

Blattdüngung

Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Graufäule

Diagonal 1 l/ha

Eiweisserbse: max. 2 Behandlungen im Abstand von 8-12 Tagen.
Wartefrist: 2 Wochen.

Brennfleckenkrankheit, Graufäule, Sclerotinia-Fäule

Switch 1 kg/ha

Erbsen: max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 10 Tagen.
Wartefrist: 2 Wochen.

Schädlinge

Schnecken

Amilon 5 5-7 kg/ha

Eulenraupen, Erbsenwickler

Rapid 1,5 kg/ha

Erbsenwickler, Erdräupen

Techno 10 CS 0,075 l/ha

Blattläuse

Pirimor 0,15 kg/ha

Siltac plus 0,15 %



Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)

Wassermenge 500-800 l/ha. Anwendung: Nur bei trockenem Wetter. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.

Blatrfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse

Audienz 0,2 l/ha

Nur in Erbsen mit Hülsen.

Eulenraupen, Erbsenwickler

Piretro Verde 2,5 l/ha

In Erbsen, Wartefrist: 3 Tage. (GWS)

Erbsenwickler, Erdräupen

XenTari 1 kg/ha



In Erbsen mit Hülsen, Wartefrist: 3 Tage.

Kartoffelkäfer [auf Ausfallkartoffeln]

Gepard 0,1 kg/ha

In Erbsen ohne Hülsen, Wartefrist: 14 Tage.

Starter und Booster

Für starke Wurzelbildung in Erbsen und Soja

Penergetic p Gemüse 100 g/ha + Vital 1 l/ha

Level 2 0,8 l/ha oder Kickstart 0,15 l/ha

Mischbar mit Herbiziden.