




















Buschbohnen

WF = Wartezeit in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	Nachauflauf mischbar mit Effican SG. Splitbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich. Im Keimblatt oder Unkräuter. Splitbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Bestände spritzen. (GWS) Vorauslauf Vorauslauf unmittelbar bis 2 Tage nach der Saat.
Vorauslauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)	Bolero	1 l/ha		
Einjährige Unkräuter	Effican SG	2 x 0,4 kg/ha		
Einjährige Gräser und Unkräuter	Frontier X2	1,2-1,4 l/ha		
Einjährige Gräser und Unkräuter	Caravel + Frontier X2	0,25 l/ha 0,9 l/ha		
Bohnenrost, Brennflecken	Flint	0,04 % 400 g/ha	3	Bei Befallsbeginn oder bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Stadium 13-79 (BBCH).
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit	Flowbrix 	2 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	Cuproxtat flüssig 	4 l/ha	21	
Braunfleckenkrankheit, Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule	Switch	0,5-0,8 kg/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
	Diagonal	1 l/ha	14	
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse Eulenraupen	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7	Mit Sonderbewilligung. (GWS) im Gewächshaus. im Freiland.
	XenTari  	1 kg/ha	3	
Blattläuse, Thripse	Siltac plus 	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro Verde 	2,5 l/ha	3	(GWS)
Wachstumsförderung	AminoPower plus 	1-3 l/ha		Mischbar mit Fungiziden und Insektiziden.
Wachstumsförderung	HBR 	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.

Fenchel

Einjährige Gräser und Unkräuter	Laguna	2 l/ha	70	gesät gepflanzt
Unkräuter, Ungräser	Pendi	1,5-2l/ha		Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.
Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	gesät: Vorauslauf bis 2 Tage nach Saat. gepflanzt: Unmittelbar nach Pflanzung
Einjährige Gräser und Unkräuter	Caravel	0,25 l/ha	60	
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	Ab Befallsbeginn. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. (GWS)
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau der Doldenblütler	Diagonal	0,25 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Falscher Mehltau der Doldenblütler	Revus + Quiz  	0,6 l/ha 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Mit Sonderbewilligung. (GWS)
Blattläuse, Thripse	Siltac plus 	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattfressende Raupen, Erdraupen, Eulenraupen (blattfressend), Minierfliegen, Thripse	Audienz 	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen.
Eulenraupen (blattfressend)	XenTari  	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Wachstumsförderung	HBR 	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.
Bormangel	Micro Bor  	1-3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	Basfoliar Combi STIPP 	3 l/ha		2 - 3 mal.