











Fenouil

Mono et dicotylédones annuelles	Laguna	2 l/ha	90	semé avant la plantation / pré-levée (SPe) 70 planté
Mauvaises herbes et graminées	Pendi	2-4 l/ha		
Graminées annuelles	Agil	1 l/ha	28	Sitôt après le semis ou avant la plantation. En sols légers dosage faible.
Mono et dicotylédones annuelles	Caravel	0,25 l/ha	60	
Cercospora, ramulariose, tache des feuilles	Bogard	0,5 l/ha	14	Max. 3 traitements par parcelle et année, dès le début de l'attaque. (SPe) 7 Max. 3 traitements par culture. 14 Max. 3 traitements avec un intervalle de 7-10 jours.
Cercospora, ramulariose, tache des feuilles, mildiou des ombellifères	Diagonal	1 l/ha	7	
Mildiou des ombellifères	Revus + Quiz  	0,6 l/ha 1 l/ha	14	
Pucerons, noctuelles terricoles ou vers gris, mouches mineuses, psylle de la carotte, mouche de la carotte, thrips	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Seulement avec autorisation spéciale. (SPe) Veiller à bien mouiller.
Pucerons, thrips	Siltac plus 	0,1 l/ha		
Chenilles défoliatrices, noctuelles terricoles ou vers gris, Noctuelles (défoliatrices), mouches mineuses, thrips.	Audienz	0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements avec un intervalle de 7 jours au minimum. 3 Max. 4 traitements avec un intervalle de min.7 jours.
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	
Noctuelles (défoliatrices)	XenTari  	1 kg/ha	3	Ne pas utiliser par temps froid. Efficace seulement sur jeunes stades larvaire.
Stimulation de la croissance	HBR 	1 l/ha		Récolte plus hâtive, contre le stress lié au
Anti-carentiel B	Micro Bor  	1-3 l/ha		Répéter si nécessaire.
Anti-carentiel Ca et oligo-éléments	Basfoliar Combi STIPP 	3 l/ha		2 - 3 fois.