








Féveroles		avant le semis	Pré-levée	Cotylédons 2 feuilles 10-12	3-4 feuilles 13-14	Apparition boutons floraux 50-59	Formation des gousses 70-79	Notes
Herbicides		Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.						
Prélevée et postlevée. Adventices et graminées (spécialement amarantes et morelles noires).				Bolero 1 l/ha				En pré-levée. Miscible avec Frontier X2.
Mono et dicotylédones annuelles				Frontier X2 1,2-1,4 l/ha	+ Caravel 0,25 l/ha			
Mono et dicotylédones annuelles				Laguna 3 l/ha				(SPe)
Graminées annuelles, millets, ray-grass, repousses de céréales, chiendent.				Agil 1 - 2,5 l/ha				Application dès l'apparition de la première vraie feuille de la culture jusqu'à la formation des boutons floraux. Chiendents 2-2,5 l/ha.
Ravageurs				Amilon 5 5-7 kg/ha				Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
	Limaces			Techno 10 CS 0,075 l/ha				Seulement avec autorisation spéciale. (SPe)
	Noctuelles terricoles							
	Pucerons					Pirimor 0,15 kg/ha		Intervention après contrôles. Ménage les auxiliaires. (SPe)
Effarouchement				Penergetic b VV 0,7 kg/ha 				Réduit les dommages causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.
				Penergetic b WV 0,6 kg/ha 				
Engrais starter et booster				Polygrün 1-5 l/ha 		Polygrün Blüte 1-2 l/ha 		
Pour des racines fortes dans les pois et le soja				Level 2 0,8 l/ha 				
				Penergetic p grandes cultures 100 g/ha 		+ Vital 1 l/ha 		1-2 traitements.