


Finocchio			GA = Giorni di attesa	
Mono e dicotiledoni annuali	Laguna	2 l/ha	90	seminato
Malerbe e graminacee	Pendi	2-4 l/ha	70	piantato
Graminacee annuali	Agil	1 l/ha	28	Subito dopo la semina o il trapianto. Terreni leggeri
Mono e dicotiledoni annuali	Caravel	0,25 l/ha	60	dosaggio inferiore.
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	seminato: in pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. piantato: subito dopo il trapianto.
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau der Doldenblütler	Diagonal	1 l/ha	7	Dall'inizio dell'attacco. Massimo 3 trattamenti per parcella e anno, (SPe)
Falscher Mehltau der Doldenblütler	Revus	0,6 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura.
	+ Quiz Pro	1 l/ha		Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, nottue terricole o vermi grigi, mosca minatrice, psilla della carota, mosca de la carota, tripidi	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Solo con autorizzazione speciale. (SPe)
Afidi, tripidi	Siltac plus	0,1 l/ha		Cercare di bagnare bene le piante.
Larve defogliatrici, nottue terricole o vermi grigi, nottue (defogliatrice), mosca minatrice, tripidi.	Audienz	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7 giorni.
Afidi, mosca bianca	Piretro verde	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti a intervalli di 7 giorni.
nottue (defogliatrice)	XenTari	1 kg/ha	3	Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali giovani.
Stimolazione della crescita	HBR	1 l/ha		Contro lo stress da freddo.
Carenza di boro	Micro Bor	1-3 l/ha		Ripetere se necessario.
Carenza di calcio e oligo-elementi	Basfoliar Combi STIPP	3 l/ha		2 - 3 volte.

Siltac Plus

Soluzione innovativa per il controllo dei parassiti nelle coltivazioni di bacche, ortaggi, frutta, viti e piante ornamentali, nonché nella silvicoltura.



Audienz

Insetticida biologico contro i parassiti nelle coltivazioni di bacche, frutta, viti, campi, ortaggi e piante ornamentali.

