

		GA = Giorni di attesa
Finocchio		
Mono e dicotiledoni annuali	Laguna 2 l/ha	70 seminato prima del trapianto/pre-levata (SPe) piantato Subito dopo la semina o il trapianto.
Malerbe e graminacee	Pendi 1,5-2l/ha	
Graminacee annuali	Agil 1 l/ha	28 seminato: in pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina.
Mono e dicotiledoni annuali	Caravel 0,25 l/ha	60 piantato: subito dopo il trapianto.
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie	Bogard 0,5 l/ha	14 Massimo 3 trattamenti per parcella e anno, Dall'inizio dell'attacco. (SPe)
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie, peronospora delle ombrellifere	Diagonal 0,25 l/ha	7 Massimo 3 trattamenti per coltura.
Peronospora delle ombrellifere	Revus + Quiz 0,6 l/ha 1 l/ha	14 Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, nottue terricole o vermi grigi, mosca minatrice, psilla della carota, mosca de la carota, tripidi	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14 Solo con autorizzazione speciale. (SPe)
Afidi, tripidi	Siltac plus 0,1 l/ha	Cercare di bagnare bene le piante.
Larve defogliatrici, nottue terricole o vermi grigi, nottue (defogliatrice), mosca minatrice, tripidi.	Audienz 0,2 l/ha	7 Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, mosca bianca	Piretro verde 2,5 l/ha	3 Massimo 4 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
nottue (defogliatrice)	XenTari 1 kg/ha	3 Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali a digiuno.
Stimolazione della crescita	HBR 1 l/ha	Contro lo stress da freddo.
Carenza di boro	Micro Bor 1-3 l/ha	Ripetere se necessario.
Carenza di calcio e oligo-elementi	Basfoliar Combi 3 l/ha	2 - 3 volte.
Porri		
Erbicida dopo la piantagione	Spark 2 kg/ha	Massimo 1 trattamento per coltura. (SPe)
	Lentagran 2 kg/ha	28 a partire dallo stadio 3 foglie.
Malerbe, ricacci di cereali, gramigna	Agil 1 - 2,5 l/ha	56 2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Malerbe e graminacee	Pendi 2-4 l/ha	Porri seminati. In pre-emergenza.
Malerbe e graminacee	Pendi 4-5 l/ha	Porri trapiantati. Prima del trapianto.
Cladosporiosi, ruggine, macchie purpuree	Bogard 0,5 l/ha	14 Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria spp. Phytophthora spp.	Diagonal 1 l/ha	14 Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria, cladosporiosi dei porri, fitoftoria del porro, ruggine dei porri.	Flint 0,4 kg/ha	14 Massimo 2 trattamenti allo stadio BBCH 41 - 49.
Mosca minatrice, nottue terricole o vermi grigi, afidi delle foglie, tignola della cipolla, tripidi.	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14 Trattare a intervalli di 7-14 giorni. Massimo 3 trattamenti con questa materia attiva. (SPe). Solo con autorizzazione speciale.
Tignola della cipolla	XenTari 1 kg/ha	7 La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Insetti succhiatori	Siltac plus 0,15 %	
Tignola della cipolla	Audienz 0,2 l/ha	7 Massimo 3 trattamenti per coltura. (SPe)
Mosca minatrice, tripidi	Audienz 0,4 l/ha	7 Massimo 4 trattamenti per parcella/anno/coltura. (SPe)
Afidi, mosca bianca	Piretro verde 2,5 l/ha	3 Massimo 4 trattamenti per colture e anno. Trattare a intervalli di 7 giorni. (SPe)
Migliora la crescita.	Azofix plus 1,5 l/ha	Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Migliora la crescita.	Fosfix plus 1,5 l/ha	Aumenta il fosforo disponibile per le piante.

SPe = Prestazione delle acque (consultare tabella pagina 61 a 67)