

Radies, Rettich, Meerrettich, Speisekohlrüben

	Radies	Rettich	Meerrettich	Speisekohlrüben		WF = Wartefrist in Tagen	
Einj. Unkräuter/Ungräser				●	Caravel 0,25 l/ha		Voraufbau, unmittelbar bis 3 Tage nach der Saat.
Herbizid nach der Saat	●	●			Rapsan 500C 1 l/ha		Speziell in Sommerkultur im Freiland. (GWS)
Falscher Mehltau, Weisser Rost (Teilw.)	●				Bion 30-60 g/ha	7	Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze				●	Diagonal 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze Falscher Mehltau, Rost	●	●	●		Diagonal 1 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattfleckenpilze	●	●	●	●	Flowbrix 2,6 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Weisser Rost			●		Mildicut 4 l/ha	14	Max. 4 Behandlungen. Ab Beginn des Dickenwachstums.
Falscher Mehltau			●		Revus 0,6 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) (GWS)
Falscher Mehltau	●	●			Revus 0,6 l/ha	14	Max. 6 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) (GWS)
Echter Mehltau	●	●	●	●	Carbyc Pro 1% 4 kg/ha	1	Mehrmalige Anwendungen.
Alternaria	●	●	●	●	Sambesi Pro 4 l/ha		Mehrmalige Anwendungen.
Blattkrankheiten	●	●	●	●	Quiz Pro 1,5 l/ha		Mehrmalige Anwendungen.
Blattläuse Spinnmilben	●	●	●	●	Vista 2 %		Pflanzen allseitig gut benetzen.
Thripse	●	●	●	●	Ortiga Pro 3 l/ha		Mehrmalige Anwendungen.
Blattfressende Raupen	●			●	Audienz 0,2 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	●	●	Piretro verde 2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlung im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	Pirimor 0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	Siltac plus 0,1-0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Thripse, Minierfliegen, Blattläuse	●	●	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	Vista 2 %	7	Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●	●		●	XenTari 1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Schnecken	●	●	●	●	Amilon 5 5-7 kg/ha	7	Ab Keimblatt streuen.
Maulwürfe, Wühl- oder Schermaus	●	●	●	●	Campa 1-5 Gaspatronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.
Kastanienholzekstrakt	●	●	●	●	Dexa Pro 3 l/ha		
Magnesiumsulfatlösung	●	●	●	●	Olimag 3 l/ha		Mehrmalige Anwendungen.
Algenextrakt mit Schwefel	●	●	●	●	Pidel 1% 4 l/ha		Anwendung im Abstand von 7-10 Tagen.
Düngung	●	●	●	●	Miligard 1% 4-5 kg/ha		Anwendung im Abstand von 7-10 Tagen.
Wachstumsförderung	●	●	●	●	Kickstart 0,15 l/ha		Mehrmalige Anwendungen.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge