















Sellerie

	Knollensellerie	Stangensellerie		WF = Wartefrist in Tagen	
	●	●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	Agil 1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	Caravel 0,25 l/ha		Unmittelbar nach der Pflanzung
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	Laguna 2 l/ha	90	Anwendung: ca. 7 Tage nach der Pflanzung. Nach dem Anwachsen der Kultur. (GWS)
Herbizid vor der Pflanzung	●	●	Pendi 3 l/ha		Nur möglich, wenn mit einer Bandsetzmaschine gepflanzt wird.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Bogard 0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr (GWS)
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Diagonal 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Sambesi Pro  4 l/ha		Mischbar mit anderen Fungiziden.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Quiz Pro  1-1,5 l/ha		Mischbar mit anderen Fungiziden.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Kupfer Bordo LG  6,5-9 kg/ha	21	in Mischung
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Flowbrix  4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Cuproxtat flüssig  13-18 l/ha	21	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Hälfte der aufgeführten Konzentrationen/Mengen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	Flint 0,4 kg/ha Flint 0,4 kg/ha	14 7	Maximal 3 Behandlungen mit dem gleichen Wirkstoff der Gruppe.
Blatt-, Erd- und Eulenraupen, Minierfliegen, Thripse	●	●	Audienz 0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	Piretro verde  2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)
Blattläuse	●	●	Pirimor 0,5 kg/ha	7	(GWS)
Blattläuse	●	●	Gepard 0,25 kg/ha	14	2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Thripse	●	●	Siltac plus  0,15 %		Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14	
Möhrenblattfliege	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14	Spritzung alle 8-12 Tage während des Fluges. (GWS)
Eulenraupen	●	●	XenTari  1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Kastanienholzextrakt	●	●	Dexa Pro  3 l/ha		
Düngung	●	●	Azofix plus  1,5 l/ha		zur Erhöhung des Stickstoff im Boden.
Düngung	●	●	Fosfix plus  1,5 l/ha		zur Erhöhung des Phosphors im Boden.
Calcium-Versorgung spez. Lagersellerie	●	●	Tip / Calcium  5 l/ha		Spätsommer bis Herbst.
Wachstumsförderung	●	●	Kickstart  0,15 l/ha		zur Startförderung
Stressbewältigung	●	●	Penergetic p Gemüse + Vital  0,25 l/ha 1 l/ha		mehrmals