








Girasoli	Prima della semina	Pre-emergenza	Cotiledoni 2 foglie	3-4 foglie	Formazione dei boccioli fiorali	Osservazioni 
Strategia erbicida	Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.					(SPe)
Erbicidi Contro le dicotiledoni e graminacee annuali compreso il miglio.	Laguna 2 l/ha + Frontier X2 0.9 l/ha + Pendi 2 l/ha					
Fertilizzante fogliare Carenza di boro	Frontier X2 1,2 - 1,4 l/ha					
Parassiti Lumache	Micro Bor 3 l/ha  					Stadio 4 a 6 foglie.
Nottue	Amilon 5 5 - 7 kg/ha					Non utilizzare più di 700 g di sostanza attiva metaldeide per ettaro sullo stesso appezzamento entro un anno.
Detterenza	Techno 10 CS 0,075 l/ha					Massimo 1 applicazione per raccolto e anno. (SPe) . Solo con autorizzazione speciale.
Trattamento delle sementi	Penergetic b VV 0.7 kg/ha  					Riduce i danni ai prati e alle colture causati dagli animali selvatici.
	Penergetic b WV 0.6 kg/ha  					
	Penergetic p campicoltura 25 g / 25 kg 