

## Gurken- und Kürbisgewächse

	Gurken, Essiggurken, Cornichon					WF = Wartezeit in Tagen		
	Wassermelonen							
	Melonen							
	Ölkürbisse							
	Kürbisse mit geniessbarer Schale							
	Kürbisse mit ungeniessbarer Schale							
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)	●			●		<b>Goltix 700 SC</b>	5 l/ha	Zwischenreihenbehandlung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)		●		●		<b>Caravel</b>	0,25 l/ha	Vorauslauf: unmittelbar nach der Saat/Pflanzung.
Gummistengelkrankheit [Didymella bryoniae]	●				●	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze.					●	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Falscher Mehltau	●				●	<b>Booster</b>	3,5 l/ha	15 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	<b>Carbyc</b>	1 % 3-5 kg/ha	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	<b>Celos</b>	0,1-0,2 % 1-2 kg/ha	3 Temperatur beachten.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	<b>Microthiol LG</b>	2 l/ha	3
Anthraknose, Krätze	●				●	<b>Diagonal</b>	0,08 % 0,8 l/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	21 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●				●	<b>Diagonal</b>	0,1 % 1 l/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter Mehltau	●				●	<b>Flint</b>	0,05 % 0,5 kg/ha	3 Ab Befallsbeginn.
Gummistengelkrankheit	●	●	●	●	●	<b>Flint</b>	0,25 kg/ha	3 Maximal 3 Behandlungen.
Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, der Kürbisgewächse	●				●	<b>Flowbrix</b>	2 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
	●				●	<b>Cuproxat flüssig</b>	4 l/ha	21
	●				●	<b>Kupfer Bordo LG</b> 0,5 %	5 kg/ha	21
Graufäule (Gewächshaus)	●				●	<b>Prestop</b>	0,5 %	Max. 4 Behandlungen im Abstand von 3 Wochen.
Gummistengelkrankheit (Gewächshaus)	●				●	<b>Prestop</b>	1 %	Behandlung im Abstand von 3-4 Wochen wiederholen.
Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●				●	<b>Prestop</b>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung.
Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●	●	●	●	●	<b>Ranman Top</b>	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen.
Botrytis, Sclerotinia	●				●	<b>Switch</b>	0,1 %	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Raupen, Thripse		●	●		●	<b>Audienz</b>	0,2 l/ha	3 Im Gewächshaus max. 3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 kg/ha	3 Ölkürbis Wartezeit: 14 Tage.
Blattläuse, Thripse	●	●	●	●	●	<b>Siltac plus</b>	0,1 %	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	●	<b>Pirimor</b>	0,05 %	7 Nützlingsschonend. (ohne Gurkenblattlaus).
Eulenraupen	●	●	●	●	●	<b>Rapid</b>	0,15 % 1,5 kg/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Spinnmilben //(Eier, Larven, Adulte)	●	●	●	●	●	<b>Acramite</b>	0,25 l/ha	7 (GWS)
Spinnmilben //(Eier, Larven)	●	●	●	●	●	<b>Credo</b>	0,32 l/ha	7 Anwendbar bis spätestens 11.07.2025. (GWS)
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	<b>Vista</b>	20 l/ha	7 Pflanzen allseitig gut benetzen.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	<b>Piretro verde</b>	2,5 l/ha	Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●				●	<b>XenTari</b>	0,1 % 1 kg/ha	
Blattgesundheit	●	●	●	●	●	<b>Dexa Pro</b>	0,7-1 %	Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen.
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	<b>Olimag</b>	0,4-0,8 %	Anwendung: Stadium BBCH 12 - 89.
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke im Treibhaus)	●	●	●	●	●	<b>Ferplus Top</b>	0,3-0,7 kg/are	Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten).

Getreide  
Mais  
Herbizid-Wirkungstabelle  
Kartoffeln  
Rüben/Raps  
Soja / Erbsen / Sonnenblumen  
Feldbau div.  
Futterkonservierung  
Weinbau  
Kernobst/Steinobst  
Gemüse / Beeren  
Zierpflanzenbau  
Nützlinge