Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Gurken- und Kürbisgewächse

	Gurken, Essiggurken, Cornichon	Wassermelonen	Melonen	Ölkürbisse	Kürbisse mit geniessbarer Schale	Kürbisse mit ungeniessbarer Schale			WF = Wartefrist in Tagen
							Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)	●				●		**Goltix 700 SC**	5 l/ha	Zwischenreihenbehandlung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)				●		●	**Caravel**	0,25 l/ha	Vorauflauf: unmittelbar nach der Saat/Pflanzung.
Gummistengelkrankheit [Didymella bryoniae]	●						**Bogard**	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. **(GWS)**
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze.					●		**Bogard**	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. **(GWS)**
Falscher Mehltau	●				●		**Booster**	3,5 l/ha	15 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●	**Carbyc**	1 % 3-5 kg/ha	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●	**Celos**	0,1-0,2 % 1-2 kg/ha	3 Temperatur beachten.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●	**Microthiol LG**	1 l/ha	3
Anthraknose, Krätze			●		●		**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	21 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau (Gewächshaus)			●		●		**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter Mehltau	●				●		**Flint**	0,5 % 0,5 kg/ha	3 Ab Befallsbeginn.
Gummistengelkrankheit		●	●	●		●	**Flint**	0,25 kg/ha	Maximal 3 Behandlungen.
Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, der Kürbisgewächse	●						**Flowbrix**	2 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
	●						**Cuproxat flüssig**	4 l/ha	21
	●						**Kupfer Bordo LG**	0,5 % 5 kg/ha	21
Graufäule (Gewächshaus)	●						**Prestop**	0,5 %	Max. 4 Behandlungen im Abstand von 3 Wochen.
Gummistengelkrankheit (Gewächshaus)	●						**Prestop**	1 %	Behandlung im Abstand von 3-4 Wochen wiederholen.
Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●						**Prestop**	0,5 kg/m³	Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung.
Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●	●	●	●	●	●	**Ranman Top**	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen.
Botrytis, Sclerotinia	●						**Switch**	0,1 %	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Thripse	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,1 %	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,05 %	7 Nützlingsschonend. (ohne Gurkenblattlaus).
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	**Rapid**	0,15 % 1,5 kg/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Spinnmilben /(Eier, Larven, Adulte)	●	●	●	●	●	●	**Acramite**	0,25 l/ha	7 **(GWS)**
Spinnmilben /(Eier, Larven, Adulte)	●	●	●	●	●	●	**Credo**	0,32 l/ha	7 Ab Befallsbeginn. **(GWS)**
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	**Vista**	20 l/ha	7 Pflanzen allseitig gut benetzen.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde**	2,5 l/ha	Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●		●				**XenTari**	0,1 % 1 kg/ha	
Nutzinsekten (Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	*Einsatz von Nutzinsekten siehe Seite 43 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.*		
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	●	**Olimag**	0,4-0,8 %	Anwendung: Stadium BBCH 12 - 89.
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke im Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	**Ferplus Top**	0,3-0,7 kg/are	Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten).

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

WF = Wartefrist in Tagen

Karotten

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

			WF	
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Pendi** **+ Caravel**	1-2 l/ha 0,15 l/ha		Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat), keine oberflächige Saat.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Laguna**	2-3 l/ha	80	Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat) plus 1.0 l/ha im Nachauflauf (BBCH 13). **(GWS)**
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Condoral SC**	0,1-0,2 l/ha		Anwendung: Stadium 10-16 BBCH. Splitbehandlung (max. 0,6 l/ha). **(GWS)**
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	28	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Cuproxat flüssig** BIO	13-18 l/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Flowbrix** BIO	4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Kupfer-Bordo LG** BIO	13-18 kg/ha	21	
Alternaria-Möhrenschwärze	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Alternaria-Möhrenschwärze Echter Mehltau	**Flint**	0,4 kg/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS)**
Möhrenfliege, Erdraupen	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen nur während dem Flug im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen, Abstand zwischen den Behandlungen mind. 7 Tage. **(GWS)**
Wachstumsförderung	**Kickstart** TEAM BF	0,15 l/ha		Mehrmalige Anwendung. Spurennährstoff-Mischdünger enthält Zink und Fulvosäuren.
Wachstumsförderung	**Final K** TEAM BF	1-1,5 l/ha		2-3 Anwendungen.
Wachstumsförderung	**Azofix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	**Fosfix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors

Knoblauch

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha		2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Laguna**	3 l/ha	7	Anwendung: Vorauflauf. Keine Anwendung auf Sandböden. **(GWS)**
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS**
Falscher Mehltau	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur und Wirkstoff. **(GWS)**
Thripse	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen, Abstand zwischen den Behandlungen mind. 7 Tage. **(GWS)**
Blattläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %	7	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Eulenraupen	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.
Keimhemmung	**Fazor**	3,5-4 kg/ha		Ab Beginn des Knickens der Schäfte bis spät. 30 % geknickt. Hinweis Seite 65.

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Küchenkräuter

			WF	= Wartefrist in Tagen
Einjährige Ungräser	**Agil**	0,75-1,25 l/ha	21	Im Nachauflauf.
Einjährige Ungräser/Unkräuter	**Caravel**	0,15 l/ha	90	Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat.
Einjährige Ungräser/Unkräuter	**Goltix 700 SC**	2-4,5 l/ha	40	Splitbehandlung
Blattfleckenpilze, Alternaria, Septoria, Samtfleckenkrankheit	**Bogard**	0,5 l/ha	21	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Alternaria, Septoria, Rost	**Diagonal**	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	**Prestop**	500 g/m^3		Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen.
Blattflecken	**Quiz** 0,225 % + **Magna Bon** 1 l/ha			2 Behandlungen zum Start der Kultur.
Falsche Mehltaupilze der Küchenkräuter	**Revus**	0,6 l/ha	7	Max. 1/6 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Blattkäfer, Minierfliegen, Thripse, Erdflöhe, Erdraupen, Eulenraupen	**Audienz**	0,02% 0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse,Weisse Fliegen	**Piretro verde**	1,5 l/ha	3	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, (Röhrenläuse)	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattsaugende Insekten	**Siltac plus**	0,1-0,15 l/ha	7	5-7 Tage Abstand, bei Wiederholungen.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. Nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, (Röhrenläuse), Spinnmilben	**Vista**	2 % 20 l/ha	7	Behandlung nach Bedarf wiederholen.
Eulenraupen	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	**Amilon 5**	7 kg/ha		Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Maulwürfe (Fam.) Wühl- oder Schermäuse	**Campa**	1-5 Patronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.
Pflanzenstärkung	**Fence N**	1,5-3 l/ha		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Magnesiumdünger	**Olimag**	0,4-0,8 %		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Bodenfruchtbarkeit	**Penergetic b**	0,3-0,5/ha		Vor der Saat/Pflanzung.
Pflanzengesundheit	**Penergetic p Gemüse**	0,1 kg/ha		Mehrmals Wiederholen.
Pflanzengesundheit	**Vital**	1 l/ha		Effektive Mikroorganismen.
Bio-Stimulator	**HBR**	1-2 l/ha		Reduziert Witterungsstress.
Organisches Kaliumhumat	**LiqHumus 18**	35 l/ha		Humusaufbau.
Bodenfruchtbarkeit	**Terrasan**	1,5-5 l/ha		Effektive Mikroorganismen.
Bio-Stimulator	**Polygrün**	1,5-3 l/ha		Algenextrakt.
Blattdünger	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,4 %		Calciumdünger.
Blattdünger	**Kickstart**	0,1 l/ha		Spurenelemente.

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Lauch

			WF = Wartefrist in Tagen	
Herbizid nach der Pflanzung	**Spark**	2 kg/ha		Maximal 1 Behandlung pro Kultur. **(GWS)**
	Lentagran	2 kg/ha	28	Ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide,Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser und Unkräuter	**Pendi**	2-4 l/ha		Lauch gesät. Im Vorauflauf.
Ungräser und Unkräuter	**Pendi**	4-5 l/ha		Lauch gepflanzt. Vor der Pflanzung.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Alternaria spp. Phytophthora spp.	**Diagonal**	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Alternaria spp. Lauchrost,Papier-fleckenkrankheit, Samtfleckenkrankheit	**Flint**	0,4 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen. Stadium 41-49 (BBCH).
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 3 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Lauchmotte	**XenTari**	1 kg/ha	7	
Blattsaugende Insekten	**Siltac plus**	0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Lauchmotte	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Minierfliegen, Thripse	**Audienz**	0,4 l/ha	7	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle/Jahr/Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Wachstumsförderung	**Azofix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors

Randen

Ausfallgetreide, Einjährige Gräser und Quecken	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	
Herbizid nach dem Auflaufen	**Beta Star** + **Goltix 700 SC**	1,5 + 1,5 + 2,5 l/ha 1 l/ha		pro Splitbehandlung.
Einj. Unkräuter	**Betam LG**	6 l/ha		Anwendung: Nachauflauf.
Einj. Gräser und Unkräuter	**Oblix MT**	6 l/ha		Splitbehandlung
Herbizid vor dem Auflaufen	**Spark**	1,5-2 kg/ha		Nach der Saat vor dem Auflaufen. **(GWS**
Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheiten	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
	Flowbrix	4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	oder **Cuproxat flüssig**	8-12 l/ha	21	
Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheiten	**Kupfer-Bordo LG**	13-18 kg/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektare und Jahr.
Echter Mehltau	**Microthiol LG**	1,5 l/ha	14	Anwendung: Bei Befallsbeginn
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Blattsaugende Insekten	**Siltac plus**	0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Eulenraupen	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.
Wachstumsförderung	**Azofix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors
Pflanzenstärkung	**Fence N**	1,5-3 l/ha		Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Bormangel	**Micro Bor**	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	**MaxMan 400**	1 l/ha		Speziell in Moorböden.

Insbesondere bei Wetterstress.

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Radies, Rettich, Meerrettich, Speisekohlrüben

WF = Wartefrist in Tagen

	Radies	Rettich	Merrettich	Speisekohlrüben			WF	
Einj. Unkräuter/Ungräser				●	**Caravel**	0,25 l/ha		Vorauflauf, unmittelbar bis 3 Tage nach der Saat.
Herbizid nach der Saat	●	●			**Trax**	1 l/ha		Speziell in Sommerkultur im Freiland. **(GWS)**
Falscher Mehltau, Weisser Rost (Teilw.)	●				**Bion**	30-60 g/ha	7	Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze				●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze Falscher Mehltau, Rost	●	●	●		**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattfleckenpilze	●	●	●	●	**Flowbrix**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Weisser Rost			●		**Mildicut**	4 l/ha	14	Max. 4 Behandlungen. Ab Beginn des Dickenwachstums.
Falscher Mehltau			●	●	**Revus**	0,6 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) **(GWS)**
Falscher Mehltau	●	●			**Revus**	0,6 l/ha	14	Max. 6 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) **(GWS)**
Blattfressende Raupen	●				**Audienz**	0,2 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen. Anwendung nur Gewächshaus.
Blattläuse,Weisse Fliegen	●	●	●	●	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlung im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,1-0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Thripse, Minierfliegen, Blattläuse	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	**Vista**	2 %		Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●	●		●	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Schnecken	●	●	●	●	**Amilon 5**	5-7 kg/ha		Ab Keimblatt streuen.
Maulwürfe, Wühl- oder Schermaus	●	●	●	●	**Campa**	1-5 Gaspatronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.

Rhabarber

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einj. Rispengras, Quecke	**Agil**	0,75 - 2,5 l/ha		2,5 l/ha gegen Quecken. Nach der Ernte.
Einj. Unkräuter/Ungräser	**Caravel**	0,25 l/ha		Im Frühjahr. Vor dem Austrieb.
Blattflecken	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parcelle und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Maximal 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von 7 Tagen **(GWS).**
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)**
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Eulenraupen	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien**.**
Düngung	**Azofix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Düngung	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Sellerie

	Knollensellerie	Stangensellerie			WF	= Wartefrist in Tagen
	●	●	**Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.**			
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	**Caravel**	0,25 l/ha	90	Unmittelbar nach der Pflanzung
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	**Laguna**	2 l/ha	90	Anwendung: ca. 7 Tage nach der Pflanzung. Nach dem Anwachsen der Kultur. **(GWS)**
Herbizid vor der Pflanzung	●	●	**Pendi**	3 l/ha		Nur möglich, wenn mit einer Bandsetzmaschine gepflanzt wird.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr **(GWS)**
Echter / Falscher Mehltau	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Unmittelbar nach der Pflanzung.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Quiz**	0,5 l/ha		Mischbar mit anderen Fungiziden.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Kupfer Bordo LG**	6,5-9 kg/ha	21	in Mischung
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Flowbrix**	4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Cuproxat flüssig**	13-18 l/ha	21	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Häfte der aufgeführten Konzentrationen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Flint** **Flint**	0,4 kg/ha 0,4 kg/ha	14 7	Maximal 3 Behandlungen mit dem gleichen Wirkstoff der Gruppe.
Erd- und Eulenraupen, Minierfliegen, Thripse	●	●	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements par culture.
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	**(GWS)**
Blattäuse, Thripse	●	●	**Siltac plus**	0,15 %		2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff **(GWS)** nur mitSonderbewilligung.
Möhrenblattfliege	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Spritzung alle 8-12 Tage während des Fluges. **(GWS)**
Eulenraupen	●	●	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Düngung	●	●	**Azofix plus**	1,5 l/ha		zur Erhöhung des Stickstoff im Boden.
Düngung	●	●	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		zur Erhöhung des Phosphors im Boden.
Calcium-Versorgung spez. Lagersellerie	●	●	**Tip / Calcium**	5 l/ha		Spätsommer bis Herbst.
Wachstumsförderung	●	●	**Kickstart**	0,15 l/ha		zur Startförderung
Stressbewältigung	●	●	**Penergetic p Gemüse** **+ Vital** 1 l/ha	0,25 l/ha		mehrmals

Gemüsebau

Leu+Gygax AG

WF = Wartefrist in Tagen

Spargeln

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha		Nach der Stechperiode.
Einj. Unkräuter / Ungräser	**Caravel**	0,25 l/ha		Ertragsanlage: Nach der Stechperiode. Vor dem Durchstossen der Kultur.
Einj. Unkräuter / Ungräser	**Caravel**	0,25 l/ha		Junganlage: Im Pflanzjahr. Vor dem Durchstossen.
Herbizid in Junganlagen	**Condoral SC**	0,75 l/ha		Vor und nach der Ernte. **(GWS)**
Breitblättrige Unkräuter	**Lentagran**	2 kg/ha		Nach der Stechperiode.
Blattschwärze, Rostpilze	**Bogard**	0,5 l/ha		Im Sommer. Max. 4 Behandlungen pro Jahr.
Blattschwärze, Spargelrost	**Diagonal**	1 l/ha		In Junganlagen oder in Ertragsanlagen nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Graufäule	**Switch**	1 kg/ha		Nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Spargelhähnchen, Spargelkäfer	**Audienz**	0,2 l/ha		Nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha		Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen.
Blattläuse (Röhrenläuse), Spargelkäfer, Erdraupen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha		Nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. Nur mit Sonderbewilligung.
Minierfliegen	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha		Nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Eulenraupen	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Schnecken	**Amilon 5**	5-7 kg/ha		Ab Beginn Durchstossen streuen.

Spinat

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1-2,5 l/ha	21	
Nachauflauf	**Betam LG**	2x1 l/ha Split	21	Im Keimblattstadium der Unkräuter. Nicht bei extremer Witterung behandeln.
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Caravel**	0,15 l/ha		Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat.
Herbizid **vor dem Auflaufen**	**Goltix 700 SC** **+ Spark**	1 l/ha 0,8 kg/ha		Frühjahr- und Sommerspinat. **(GWS)**
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Spark**	1,5-2 kg/ha		In sehr humosen Böden höhere Dosierung. **(GWS)**
Falscher Mehltau, Papierfleckenkrankheit	**Bion**	30 g/ha	7	
Falscher Mehltau	**Revus**	0,6 l/ha	7 7	(Freiland) 2 Behandlungen. (Gewächshaus) 1 Behandlung.
Erdraupen, Eulenraupen	**Audienz**	0,2-0,4 l/ha	7	Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Minierfliegen, Rübenfliege	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)**
Erdflöhe	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)**
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Eulenraupen	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Blattvergilbung	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Ab 4-6-Blatt-Stadium. Speziell später Frühlings- und Herbstspinat.
Wachstumsförderung	**Flüssigdünger LG**	5 l/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Wachstumsförderung	**Kickstart**	0,15 l/ha		zur Startförderung.

Tomaten

WF = Wartefrist in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

				WF	
Einjährige Ungräser und Quecken	**Agil**		1,5-2,5 l/ha	56	7-10 Tage nach der Pflanzung. **(GWS)**
Herbizid Freiland	**Condoral SC**		0,5 l/ha		2-3 Blattstadium der Ungräser.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	**Bogard**		0,05 %	3	Max. 3 Behandlungen. **(GWS)**
Echter Mehltau Falscher Mehltau	**Bogard** **+ Ranman Top**		0,05 % 0,05 %	3	Max. 3 Behandlungen. **(GWS)**
Echter Mehltau	**Celos**		0,1-0,2 %	3	Temperatur beobachten.
Echter Mehltau	**Carbyc**		0,5-1 %		Anwendung: Stadium BBCH 12-89.
Alternaria spp., Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, Bakterielle Fleckenkrankheit Bakterielle Tomatenwelke	**Cuproxat flüssig**		1,3-1,8 %	3	
	Flowbrix		0,45-0,7 %	3	
	Kupfer Bordo LG		1,3-1,8 %	3	
Alternaria, Echter Mehltau, Kraut- und Fruchtfäule	**Diagonal**		1 l/ha	3	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Graufäule, Sclerotinia-Fäule. (Gewächshaus)	**Pyrus 400 SC**		0,125 %	3	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Botrytis cinerea	**Prestop**		0,5 %		
Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rizoctonia spp.	**Prestop**		0,5 %		Giessen. (Gewächshaus).
Graufäule, Slcerotinia-Fäule	**Switch**		0,1 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Minierfliegen	**Audienz**		0,4-0,8 l/ha	3	**(GWS)**
Spinnmilben	**Acramite**		0,25 l/ha	3	**(GWS)**
Spinnmilben	**Credo**		0,04 %	3	**(GWS)**
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde**		2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse div. Arten	**Pirimor**		0,05 %	7	Nützlingsschonend. **(GWS)**
Tomatenminiermotten	**Rapid**	0,15 %	1,5 kg/ha	3	Maximal 2 Behandlungen. **(GWS)**
Blattsaugende Insekten	**Siltac plus**		0,1 %		Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,01 %	0,1 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.**(GWS)**
Weisse Fliegen	**Vista**	2 %	20 l/ha	7	Temperatur nicht über 25 °C bei Behandlung.
Eulenraupen	**XenTari**		0,1 %		Bei Befall 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.

Einsatz von Nutzinsekten siehe Seite 43 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.

Calciummangel, Blütenendfäule	**Basfoliar Combi** STIPP		0,2-0,3 % (2-3 l/ha)		3-5 Spritzungen notwendig oder 0,1 % giessen 5 l/m² 2mal innert 1 Woche, anschliessend nach Bedarf.
Blattvergilbung	**Fetrilon-Combi** [1]		1 kg/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Organischer Stimulator	**Aminopower plus**		1-2 l/ha		Mischbar mit Fungiziden.
Mg-Mangel	**Olimag**		0,4%		Mischbar mit Fungiziden.

WF = Wartefrist in Tagen

Zwiebeln / Schalotten

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

	Speisezwiebeln	Gemüsezwiebeln	Bundzwiebeln	Schalotten			WF	
	●	●	●	●	**Pendi**	2-3 l/ha		Vor dem Auflaufen der Unkräuter. In leichten Böden untere Dosierung. Saattiefe mindestens 3 cm.
Gegen breitblättrige Unkräuter	●	●	●	●	**Lentagran**	2 kg/ha	28	Nachauflauf ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einj. Ungräser und Unkräuter	●	●	●	●	**Laguna**	3 l/ha		Vorauflauf. Nur gesteckte Kulturen. **(GWS)**
Falscher Mehltau	●	●	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Botrytis	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Mehlkrankheit	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. 1. Behandlung im 2-Blattstadium 2. Behandlung 3 Wochen später (bei Herbstsaat im Frühjahr). **(GWS)**
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Thripse				●	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Minierfliegen, Thripse	●	●	●		**Audienz** BIO	0,4 l/ha	7	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr in dieser Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	●	●		●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Keine Anwendung bei Bundzwiebeln. **(GWS)**
Blattläuse (Röhrenläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Thripse	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen.
Eulenraupen				●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha		Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.**(GWS)**
Schnecken	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Maulwürfe, Wühl- oder Schermäuse	●	●	●	●	**Campa**	1-5 Patronen/Kolonie TEAM BF		Die Gänge sind gut abzudichten.
Keimhemmung	●	●	●	●	**Fazor**	3,5-4 kg/ha		20-30 % der Schäfte geknickt. Hinweis Seite 65.
	●	●	●	●	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Der Spritzbrühe beifügen.
Vitalität und klimatische Stressbewältigung	●	●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	1 l/ha		2-3 Behandlungen. Ab Stadium BBCH 14.
					+			
	●	●	●	●	**Vital** BIO TEAM BF	1 l/ha		
					+			
	●	●	●	●	**Penergetic p Gemüse** BIO	0,1 kg/ha TEAM BF		
	●	●	●	●	**Azofix plus und Foxfix plus**	1 l/ha BIO TEAM BF		Zur Erhöhung des Stickstoff und Phosphors im Boden.