

Hochstammbäume extensiv

Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September

Spritzung 1 beim Austrieb	Spritzung 2 in die abgehende Kirschblüte	Spritzung 3 beim Farbumschlag der Kirschen	Spritzung 4 ca. im BBCH Stadium 77	Spritzung 5 Fortgeschrittene Fruchtreife
Cuproxat® flüssig 🌱 0,5 %	Bogard® 0,015 % + Legan WG 0,05 %	Bogard® 0,015 % + Legan WG 0,05 %	Bogard® 0,015 % + Captan 80 WDG 0,15 %	Captan 80 WDG 0,15 %
		Pirimor® 0,04 % + XenTari® WG 🌱 0,1 %	Pirimor® 0,02 % + XenTari® WG 🌱 0,1 %	
	Vital 🌱 0,25 %	Vital 🌱 0,25 %	Vital 🌱 0,25 %	Vital 🌱 0,25 %
	Penergetic Obst 🌱 0,05%	Penergetic Obst 🌱 0,05%	Penergetic Obst 🌱 0,05%	Penergetic Obst 🌱 0,05%
Steinobst - Kräuselkrankheit des Pfirsichs - Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge - Schrotschuss Kernobst - Schorf des Kernobstes	Steinobst - Fruchtmonilia - Sprühfleckenkrankheit der Kirsche - Schrotschuss - Bitterfäule der Kirsche - Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge - Rost der Zwetschge Kernobst - Birnengitterrost - Blüten- u. Zweigdürre - Echter Mehltau - Schorf des Kernobstes	Steinobst - Fruchtmonilia - Sprühfleckenkrankheit der Kirsche - Schrotschuss - Bitterfäule der Kirsche - Narren- oder Taschenkrankheit der Zwetschge - Rost der Zwetschge - Gespinstmotten - Frostspanner - Blattläuse - Gemeine Kommaschildlaus Kernobst - Birnengitterrost - Blüten- u. Zweigdürre - Echter Mehltau - Schorf des Kernobstes - Frostspanner - Gespinstmotten - Blattläuse - Gemeine Kommaschildlaus - Blutläuse	Steinobst - Fruchtmonilia - Schrotschuss - Rost der Zwetschge - Gemeine Kommaschildlaus - Blattläuse (Röhrenläuse) - Gespinstmotten - Frostspanner Kernobst - Birnengitterrost - Blüten- und Zweigdürre - Echter Mehltau - Schorf des Kernobstes - Frostspanner - Gespinstmotten - Blattläuse - Gemeine Kommaschildlaus - Blutläuse	Kernobst - Lagerschorf des Apfels - Lentizellenfäulnis des Apfels - Schorf des Kernobst

Hinweise:
Sämtliche Spritzungen können gleichzeitig auf Stein- und Kernobst ausgebracht werden.

Bei der Spritzung 2 und 3 wird auf das Stadium der Kirschen geachtet. Das Kernobst kann gleichzeitig mitgespritzt werden.

Bei sämtlichen Spritzungen kann 0.1% Netzmittel beigefügt werden.

Insektizide und Fungizide können in einer Tankmischung gespritzt werden.

Empfohlener Blattdünger
Folifert Super 4.1 kg/ha

Gehalt: Vital: effektive Mikroorganismen / Cuproxat flüssig: 190 g/l Kupferoxysulfat; GHS09 / Bogard: 250 g/l Difenconazole / Legan WG: 70 % Dithianon; GHS07, GHS09 / Pirimor: 50 % Pirimicarb; GHS06, GHS09 / XenTari WG: 54 % B.t. aizawai / Captan 80 WDG: 80 % Captan; GHS07, GHS08, GHS09.

🌱 = BIO

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.