

Kartoffeln											Leu+Gygax AG	Hinweise
		09	10-19	21-29	31-39	51	60-69	70-79	91-97			
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.										
In Kartoffeln unter Folien gegen einjährige Unkräuter und Ungräser		Pendi 3 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha										Die Mischung Pendi und Condoral SC ist auch in Pflanzkartoffeln möglich. (GWS)
Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln		Oxidia 4-5 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha										Vor- oder früher Nachauflauf. (GWS)
		+ Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha										
		Oxidia + Laguna + Condoral SC	2 l/ha 2 l/ha 0,5 l/ha									Mischung nur im Vorauslauf anwenden! (GWS)
		+ Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha										
Weisser Gänsefuss Speise- und Futterkartoffeln Kartoffeln zu Pflanzgutproduktion		Caravel 0.2-0.25 l/ha										Nur im Vorauslauf anwenden
Klebern, Unkräuter inkl. Einjährige Gräser, Hirse, Quecke, Amarant				Rimuron 40 g/ha + Codacide 2 l/ha								Bei Splitbehandlung 2 x 20 g/ha + Codacide 1 l/ha (GWS)
Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln		Condoral SC 0,5-0,75 l/ha		Condoral SC 0,3 - 0,6 l/ha im NA								Sorteneinschränkungen beachten: Behandlung nur im Vorauslauf mit max. 750 ml Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Félicia, Lady Rosetta und Marlen. (GWS)
Einjährige Unkräuter und Ungräser in Kartoffeln zur Pflanzgutproduktion		Condoral SC 0,5-0,75 l/ha										<i>Behandlung nur im Vorauslauf mit max. 750 ml Condoral und notfalls im frühen Nachauflauf bis 5 cm Staudenhöhe mit max. 400 ml Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola und Victoria.</i>
Einjährige Unkräuter (spez. Klebern und Zyperngras) auch als Unterblatt-Spritzung möglich				Effican SG 0.5 - 1.1 kg/ha								Ergänzungsbehandlung gegen Klebern/Zyperngras . Nur abgetrocknete Bestände und bei wüchsiger Witterung behandeln. Wuchshöhe der Kartoffelstauden 10 - 20 cm hoch. (GWS)
Einjährige Ungräser und Quecke inkl. Raygräser, Hirse u.a.			Agil 1 - 2,5 l/ha									Quecken von ca. 20 cm mit Agil 1,75 - 2.5 l/ha behandeln. Mischbar mit unseren Fungiziden.
Unterblattbehandlung gegen Unkräuter und Gräser (inkl. Winden)				Condoral SC 0,5 l/ha + MCPB LG 3 l/ha + Effican SG 1 kg/ha								Nicht über Stauden spritzen. (GWS)
Fungizidstrategie mit 8 Behandlungen				2 x Proxanil 2,5 l/ha + Aviso 2 kg/ha + Kickstart 0.15 l/ha		3 x Kunshi 0,5 kg/ha + Bogard 0,3-0,5 l/ha + Kickstart 0.15 l/ha		3 x Ranman Top 0,5 l/ha + Aviso 2 kg/ha				Eine Zugabe von Bogard 0.5 l/ha verbessert die Wirkung gegen Alternaria. (GWS)
Abstoppen von Krautfäulebefall bei feuchter Witterung				Proxanil 2,5 l/ha + Ranman Top 0,5 l/ha								Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen. (GWS)
				Cymbal 0,25 kg/ha + Ranman Top 0,5 l/ha								Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen. (GWS)
Keimhemmung Speise- und Industriekartoffeln							Fazor 5 kg/ha					Bei wüchsiger Witterung ab 25 mm Knollendurchmesser. Detaillierte Hinweise: Siehe Infoseite Fazor S. 65. Wirkung auf Durchwuchskartoffeln im Folgejahr.
Krankheiten												
Kraut- und Knollenfäule / Alternaria				Aviso 2 kg/ha + Revus 0,6 l/ha								Behandlung alle 7 - 10 Tage. Sehr gute Wirkung gegen Alternaria. Nach starkem Regen Spritzbelag sofort erneuern. Wassermenge der Krautmasse anpassen. Hohe Regenfestigkeit und gute Sporenwirkung. Max. 3 Behandlungen. Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen. (GWS)
				Ranman Top 0,5 l/ha + Bogard 0,5 l/ha oder Flint 250 g/ha								
Pflanzkartoffeln				3 x Aviso 2 kg/ha + Revus 0,6 l/ha		3 x Ranman Top 0,5 l/ha						Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Schädlinge												
Schnecken		Amilon 5 5-7 kg/ha										
Kartoffelkäfer						Audienz 0,05 l/ha						Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
						Coragen 60 ml/ha						Systemisches Insektizid, wirkt auf alle Stadien des Kartoffelkäfers: Eier + Adulte + Larven. Nur mit Sonderbewilligung.
						Oikos 1.5 l/ha						Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)
Kartoffelkäfer [L1 und L2]						Novodor 3 FC 3 - 5 l/ha						Nur gegen junge Larvenstadien.
Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln		Spray-Oil 7-E 7 l/ha in 350 l Wasser oder Winsum 2-3 % (10-15 l/ha in 500 l Wasser)										1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelaufen sind. Mischbar mit L+G Fungiziden.
		Pirimor 150 g/ha										Unter Tunnelabdeckung oder im Gewächshaus.
Biostimulatoren												Saatgutbehandlung auf der Pflanzmaschine beim Legen der Knollen. Penergetic ist mit Cu mischbar.
Saatgutbeizung		Penergetic p Feldbau 250 g/ha										
Stressbewältigung		Penergetic p Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5-5l/ha				Amino Power Plus liquid 1-2 l/ha						Zusätzliche Wuchsförderung.
				Polygrün 0,5-1 l/ha		2-3 Behandlungen						nach der Ernte
				Penergetic p Feldbau 100 g/ha		+ Vital 1 l/ha		alle 7-10 Tage				Penergetic b Boden 400 g/ha Als Zusatz zu Fungiziden.
Blattdüngung						Dexa Pro 4 l/ha						Moorböden, 2 - 3x spritzen. Mischbar mit unseren Fungiziden.
Manganmangel				MaxMan 400 1 l/ha								
Spurenelementmangel Mg, Mn, B, u.a. und Stärkeaufbau				Fetrilon-Combi 1 kg/ha								Mischbar mit L+G Fungiziden.
Wachstumsförderung				Folifert supermix 4.1 kg/ha oder Final K 3 l/ha		(ab Reihenschluss)						Den Fungizidspritzungen zur Förderung einer gesunden Staudenentwicklung zusetzen. Flüssigdünger LG wirkt pH-senkend.
Nützlinge		Zierpflanzenbau										Mais