



Vorauslauf,
Keimung



Auflaufen

09



Blatt- u. Stengelwachstum

10-19



Längenwachstum

21-29



Staudenschluss

31-39



Knospenbildung

51



Blüte

60-69



Blüte/Beerenbildung

70-79



Abreife

91-97

Nach der Ernte

Hinweise

Krankheiten

Kraut- und Knollenfäule / Alternaria
Falscher Mehltau
Alternaria

Flowbrix 3 l/ha

Kupfer-Bordo LG 17.5 kg/ha

Quiz 0.225 l/100 l

Sambesi 4-8 l/ha

Bio Suisse: Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist. Demeter: kein Kupfereinsatz.

Schädlinge

Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln
Kartoffelkäfer [L1 und L2]

Spray Oil 7-E 7 l/ha in 350 l Wasser

Winsum 2-3 % 10-15 l/ha in 500 l Wasser

Novodor 3 FC 3-5 l/ha

1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelaufen sind. Mischbar mit L+G Fungiziden.

Pflanzenstimulatoren

Kastanienholzextrakt
Braunalgenextrakt
Braunalgen und Hefeextrakt
Braunalgenextrakt
Pflanzenextrakt

Dexa Pro 4 l/ha

Noctudor 4 l/ha + **Surfy** 0.15 %

Pidel 4 l/ha + **Surfy** 0.15 %

Harvel 1 % 10 l/ha

Hi-Grow 5 l/ha

Bodenstimulatoren

Bodenapplikation
Bodenapplikation

Penergetic b Boden
0.5 kg/ha
+ **Terrasan**
1.5 - 5 l/ha

LiqHumus 30 l/ha

Penergetic b Boden
0.5 kg/ha
+ **Terrasan**
1.5-5 l/ha

Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt.

Macht die Nährstoffe gleichmässig pflanzenverfügbar.

Düngungen

Bor
Stickstoffbakterien
Phosphorbakterien

Micro Bor 1 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.