Prodotti / Piani di trattamento

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf AG
Telefono 056 201 45 45
Fax 056 225 25 15
info@leugygax.ch
www.leugygax.ch

D

Dettaglio

Ordina direttamente nel nostro negozio online entro le 12 h - consegnato il giorno successivo (lunedì-venerdì)

www.leugygax. ch

TEAM BF

5413 Birmenstorf AG
Fellstrasse 1
Telefono 056 201 45 45
Fax 056 225 25 15

Responsabili dei settori

Capo tecnico, omologazioni, iscrizioni e consigli

Enis Mathlouthi
Ingénieur Agronomie
Téléphone 056 201 45 45
mathlouthi@leugygax.ch

Capo vendita per la Svizzera

Dominik Fischer (LU, BE, AG, SH, VS)
Ing. Agro FH
Mobile 079 664 27 21
fischer@leugygax.ch

Consigliere tecnico

Roberto Ferrari (TI)
via Butarei 30
6862 Rancate
Mobile 079 300 86 01
Fax 091 647 12 51

Sommario

	pagina
Nuovi prodotti	**1**
Prodotti Bioforma	**2-10**
Altri prodotti (Erbicidi, Fungicidi, Insetticidi, Concimi, Biocidi)	**11-31**
Tabella di efficacia degli erbicidi	**36-37**
Piani di trattamento	
Coltivazioni di alberi di Natale	**32**
Cereali Extenso	**33**
Mais	**34-35**
Patate + Spiegazione impiego Fazor	**38-41**
Soja, Girasoli	**42**
Campi incolti e stoppie, lino, Prati pascoli, superficie biodiversità	**43**
Vigna	**44-45**
Vigna senza residui di prodotti fitosanitari di sintesi	**46-47**
Colture orticole	**48-57**
Piante ornamentali	**58-62**
Protezione delle acque (SPe) protezione delle piante non bersaglio della deriva	**63-68**

Marchio

® Marchio di Leu+Gygax SA, CH
® 2 Marchio di Compo GmbH & Co. KG, Münster, D
® 3 Marchio di UPL, IN
® 4 Marchio di Microcide Ltd., GB
® 5 Marchio di General Electric Co., USA
® 7 Marchio di Bayer AG, Leverkusen, BRD
® 9 Marchio di Gartenhilfe Ges.m.b.H., Linz, A
® 10 Marchio di Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
® 11 Marchio di BASF, Ludwigshafen, BRD
® 12 Marchio di Nufarm, GmbH, A
® 13 Marchio di Montanwerke Brixlegg, A
® 14 Marchio di Belchim Crop Protection, B
® 16 Marchio di Humintech GmbH, BRD
® 17 Marchio di Sumitomo, Japan
® 18 Marchio di Copyr, IT
® 20 Marchio di Du Pont de Nemours, USA
® 21 Marchio di Syngenta AG, Basel, CH
® 22 Marchio di Valent Bioscienses Inc., USA
® 23 Marchio di ADAMA, IL
® 24 Marchio di FMC, USA
® 25 Marchio di Omya, CH
® 26 Marchio di ISK, J; distribuito da Belchim; sub-distribuito da Leu+Gygax AG,
® 27 Marchio di Koppert GmbH, D
® 28 Marchio di Penergetic International AG, CH
® 29 Marchio di Lallemand Plant Care, F
® 30 Marchio di Vivagro, F
® 31 Marchio di ICB, PL
® 32 Marchio di Danstar Ferment AG, CH
® 33 Marchio di Corteva Agriscience, USA
® 34 Marchio di Albaugh, USA

Esclusione di responsabilità

A partire dalla data di pubblicazione del presente catalogo, tutte le edizioni precedenti decadono. Questo catalogo e le descrizioni, le spiegzioni e i consigli tecnici in esso contenuti sono stati redatti con cura da noi. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per errori di battitura e di stampa, modifiche tecniche dei prodotti, nonché per danni, reclami e procedimenti legali direttamente o indirettamente collegati alle nostre informazioni tecniche, all'uso dei nostri prodotti o alla nostra capacità di consegna durante il periodo di validità del catalogo. Solo l'etichetta del prodotto corrispondente è valida.

Leu+Gygax AG

NOVITÁ

Nuovi Prodotti

Capsanem

Nematodi entomopatogeni per il controllo dei parassiti nell'orticoltura e nei tappeti erbosi.

Dexa Pro

Soluzione di estratto di legno di castagno per la concimazione delle piante.

Harvel

Estratto di lievito per la fertilizzazione del suolo.

Hi-Grow

Soluzione di concime organico azotato.

Oikos

Insetticida sistemico a base di neem.

Pidel

Estratto di alghe marine con zolfo per la concimazione fogliare.

Rimuron

Erbicida per mais e patate.

Sheriff

Fungicida per barbabietole.

Zeppelin

Erbicida combinato per colza e barbabietola.

Protezione delle piante
Senza le piante non ci sarebbe vita sulla terra: forniscono ossigeno e cibo a tutte le altre forme di vita.

È proprio perché le piante sono così fondamentali per l'esistenza umana che le stesse hanno bisogno di protezione.

Spiegazione dei simboli

Prodotti Bioforma

Secondo l'elenco ufficiale dell'istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (FIBL)

Leggenda dei colori delle barre

- Prodotti Bioforma
- Erbicidi
- Fungicidi
- Insetticidi
- Concimi
- Regolatori di crescita/additivi/diversi

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Action F arbo		Prodotto speciale		
0,2 % B, 0,01 % Mo				
Fertilizzante liquido con microelementi ed estratti di piante.				
Alberi a granella, Alberi a nocciolo: 8 l/ha in 500 l di acqua. Ripetere i trattamenti a intervalli regolari secondo necessità.	11001	20 l	177.70	8.88
Action F viti		Prodotto speciale		
0,18 % B, 0,01 % Mo				
Concime liquido a base di microelementi e estratti di piante.				
Vigna: 5 l/ha in 250 l di acqua. Ripetere i trattamenti a intervalli regolari secondo necessità.	11003	20 l	177.70	8.88
Aceto Fix				
100 % Aceto; GHS 07				
Per disinfettare gli utensili da taglio. Per il trattamento delle sementi. Come esca per trappole a tazza per la cattura di massa.	10929	1 l	16.70	16.70
		12 x 1 l	15.60	15.60
	10930	5 l	55.20	11.04
Impiego e Dosaggio: Il prodotto va utilizzato **non diluito.**		4 x 5 l	54.70	10.94
	10931	20 l	207.50	10.37
Agro N fluid				
53 % Tiosolfato d'ammonio (ATS) (15 % N, 22 % S)				
Concime azotato con zolfo.				
Impiego: 4 - 6 l/ha applicato sulla foglia. 2 - 5 % mescolato a concimi liquidi. 8 - 12 l/ha con irrigazione goccia a goccia. 15 - 30 l/ha con irrigazione a pioggia.	11025	20 l	135.—	6.75
Amino Power®16 Plus Liquid				
7 % N, 0.1 % B, 0.2 % Fe, 0.13 % Mn				
Bio stimolatore organico che contiene più del 50% d'amminoacidi, peptide e microelementi.	11056	5 l	87.30	17.46
Impiego: 5 - 7 l/ha frazionati in 2 - 3 trattamenti.		4 x 5 l	86.80	17.36
Aminosan®16				
9 % N, 50 % MO				
Soluzione organica fertilizzante azotata con peptide e amminoacidi.	11057	5 l	71.60	14.32
		4 x 5 l	71.10	14.22
Impiego: 2 - 3 l/ha, diverse volte secondo il bisogno.	11058	20 l	275.80	13.79
Azofix plus		Prodotto speciale		
1x10⁹ KBE/ml Paenibacillus polymyxa MVY-024				
Preparazione batterica per aumentare l'azoto disponibile per le piante.				
Impiego: 1 - 5 l/ha prima o dopo la semina.	11147	10 l	276.—	27.60
Utilizzare Azofix plus in miscela con Penergetic.		2 x 10 l	275.—	27.50
Basfoliar® 2-Combi STIPP®				
160 g/l Ca come ossido, 135 g/l N, 9 g/l Mg, 6 g/l Mn, 3 g/l B, 0,15 g/l; GHS05, 07, 08				
Concime fogliare per colture orticole, fragole, ciliegie e frutta a granella.				
Colture orticole: 0.2 - 0.4 % contro il marciume dovuto a un disequilibrio (carenze) nei pomodori, cocomeri, zucchine e peperoni. Contro le carenze in calcio (Ca) nelle colture dei cavoli cinesi, cavolfiori, insalate cappuccio, carote, invidia e cicorie, sedano rapa.				
Bacche: 0.15 - 0.3 %. Per migliorare la qualità e la conservazione. 3 trattamenti, l'ultimo dopo la fioritura.				
Ciliegie: 0.15 % contro la tendenza allo spacco dei frutti. 3 trattamenti dopo la fioritura a intervalli di 14 giorni.	11240	10 l	143.20	14.32
Frutta a granella: 0.15 %. Aggiungerlo 3 - 4 volte ai trattamenti fungicidi dopo la fioritura.		2 x 10 l	142.70	14.27
	11241	200 l	2826.—	14.13

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Buxatrap (trappola) **+ Pherodis** (Cydalima perspectalis) Feromone		Prodotto speciale		
Buxatrap: Trappola	15032	1 trappola	31.—	
Pherodis: Feromone per la lotta biologica contro il bruco del bosso. Ideale per i giardini commerciali (industriali).	15224	2 x 2 capsule	43.—	
Campa		Prodotto speciale		
30,5 % Zolfo; GHS03, 07				
Cartuccia fumigante contro talpe, arvicola campestre e terrestre.				
Frutticoltura, viticoltura, orticoltura, campicoltura: 1 - 5 cartucche per colonia.	11585	1 imballaggio (10 cartucce)	25.—	
Carbyc		Prodotto speciale		
99% Bicarbonato idrogenato di sodio				
Fungicida.				
Mele: 3 - 5 kg/ha contro la ticchiolatura, concentrazione massima 1 %. Impiego allo stadio BBCH 10 - 85. Periodo di attesa: 1 giorno. Lotta contro le malattie di conservazione nella frutticoltura, dopo la raccolta: massimo due trattamenti con al massimo 4 %.				
Vigna: 2.5 - 5 kg/ha contro l'oidio, concentrazione massima 1 %. Impiego allo stadio BBCH 12 - 89. Periodo di attesa: 1 giorno.				
Legumi, piante ornamentali: 2 - 5 kg/ha contro l'oidio, concentrazione massima 1 %. Impiego allo stadio BBCH 12 - 89. Periodo di attesa: 1 giorno. Lotta contro il muschio nelle piante da vaso, massimo 122 kg/ha.	11742	5 kg	83.60	16.72
Codacide® 4				
95 % Olio di colza				
Bagnante molto tollerante.				
Bacche, frutticoltura, viticoltura, colture orticole, campicoltura, piante ornamentali: 1 - 2.5 l/ha come coadiuvante dei prodotti antiparassitari. Per risultati ottimi è raccomandato di utilizzare Codacide come premiscelato con i parassitari prima di aggiungerlo nel serbatoio.	11755	1 l	17.10	17.10
		12 x 1 l	16.30	16.30
	11756	5 l	55.30	11.06
		4 x 5 l	54.80	10.96
	11757	10 l	105.90	10.59
		2 x 10 l	105.40	10.54
Dexa Pro NUOVO		Prodotto speciale		
0.7% N; 0.5% P_2O_5; 28% MO				
Soluzione a base di un estratto del legno di castagno.				
Per influenzare la capacità di scambio dei cationi, per migliorare la tolleranza delle colture al sale e per compensare il ferro contro la clorosi.				
Pieno campo: 0.7 - 1 l/100 l di acqua. ***Serra:*** 0.6 - 0.7 l/100 l di acqua. ***Irrigazione:*** 0.5 - 1 l/1000 m^2	11932	5 l	153.50	30.70
		4 x 5 l	153.—	30.60
Drososan (Trappola) **+ Fruit Fly Attractant** (Sostanza di richiamo)		Prodotto speciale		
Trappola specialmente concepita contro la mosca delle ciliegie (Drosophila suzukii).				
Trappola: ***Per controllo del volo:*** 1 - 2 trappole/1000 m^2 ***Per catture massali:*** 7 - 20 trappole/1000 m^2	12010	1 Trappola	12.80	
Fruit Fly Attractant: sostanza di richiamo.	12435	5 l	54.70	
		4 x 5 l	54.20	

Carbyc Fungicida naturale per l'orticoltura, frutticoltura, viticoltura e piante ornamentali

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Fence N BIO TEAM BF		Prodotto speciale		
5.71% Azoto organico				
Azoto organico in soluzione a base di estratti di piante.				
Impiego per trattamento fogliare				
Frutticoltura: 2 - 3.5 l/ha a seconda del bisogno, ripetere frequentemente.				
Orticoltura, Piante ornamentali: 1.5 - 3 l/ha a seconda del bisogno, ripetere frequentemente.	12112	1 l	61.20	61.20
		12 x 1 l	58.—	58.—
Orticoltura, (colture prottete): 1.5 - 3 l/ha a seconda del bisogno, ripetere frequentemente.	12113	5 l	272.50	54.50
		4 x 5 l	272.—	54.40
Final K TEAM BF		Prodotto speciale		
47% K_2O, 4.6% N				
Concime liquido molto concentrato, per provvedere all'alimentazione in potassa delle piante.				
Impiego: 3 - 5 l/ha a secondo del bisogno. Ripetere più volte durante la stagione.	12189	5 l	62.10	12.42
2 volte x 3 l/ha per rafforzare le pareti delle cellule del culmo dei cereali BBCH 31/39.		4 x 5 l	61.60	12.32
	12190	20 l	230.—	11.50
Fosfix plus BIO TEAM BF		Prodotto speciale		
$1x10^9$ KBE/ml Bacillus aryabhattai MVY-004				
Preparazione batterica per aumentare il fosforo disponibile per le piante.				
Impiego: 1 - 5 l/ha prima o dopo la semina.	12402	10 l	276.—	27.60
Utilizzare Fosfix plus in miscela con Penergetic.		2 x 10 l	275.—	27.50
Harvel BIO TEAM BF NUOVO		Prodotto speciale		
1.6% N, 30% OS				
Estratto di lievito per la fertilizzazione del terreno.				
Orticoltura, fragole, fiori, piante verdi: 5-10 l/ha prima o dopo la semina.				
Frutta, viti, rose, alberi e arbusti: 5-10 l/ha alla rottura delle gemme su terreno umido.				
Colture in vetro o plastica: 1-3 l/1000 m^2; annaffiare prima o dopo la semina.	12554	5 l	133.60	26.72
		4 x 5 l	132.50	26.50
HBR TEAM BF				
0,1 % Homobrassinolide				
Biostimolatore che serve a incrementare la crescita e ottimizzare il rendimento delle colture.				
Orticoltura, frutta a nocciolo, viticoltura: 1 l/ha a inizio crescita per aumentare l'incremento della coltura con condizioni fresche.				
1 l/ha in primavera, prima della fioritura per massimizzare il numero dei fiori.				
1 l/ha dopo la fioritura per migliorare la messa a frutto.				
1 - 2 l/ha ad inizio invaiatura dei frutti per migliorare la qualità degli stessi.				
1 l/ha prima della raccolta per ottimizzare una regolare maturazione dei frutti.	12555	0,5 l	112.50	225.—
		12 x 0,5 l	112.—	224.—
Hi-Grow BIO TEAM BF NUOVO		Prodotto speciale		
6.3 % org. N, 30.9 % TS				
Soluzione organica di fertilizzante azotato a base di estratto di Cannabis sativa.				
Campicoltura, orticoltura, frutta a granella e piante ornamentali: 1% (4 l/ha), applicazione fogliare. Trattamento a intervalli di 7-14 giorni.				
Frutta a nocciolo, bacche e vigna: 1% (5 l/ha), Applicazione fogliare. almeno 2 trattamenti a intervalli di 7 giorni l'uno dall'altro.	12564	5 l	75.90	15.18
Alberi e arbusti: 1% (8 l/ha), Applicazione fogliare.		4 x 5 l	75.40	15.08
Trattamento pianto 12563		10 l	148.50	14.85
per pianto: 1% (50 ml in 5 lt d'aqua), Applicazione fogliare.		2 x 10 l	148.—	14.80

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
HORIVER Dry		Prodotto speciale		
Tavola cromotropica di colore giallo: Nesidiocoris tenuis. Blu: tripidi, bianco: Lygus spp. Disponibili in varie dimensioni.	10x25 cm 20x25 cm 40x25 cm	12 pezzi 22 pezzi 12 pezzi	prezzo su richiesta o in shop.	
HORIVER Wet		Prodotto speciale		
Trappola cromotropica di colore giallo: mosche bianche, blu: tripidi, nero: Tuta absoluta. Rosso: Drosophila suzukii, bianco: Lygus spp., verde: Echinothrips americanus. Disponibili in varie dimensioni.	10x25 cm 20x25 cm 40x25 cm	12 pezzi 22 pezzi 12 pezzi	prezzo su richiesta o in shop.	
Invelop F		Prodotto speciale		
100% Talco (E553b)				
Barriera fisica contro il colpo di sole e contro parassiti in frutticoltura.				
Frutticoltura: 10 - 15 kg/ha a partire dallo stadio BBCH 41. ***Viticoltura:*** 12.75 kg/ha a partire dallo stadio BBCH 20.	12565	25 kg	105.20	4.21
Kickstart		Prodotto speciale		
0.2 % Fe, 0.11 % Mn, 0.1 % Zn, come complesso d'acidi eptagluconico con acidi fulvici.				
Complesso di concimi liquidi per favorire la partenza delle colture.				
Bacche: 60 - 90 ml/ha, Applicazione fogliare, diverse volte secondo il bisogno.				
Campicoltura: 90 - 150 ml/ha, Applicazione fogliare, diverse volte secondo il bisogno.				
Colture orticole: 90 - 150 ml/ha a partire dalla piantagione o dalla levata della coltura.				
Frutticoltura: 120 - 300 ml/ha. Applicazione fogliare, diverse volte secondo il bisogno. 250 ml/400 l d'acqua e dare 5 l per albero. (umidificare bene il terreno).				
Viticoltura: 60 - 120 ml/ha. Applicazione fogliare a partire dalla germogliazione.	12605	5 dl	68.80	137.60
		12 x 5 dl	65.30	130.60
Piante ornamentali: 90 - 150 ml/ha. Applicazione fogliare, diverse volte secondo il bisogno.	12606	1 l	127.—	127.—
250 ml/400 l d'acqua per irrigazione.		12 x 1 l	124.50	124.50
150 ml/ha irrigazione goccia a goccia, diverse volte secondo bisogno.	12607	3 l	365.—	121.67
		4 x 3 l	363.—	121.—
Level 2				
8,5 % Zinco (Zn) come sale ammonio, GHS05				
Concime di partenza per colture da campo sotto condizioni da stress, come siccità, terreni costipati o semina diretta. Migliora il sistema radicale, la crescita come pure la resa. Viene assorbito dalle foglie e dalle radici.				
Campicoltura, Frutticoltura, Viticoltura, Tabacco, Pomodori	12790	1 l	44.30	44.30
Prati a trifoglio: 0.8 l/ha		12 x 1 l	42.—	42.—
Granoturco, Orticoltura: 1.2 l/ha	12791	5 l	199.90	39.98
Barbabietole da zucchero: 1.4 l/ha		4 x 5 l	199.40	39.88
LiqHumus® 16 18		Prodotto speciale		
0,2 % N, 3 % K, 0,3 % Fe				
Prodotto liquido organico minerale completamente solubile, a base di acidi umici per migliorare la struttura del terreno.				
Frutticoltura, Orticoltura (colture protette): 35 - 45 l/ha 5 - 10 l/ha durante la stagione.				
Orticultura (colture all'aperto): 25 - 30 l/ha 5 - 10 l/ha durante la stagione e per applicazione.				
cereali, patate, legumi: 25 - 30 l/ha 5 - 10 l/ha durante la stagione e per applicazione.	12871	5 l	61.90	12.38
Vivai, piante ornamentali, erba: 35 - 45 l/ha		4 x 5 l	61.40	12.28
5 - 10 l/ha durante la preparazione del substrato.	12872	20 l	239.70	11.98

Kickstart **Assegna all'avvio della coltura una spinta**

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Magna Bon		Prodotto speciale		
5 % rame, 4.27 % zolfo				
Soluzione fertilizzante a base di rame e zolfo, solubile in acqua.				
	12910	1 l	50.30	50.30
		12 x 1 l	47.80	47.80
Impiego: 0.5 - 2 l/ha. Ripetere il trattamento secondo necessità.	12911	5 l	185.60	37.12
Miscele con quasi tutti i prodotti possibili.		4 x 5 l	185.10	37.02
MaxMan 400				
400 g/l Manganese (Mn) sotto forma di nitrato; GHS05, 07, 08, 09				
Concime fogliare liquido per trattare le carenze. in manganese.				
Campicoltura, Colture orticole, Frutticoltura: 1 l/ha solo o in mescolanza ai trattamenti fitosanitari.	13020	5 l	160.40	32.08
Trattamento ripetuto se necessario.		4 x 5 l	159.90	31.98
Micro Bor				
15 % Bor como complesso; GHS05, 07, 08,				
Concime fogliare liquido per applicazione preventiva e per correzione di carenze da boro, in frutticoltura, viticoltura, colture orticole e in campicoltura.				
Campicoltura, colture orticole, frutticoltura e viticoltura: 1 - 3 l/ha secondo analisi del terreno.	13060	5 l	83.70	16.74
Utilizzare solo o in complemento ai trattamenti fitosanitari usuali.		4 x 5 l	83.20	16.64
Noctudor		Prodotto speciale		
1.6% N, 17.4 % materia organica.				
Concime organico a base di azoto e d'estratto di alghe brune, per la biostimolazione.				
In pieno campo: 2 - 4 l/ha a intervalli di 7- 14 giorni secondo necessità.				
Colture sotto vetro o plastica: 0.2 - 0.3 l/100 l di acqua.	13266	5 l	188.80	37.76
Applicare a intervalli di 7 - 14 giorni secondo necessità.		4 x 5 l	188.30	37.66
Olimag® 30		Prodotto speciale		
5 % MgO, 10 % SO_3: GHS05				
Solfato di magnesio in soluzione, per concimazione fogliare.				
Impiego: Tutte le colture: 2 - 4 l/ha (0.4 - 0,8 %) in 200 - 500 l di acqua.	13330	5 l	180.40	36.08
Ripetere il trattamento a seconda del bisogno.		4 x 5 l	179.90	35.98
Olio minerale				
830 g/l Olio di paraffina; GHS08				
Olio di paraffina come ausiliare al trattamento per aumentare l'efficacia degli erbicidi.				
	12560	1 l	10.80	10.80
		10 x 1 l	10.20	10.20
Porro, cipolle, mais, barbabietola da zucchero:	12561	5 l	43.10	8.62
1 - 5 l/ha. Non adoperare per tempo molto caldo.		4 x 5 l	42.60	8.52
Vogliate confrontare le raccomandazioni per le	12562	10 l	82.20	8.22
preparazioni individuali.		2 x 10 l	81.70	8.17
Ortiga		Prodotto speciale		
100 % Estratto di ortiche				
Estratto di piante contro pidocchi, bruchi, ragni rossi e gialli, e malattie da fungo (peronospora, oidio, alternaria, monilia e botrite).				
	13413	5 l	236.80	47.36
Impiego: 5 - 7 l/ha seconda dell'agente patogeno.		4 x 5 l	235.80	47.16
Penergetic® 28 b terreno		Prodotto speciale		
Per un persistente miglioramento della fertilità del terreno.				
Colture annuali: 500 g/ha prima della lavorazione del terreno e della semina.				
Colture perenni: 300 g/ha prima del germogliamento.				
300 g/ha dopo il raccolto prima della caduta delle foglie.				
	13433	200 g	14.60	73.—
L'impiego di Penergetic® b, è consigliato nel sistema con Penergetic® p,		10 x 200 g	13.90	69.50
per il trattamento di piante. Non mescolabile con Penergetic® p!	13434	2,5 kg	110.70	44.28
Il tempo di attesa tra Penergetic® b e p è di almeno 14 giorni.		6 x 2,5 kg	110.20	44.08

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Penergetic® 28 b Melassa				
Per un persistente miglioramento della fertilità del terreno.				
Impiego: 0.4 l/ha prima della lavorazione del terreno e della semina. 0.4 l/ha dopo il raccolto.	13482	2,5 l	110.70	44.28
		4 x 2,5 l	110.20	44.08
L'impiego di Penergetic® b, è consigliato nel sistema con Penergetic® p, per il trattamento di piante.	13483	10 l	416.—	41.60
		2 x 10 l	415.—	41.50
Penergetic® 28 b V V		Prodotto speciale		
Polvere di roccia per il trattamento del suolo e delle piante.	13487	2,5 kg	130.20	52.08
Applicazione: 800 g/ha in caso di bisogno.		6 x 2,5 kg	129.20	51.68
Penergetic® 28 b WV		Prodotto speciale		
Per proteggere le colture da animali selvatici.	13485	2,5 kg	110.70	44.28
Impiego: 600 g/ha in 200 - 500 l d'acqua. È possibile mescolarlo Possibile l'impiego durante tutta la stagione.		6 x 2,5 kg	110.20	44.08
	13486	10 kg	415.—	41.50
Penergetic® 28 p Campicoltura		Prodotto speciale		
Stimola il sistema immunitario delle piante. Specialmente sviluppato per la campicoltura.				
Trattamento fogliare: usare 100 - 250 g/ha a distanze regolari (1 - 5 trattamenti).				
Trattamento sementi: 20 -200 g/50 kg di semente	13443	200 g	17.90	89.50
		10 x 200 g	17.20	86.—
Penergetic® p campicoltura è consigliato usarlo nel sistema con Penergetic® b, per il trattamento del terreno.	13444	2,5 kg	130.20	52.08
		6 x 2,5 kg	129.20	51.68
Penergetic® 28 p Frutticoltura		Prodotto speciale		
Per stimolare il sistema immunitario delle piante. Sviluppato specialmente per la frutticoltura.				
Impiego: 250 g/ha all'inizio del germogliamento. 4-8 trattamenti a regolare intervalli.	13435	200 g	17.90	89.50
		10 x 200 g	17.20	86.—
Penergetic® p frutticoltura è consigliato usarlo nel sistema con Penergetic® b per il trattamento del terreno.	13436	2,5 kg	130.20	52.08
		6 x 2,5 kg	129.20	51.68
Penergetic® 28 p Melassa				
Per stimolare il sistema immunitario delle piante.				
Impiego: 0,1 - 0,25 l/ha non appena la coltura emerge. Applicare a intervalli regolari.	13490	2,5 l	129.70	51.88
		4 x 2,5 l	129.20	51.68
L'impiego di Penergetic® p è consigliato nel sistema con Penergetic® b per il trattamento del terreno.	13491	10 l	416.—	41.60
		2 x 10 l	415.—	41.50
Penergetic® 28 p Orticoltura		Prodotto speciale		
Serve a stimolare il sistema immunitario delle piante. Specialmente sviluppato ad uso per l'orticoltura.				
Impiego: 250 g/ha all'inizio della coltura. 4 - 8 trattamenti a distanza regolare.	13445	200 g	19.60	98.—
		10 x 200 g	18.60	93.—
Penergetic® p orticoltura, è consigliato usarlo nel sitema con Penergetic® b, per il trattamento del terreno.	13446	2,5 kg	136.80	54.72
		6 x 2,5 kg	136.30	54.52

Hi-Grow per un croccante raccolto

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Penergetic® 28 p Viticoltura		Prodotto speciale		
Serve a stimolare il sistema immunitario delle piante. Sviluppato specialmente per la viticoltura.				
Impiego: 250 g/ha all'inizio del germogliamento. 4 - 8 trattamenti a regolare intervalli.	13437	200 g	17.90	89.50
		10 x 200 g	17.20	86.—
Penergetic® p viticoltura è consigliato usarlo nel sistema con Penergetic® b per il trattamento del terreno.	13438	2,5 kg	130.20	52.08
		6 x 2,5 kg	129.20	51.68
Perlhumus® 16		Prodotto speciale		
1,26 % N, 2,98 % Ca, 1,18 % S				
Concime naturale granulato a base di materie organiche per migliorare la qualità e produrre humus nel terreno.				
Impiego: Trattamento totale della superficie 150 - 400 kg/ha. Trattamento del substrato 10 - 15 kg/m³	13447	20 kg	35.40	1.77
Pidel NUOVO		Prodotto speciale		
1.4% N, 0.5% S, 30% OS				
Estratto di alghe marine con zolfo per la concimazione fogliare.				
Ortaggi, piccoli frutti: 4 l/ha a intervalli di 7-14 giorni. ***Colture in serra o plastica:*** 0,4 l/100l di acqua; applicare a intervalli di 7-14 giorni; non applicare a temperature superiori a 25°C.	13494	5 l	138.20	27.64
		4 x 5 l	137.50	27.50
Polygrün		Prodotto speciale		
100 % estratto di alghe di Ascophyllum nodosum				
Stimolatore biologico per le fasi critiche dello sviluppo delle piante e per evitare lo stress della crescita.				
Trattamento fogliare: 1.5 - 3 l/ha ripetutamente durante la stagione. ***Trattamento al terreno:*** 10 - 30 l/ha ***Trattamento della semente:*** 0.2 - 1 l/ 100 kg di semente ***Trattamento del substrato:*** 3 - 5 l/m³	13508	5 l	210.10	42.02
		4 x 5 l	209.60	41.92
Polygrün Blüte		Prodotto speciale		
4 % N, 5 % MgO, 10 % SO_3, 0,9 % B, 0,2 % Mo				
Polygrün Blüte è un concime liquido a base di alghe, arricchito con azoto specialmente sviluppato per l'impiego durante la fase di fioritura.	13511	5 l	120.30	24.06
Impiego: 1,5-3 l/ha diverse volte durante la stagione.		4 x 5 l	119.80	23.96
Prestop® 29 WP				
32 % Gliocladium catenulatum				
Fungicida biologico per colture di bacche, orticoltura, viticoltura e piante ornamentali.				
Fragole: 0,5 % contro marciumi. Trattare allo stadio BBCH 60-73. ***Viticoltura:*** 0,167 % (2 kg/ha) contro il marciume. Impiego: ultimo trattamento stadio 67-85 (BBCH), al più tardi, metà agosto. ***Cetriloli, peperoni e pomodori:*** 0,5% contro marciumi. Trattare allo stadio BBCH 15-89. ***Cetrioli:*** 1% contro la cladosporiosi. ***Colture di fiore e piante verdi:*** 0,5% annaffiare contro funghi patogeni del terreno come Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia. ***Cetrioli, peperoni e pomodori (allevamento di giovani pianti):*** 0,5% annaffiare contro funghi patogeni del terreno. ***Erbe culinarie, colture di fiori, piante verdi (allevamento di giovani piante):*** 500 g/m³. Mescolare con il substrato; contro funghi patogeni del terreno.	13537	1 kg	95.20	95.20
		5 x 1 kg	93.40	93.40

Prodotti Bioforma

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Quiz		Prodotto speciale		
0.2 % Estratto di erba cavallina (Estratto di Equisetum)				
Promuove la resistenza delle piante contro le malattie.				
Piccoli frutti: 0.225 l/100 l, contro l'oidio, botrite, colletotrichum, marciume radicale rosso (P. fragariae).				
Campicoltura: 0.225 l/100 l, contro l'oidio, alternaria e peronospera della patata.	13610	5 l	126.—	25.20
Frutticoltura: 0.2 l/100 l, contro l'oidio, ticchiolatura, bolla del pesco.		4 x 5 l	125.50	25.10
ROLLERTRAP		Prodotto speciale		
Tavola cromotropica di colore giallo per il controllo della mosca bianca, cocciniglie, afidi, tripidi e moscerini della frutta.				
Impiego: 1 Rollertrap/1000 m^2	15225	5 cm x 100 m	32.50	
Sambesi		Prodotto speciale		
5% Chitosanhydrochlorid				
Promuove la reistenza naturale delle piante contro le malattie da fungo e contro i batteri.				
Fragole, frutticoltura e viticoltura: 2 - 16 l/ha, tratamento fogliare. Più volte a seconda del bisogno.				
Campicoltura, orticoltura, piante ornamentali: 2 - 8 l/ha, tratamento fogliare. Più volte a seconda del bisogno.				
Cereali, barbabietole, patate: 1 - 4 l/100 l, per trattamento semente.	13897	5 l	146.30	29.26
		4 x 5 l	145.80	29.16
Siltac® 5 plus		Prodotto speciale		
Polimeri di silicone; GHS07, 09				
Controllo fisico contro insetti come: afidi, mosca bianca, tripidi, cocciniglie, eriofidi, tentredini della mela, acaro della ruggine.				
Frutta a granella, a nocciolo, e colture di bacche: 0,12% - 0,15% in 500-800 l aqua/ha.				
Pere: 0,1%				
Campicoltura: 0,15%				
Cetrioli: 0,1%				
Pomodori, peperoni e melanzane: 0,05-0,07%				
Altri ortaggi: 0,1-0,15%	13914	1 l	78.—	78.—
Piante ornamentali: 0,1-0,15%		12 x 1 l	75.90	75.90
Rose: 0,1%	13915	5 l	354.—	70.80
Piante verdi: 0,05%		4 x 5 l	353.—	70.60
Spray-Oil 7-E				
830 g/l olio di paraffina; GHS08				
Per trattamenti invernali e al germogliamento.				
Colture di bacche: 3,5% contro cocciniglie, sfogliatrice degli alberi da frutto, acari, prima del germogliamento.				
Frutticoltura: Impiego allo stadio B-C 3,5%, C3-D 2%, D3-E 1 % contro sfogliatrici, afidi succhiatori, cocciniglie, ragno rosso, cocciniglia di San-José.				
Viticoltura: Impiego allo stadio D: 2% contro il ragnetto rosso. Effetto secondario contro erinosi e acariosi.				
Patate da seme: 2 % (7 l/ha in 350 l di acqua) contro gli afidi che propagano i virus.				
Piante ornamentali: 3,5% contro cocciniglie, afidi succhiatori, ragno giallo dei giardini, sfogliatrici prima del germogliamento.	13960	10 l	61.90	6.19
	13961	25 l	17.80	4.71

Prestop® WP

Fungicida biologico per coltivazione di bacche, viticoltura, ortaggi e piante ornamentali

Fungo patogeno Rhizoctonia solani

Prestop® con il suo fungo: Clonostachys rosea



Prodotti Bioforma

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
S-System			Prodotto speciale		
1% Manganese, 1 % Zinco, Concime a base di microelementi					
Concime liquido a base di microelementi per applicazione fogliare e per impiego con i sistemi di irrigazione.					
Piccoli frutti, campicoltura, orticoltura, frutticoltura, viticoltura e piante ornamentali:	0.15 - 0.5 l/100 l d'aqua, diverse volte se necessario.	13984	5 l	122.90	24.58
	2 - 3 l/ha per trattamento al terreno con sistemi di irrigazione.		4 x 5 l	122.40	24.48
Terrasan			Prodotto speciale		
Microorganismi effettivi					
Microorganismi effettivi che servono ad aumentare l'attività microbiologica e migliorare la struttura del terreno.					
Nel caso di un primo impiego con molti resti organici del raccolto oppure con terreno molto costipato 3-5 l/ha. Per utilizzazione a lungo termine e pochi resti organici 1,5-2,5 l/ha. **Non mescolare con prodotti che contengono rame.**		14068	5 l	179.50	35.90
			4 x 5 l	179.—	35.80
Vista					
505 g/l Acidi grassi in C7-C18 sotto forma di sale potassico; GHS07					
Insetticida per lottare contro gli afidi, gli acari e le mosche bianche.					
Bacche:	2 % (20 l/ha) contro gli afidi e gli acari.	14111	5 l	84.90	16.98
Frutticoltura:	1.25 % (20 l/ha) contro gli afidi e gli acari.		4 x 5 l	83.10	16.62
Colture orticole:	2 % (20 l/ha) contro gli afidi, acari e mosche bianche.	14112	20 l	275.40	13.77
Piante ornamentali:	2 % contro gli afidi, acari e mosche bianche.	14118	200 l	2577.—	12.88
Vital			Prodotto speciale		
Microorganismi effettivi					
EM – Microorganismi effettivi per terreni forti e piante esuberanti.					
Impiego:	trattare le colture 2-3 volte a stagione con 1 l/ha. Mescolabile con gli usuali prodotti fitosanitari ad **eccezione del rame.**	14117	5 l	168.60	33.72
			4 x 5 l	168.31	33.66
Winsum					
95 % Olio di colza					
Olio vegetale contro parassiti nelle patate e nelle piante ornamentali.					
Patate (produzione tuberi da seme):	2 - 3 % (10 - 15 l/ha in 500 l acqua) contro gli afidi che propagano i virus.	14121	1 l	16.40	16.40
			12 x 1 l	15.60	15.60
Piante ornamentali:	2 % contro cocciniglia nera del caffè con effetto secondario contro afidi, sfogliatrici, ragno rosso e altri.	14122	5 l	55.60	11.12
			4 x 5 l	53.60	10.72
		14123	20 l	205.—	10.25
XenTari® 22 WG					
54 % B.t. aizawai					
Insetticida contro i bruchi.					
Fragole, Mirtillo, Mini Kiwi, Specie di Ribes, Specie di Rubus:	0.1 % (1 kg/ha), contro nottue.				
Frutticoltura:	0.1 % (1.6 kg/ha), contro tignole, falene, sfogliatrici.				
Viticoltura:	0.1 % (1.2 kg/ha), contro la tignola della vite				
Colture orticole:	0.1 % (1 kg/ha),) nottue del cavolo, mosca bianca del cavolo, cavolaia maggiore, tignola delle cipolle, piralide del mais, tignola del pomodoro. Periodo di attesa in colture orticole: pieno campo 1 settimana; in serra 3 giorni.				
Tabacco:	1 kg/ha contro le nottue.				
Piante ornamentali:	0.1 % contro le nottue.	14130	500 g	51.60	103.20
Vivai forestali:	0.1 % contro le nottue.		12 x 500 g	50.50	101.—

XenTari®

Insetticida biologico altamente attivo a base di Bacillus thuringiensis var. aizawai per il controllo dei bruchi nelle colture orticole

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Absolut™					
75 g/l Bixafen, 150 g/l Prothioconazole; GHS07, 08, 09					
Fungicida sistemico combinato.					
Frumento:	1.25 l/ha contro il mal del piede dei cereali, la septoriosi, elmintosporiosi (DTR), la ruggine bruna, l'oidio, la fusariosi delle foglie, la ruggine gialla.				
Grano duro:	1.25 l/ha contro elmintosporiosi, odio, septoriosi.				
Orzo:	1 l/ha contro elmintosporiosi, la rincosporiosi, la ramularia, la ruggine nana e l'oidio.				
Spelta:	1 l/ha contro la septoriosi, la ruggine bruna e l'oidio.				
Segale:	1.25 l/ha contro la septoriosi, la rincosporiosi, la ruggine bruna e l'oidio.	10900	1 l 12 x 1 l	87.20 84.60	87.20 84.60
Triticale:	1.25 l/ha contro la septoriosi, la ruggine bruna, l'oidio e la ruggine gialla.	10901	5 l 4 x 5 l	412.— 408.50	82.40 81.70
Acramite ®3 480 SC					
480 g/l Bifenazate; GHS07, 08, 09					
Acaricida per la lotta contro gli acari.					
Fragole:	0.25 l/ha contro i ragnetti gialli. Trattamento a partire dall'infestazione. Periodo d'attesa: 3 giorni.				
Melanzane, cocomeri, Peperoni, pomodori:	0.25 l/ha contro tutti i tipi di acari. Trattamento a partire dall'inizio dell'infestazione. Periodo di attesa: 3 giorni.				
Piante ornamentali (in serra):	0.2 l/ha contro i ragnetti.	10950	250 ml 10 x 250 ml	460.— 458.—	
Agil ®23					
100 g/l Propaquizafop; GHS07, 08, 09					
Erbicida contro le graminacee.					
Colture di bacche Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, Selvicoltura: piante ornamentali:	Graminacee annuali: 1 - 1.25 l/ha	11014	1 l	77.40	77.40
	Ricacci di cereali: 1.25 l/ha		10 x 1 l	75.80	75.80
	Sorgo halepense: 1 - 1.5 l/ha	11018	5 l	351.30	70.26
	Gramigna: 1.75 - 2.5 l/ha		4 x 5 l	350.80	70.16
	Gramigna: 1.75 - 2.5 l/ha	11017	10 l	677.50	67.75
	Poa annua: 2.5 l/ha (fino allo stadio 3 foglie).		2 x 10 l	676.90	67.69
Amilon 5					
5% Metaldeide					
Esca granulata pressata a umido contro le lumache.					
Colture di bacche, frutticoltura, viticoltura, colture orticole, campicolture, piante ornamentali:	7 kg/ha	11053	25 kg	167.—	6.68
Antischiuma liquido					
Impiego: per evitare la formazione di schiuma all'interno della botte di trattamento.		11060	200 ml 10 x 200 ml	22.60 21.50	113.— 107.50
Asulam LG					
400 g/l Asulam; GHS07, 09					
Erbicida contro il romice, il romice alpino e la felce.					
Frutticoltura, Campicoltura:	3.5 - 4 l/ha in 600 - 800 l di acqua/ha.				
	6 l/ha contro la felce maggiore e felce maschio in prati e pascoli.				
	6 - 8 l/ha contro romice alpino.				
	Protegge il trifoglio e graminacee.	11120	5 l	115.50	23.10
	L'aggiunta di 2 - 4 l/ha di concime liquido LG migliora l'efficienza.		4 x 5 l	113.20	22.64
Atlantis®7 Star					
4.5 % Mesosulfuron-méthyl, 2.25 % Thiencarbazone, 0.9 % Iodosulfuron-méthyl-sodium, 13.5 % Méfenpyr-diéthyl, GHS07, 09					
Erbicida sistemico contro le erbe e le infestanti dei cereali. Ottimo effetto contro coda di volpe comune, loglio, pennacchini, bromo dei prati.					
Frumento, triticale:	0.2 - 0.33 kg/ha				
Farro, segale:	0.2 kg/ha	11124	600 g	248.50	414.16
	Utilizzare sempre con l'aggiunta di 1 l/ha di Codacide.		10 x 600 g	247.50	412.50

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Audienz ® 25 BIO *480 g/l Spinosad; GHS09* Insetticida biologico contro i parassiti in frutticoltura, viticoltura, campicoltura, colture orticole e piante ornamentali.				
Impiego e dossagio:				
Bacche: 0.02 % (0.2 l/ha)				
Frutticoltura,				
Noce nostrana: 0.02 % (0.32 l/ha)				
Vigna: 0.0067 - 0.015 % (0.08 - 0.18 l/ha)				
Colture orticole: 0.005 - 0.36 % (0.05 - 0.4 l/ha)				
Campicoltura: 0.05 - 0.2 l/ha		—		
Piante ornamental: 0.03 - 0.08 % (0.3 - 0.8 l/ha)	11133	0.5 l	313.—	626.—
		10 x 0.5 l	311.50	623.—
Non tutte le colture sono adatte alla produzione biologica, vedi la lista	11135	3 l	1848.—	616.—
delle aziende agricole FIBL!		4 x 3 l	1842.—	614.—
Avero *50 g/l Pinoxaden, 12.5 g/l Cloquintocet-mexyl; GHS07, 08, 09* Erbicida sistemico contro coda di volpa comune, agrostide comune, loglio comune, avena selvatica, miglio comune, poa comune.				
	11130	1 l	60.80	60.80
Spelta, farro, orzo, grano duro, segale, triticale, frumento:		10 x 1 l	57.70	57.70
0.6 - 0.9 l/ha in autunno	11131	5 l	239.30	47.86
0.9 - 1.2 l/ha in primavera.		4 x 5 l	238.80	47.76
Aviso *70 % Metiram; GHS07, 08, 09* Fungicida di contatto contro le malattie in viticoltura e nelle patate.				
Patate: 3 kg/ha contro l'Alternaria e la peronospora tardiva. Miscibile con Proxanil e Revus.				
Vigna: 1.6 kg/ha contro escoriosi; 3.2 kg/ha contro peronospora, rossore parassitario e "Black-rot" o marciume nero.	11136	10 kg	226.—	22.60
Bacchus® *190 g/l di rame sottoforma di osssisolfato di rame, 35 g/l Cymoxanil; GHS07, 09* Fongicida parzialmente sistemico.				
Vigna: 0.3 % (4.8 l/ha) contro la peronospora.	11140	10 l	388.50	38.85
Dopo la fioritura, al massimo fino a metà agosto.		2 x 10 l	388.—	38.80
Betam LG *157 g/l Phenmedipham; GHS07, 08, 09* Erbicida contro le malerbe annuali.				
Barbabietole da foraggio e da zucchero: 6 l/ha (trattamento split: barbabietole rosse 3 l + 3 l dopo ca. 5 - 8 giorni). Efficace contro malerbe annuali.				
Barbabietole per insalata: Trattare allo stadio di cotiledone fino a 4 foglie delle malerbe annuali. Aggiuntere 0.5 - 2 l/ha di olio minerale per rinforzare l'efficacia nelle fasi avanzate e a basse temperatura.				
Spinaci: 1 - 2 l/ha allo stadio cotiledone delle infestanti. (solo su colture sane).				
Fragole: 2 x 3 l/ha trattamento split	11300	5 l	205.70	41.14
(vedere il piano di trattamento delle fragole).		4 x 5 l	205.20	41.04
Beta Star *100 g/l Ethofumesate, 80 g/l Phenmedifam; GHS07, 08, 09* Erbicida contro le erbe infestanti nella barbabietola da zucchero, nella barbabietola da foraggio e nella barbabietola d'insalata.				
Barbabietole da zucchero e da foraggio: 1.5 - 6 l/ha in post-emergenza della coltura e delle malerbe. Trattamento split possibile. Miscibile con Goltix 700, Spark, Frontier X2 e Zeppelin.	11332	5 l	115.90	23.18
		4 x 5 l	114.10	22.82

Beta Star **Erbicida contro le erbe infestanti nella barbabietole da zucchero e da forragio**

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Bion® 21					
50 % Acibenzolar-S-methyl; GHS07, 09					
Attivatore sistemico delle piante. Induce il sistema di difesa naturale delle piante contro le infezioni da fungo, da batteri e da virosi.					
Alberi a granella:	20 - 40 g/ha contro il fuoco batterico.				
Colture orticole:	20 - 60 g/ha contro l'oidio e le malattie delle foglie.				
	Periodo di attesa: 1 settimana.	11370	60 g	54.70	
Frumento:	60 g/ha contro l'oidio.		20 x 60 g	51.90	
Blackex					
90 g/l MCPA, 9,4 g/l Dicamba; GHS09					
Diserbante pronto all'uso di **colore rosso contro le dicotiledoni, in particolare contro il romice, il senecio volgare / erba di San Giovanni.**					
		11440	2,5 l	50.90	20.36
Impiego:	Con la pompa a zaino, massima diluzione1:2.		Box 4 x 2,5 l	49.90	19.96
	con apparecchi per umettazione, con effetto di tamponamento:	11441	5 l	97.20	19.44
	non diluito		4 x 5 l	96.70	19.34
Bogard® 21					
250 g/l Difenoconazole; GHS07, 08, 09					
Fungicida contro le malattie, tali come l'oidio, la ruggine, la moniliosi, la malattia gommosi delle drupacee, alternaria, cercosporiosi, fumaggine, septoriosi, marsoninia, ecc.					
Bacche:	0.05 % (0.5 l/ha)				
Alberi a granella:	0.015 % (0.24 l/ha)				
Alberi a nocciolo:	0.02 % (0.32 l/ha)				
Colture orticole:	0.05 % (0.5 l/ha)				
Vigna:	0.0125 % (0.2 l/ha)	11460	1 l	112.30	112.30
Campicoltura:	0.5 l/ha		12 x 1 l	111.80	111.80
Patate:	0.5 l/ha	11461	5 l	458.30	91.66
Piante ornementali:	0.05 %		4 x 5 l	457.80	91.56
Bolero® 11					
40 g/l Imazamox; GHS09					
Erbicida per il trattamento di pre-e postemergenza per fagioli, soia, piselli da conserva, piselli proteici e fava comune.					
Leguminose:	1 l/ha dopo la semina o allo stadio 2 - 4 foglie delle malerbe.	11480	1 l	87.—	87.—
	Mescolabile con Frontier X2, Effican SG.		10 x 1 l	85.20	85.20
Booster™					
755 g/l Fosfonato di potassio					
Fungicida sistemico per le bacche, arboricoltura, viticoltura, colture orticole e piante ornamentali.					
Fragole:	5 l/ha contro peronospora e il marciume dei rizomi e delle radici.				
Mele:	3.2 l/ha efficacità parziale contro la ticchiolatura.				
Vigna:	3.2 l/ha efficacità parziale contro la peronospora.				
Carciofo, cicoria, zucche, Cocomeri:	3.5 l/ha contro la peronospora.	11487	1 l	30.60	30.60
Melanzane, peperoni:	4 l/ha contro la peronospora.		10 x 1 l	29.10	29.10
Insalate:	3 l/ha contro la peronospora.	11488	5 l	102.50	20.50
Piante ornamentali:	5 l/ha contro la peronospora, funghi patogeni del terreno.		4 x 5 l	102.—	20.40

Atlantis® Star

Il campione assoluto contro le graminacee e dicotiledoni nel frumento e nel triticale

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Cantus ® 11					
50 % Boscalid; GHS09					
Fungicida sistemico.					
Viticoltura:	0.1 % (1.2 kg/ha) contro il marciume grigio(Botrite). Un'applicazione per parcella e per anno prima della chiusura dei grappoli o a inizio invaiatura, ma al più tardi a metà agosto.				
Colza:	0.5 kg/ha contro la sclerotinia. Un unico trattamento dall'inizio fino alla piena fioritura.	11600	200 g	44.60	223.—
			10 x 200 g	42.30	211.50
	0.5 kg/ha contro il cancro delle crucifere a partire dallo stadio di rosetta o in primavera alla ripresa della vegetazione.	11601	1 kg	111.50	111.50
			10 x 1 kg	111.—	111.—
Captan 80 WDG					
80 % Captan; GHS07, 08, 09					
Fungicida di contatto. Granuli solubili nell'acqua, senza polvere.					
Frutticoltura:	0.15 % (2.4 kg/ha) contro la ticchiolatura e le malattie di conservazione degli alberi a granella. Contro le malattie, corineo delle foglie delle drupacee, l'antracnosi e la cilindrosporiosi degli alberi a nocciolo.	11680	1 kg	44.80	44.80
			10 x 1 kg	42.60	42.60
		11684	5 kg	119.90	23.98
		11683	20 kg	474.—	23.70
Celos BIO					
80 % Zolfo					
Fungicida e acaricida con azione curativa contro l'oidio, la gommosi delle drupacee, acaro gallicolo, criofidi, erinosi, acariosi.					
Bacche:	0.2 - 0.4 % come fungicida, 1 - 2 % come acaricida.				
Alberi a granella:	0.3 - 0.75 % come fungicida, 2 % come acaricida.				
Alberi a nocciolo:	0.3 - 0.75 %.				
Vigna:	0.1 - 0.4 % come fungicida, 2 % come acaricida.				
Colture orticole:	0.1 - 0.2 %.	11744	2 kg	15.20	7.60
Campicoltura:	0.25 %.		10 x 2 kg	14.40	7.20
Piante ornamentali:	0.1 - 0.2 %.	11745	25 kg	71.20	2.85
Caravel ® 4					
31 % Clomazone (360 g/l)					
Erbicida residuale contro le malerbe graminacee e a foglia larga annuali.					
Fagioli, piselli proteici, patate, papavero, soia, tabacco, riso:	0.25 l/ha				
Barbabietola da zucchero e foraggio:	0.2 l/ha				
Lupino:	0.3 l/ha				
Colza:	0.2 - 0.33 l/ha				
Legumi:	0.15 - 0.25 l/ha	11707	500 ml	107.80	215.60
	Miscibile con Galipan e Zeppelin.		12 x 500 ml	107.—	214.—
Colza pack 4 ha Galipan + Caravel + Corex					
Galipan: 450 g/l Napropamid; GHS09; Caravel: 31 % Clomazone (360 g/l), Corex: 250 Difenoconazol, 125 g/l Paclobutrazol, GHS08, 09					
Contiene erbicida, regolatore di crescita e fugicida.					
1 pacco contiene: 2 x 5 l Galipan + 2 x 0.5 l Caravel + 2 l Corex		13666	1 Pack	830.—	
Comfort™					
300 g/l Spiroxamine, 160 g/l Prothioconazole; GHS07, 09					
Fungicida sistemico combinato per i cereali.					
Frumento, spelta:	1.25 l/ha contro il mal di piede, l'oidio, la ruggine bruna, la ruggine gialla, la septoriosi delle foglie, la septoriosi della spiga, macchie necrosate delle foglie, e la fusariosi della spiga.				
Orzo:	1.25 l/ha contro l'oidio, l'elmintosporiosi, la rincosporiosi, la ruggine nana, le macchie necrosate delle foglie e la ramularia.				
Segale:	1.25 l/ha contro la rincosporiosi, la septoria delle foglie e la ruggine bruna.	11765	1 l	84.70	84.70
			12 x 1 l	82.20	82.20
Triticale:	1.25 l/ha contro l'oidio, la ruggine bruna, la ruggine gialla, la septoriosi delle foglie e la fusariosi della spiga.	11766	5 l	399.40	79.88
			4 x 5 l	395.40	79.08

Caravel

Erbicida per la campicoltura e l'orticoltura

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Concime liquido LG					
12% N, 4% P_2O_5, 6% K_2O, 0.02% B, 0.01% Cu, 0.01% Mn, 0.005% Mo, 0.005% Zn					
Concime fogliare a complemento dei trattamenti insetticidi e fungicidi.					
		12240	10 l	80.30	8.03
			2 x 10 l	79.80	7.98
Impiego:	0.2 - 0.5 % (2 - 5 l/ha)	12241	Botte 200 l	1263.—	6.31
Condoral SC					
600 g/l Metribuzin; GHS09					
Erbicida di contatto e residuale contro le malerbe dicotiledoni e le graminacee.					
Carote:	0.1 - 0.3 l/ha come trattamento split a partire dall'emergenza della coltura.				
Asparago:	0.75 l/ha prima e dopo il raccolto.				
Pomodori:	0.5 l/ha dopo la piantagione. Utilizzare solo in pieno campo.				
Spelta, farro, segale, Triticale, frumento:	0.2 l/ha. Applicazione: Primavera in post-emergenza BBCH 13-29. Per la segale invernale, trattamento fino allo stadio BBCH 25.				
Patate:	0.5 - 0.9 l/ha in pre-emergenza.				
	0.3 - 0.6 l/ha in post-emergenza.	11781	1 l	80.50	80.50
	Osservare le restrizioni varietali.		12 x 1 l	78.85	78.85
Contra Insect Fliegenspray					
13.3 g/l 1 R-trans-Phenothrin ; 20 g/l Pyrethrum-Extrait (25%), GHS02, 07, 09					
Contro tarme, mosche, zanzare, scarafaggi, coleotteri, formiche ecc. Con testa di polverizzazione da avvitare.					
Insetti rampicanti:	1 cartuccia serve per 200 m^3	11789	300 ml	40.60	
Insetti volanti:	1 cartuccia serve per 1200 m^3		12 x 300 ml	39.10	
Coragen® 20					
200 g/l Chlorantraniliprole; GHS09					
Insetticida sistemico contro la dorifora. Efficace contro le uova, le larve e gli adulti. Protegge le api e gli insetti ausiliari.		11850	180 ml	103.50	
			12 x 180 ml	101.50	
		11851	500 ml	278.50	
Patate:	60 ml/ha contro le dorifore.		12 x 500 ml	278.—	
Corex					
250 g/l Difenoconazol, 125 g/l Paclobutrazol; GHS08, 09					
Fungicida e regolatore per lo sviluppo delle piante.					
Lino:	0.35 l/ha serve ad aumentare la stabilità delle piante contro il marciume dello stelo, la necrosi del colletto e malattie da fungo.				
Colza:	0.5 l/ha per aumentare la resistenza all'allettamento	11761	0,5 l	60.20	120.40
	e contro la necrosi del colletto.		12 x 0,5 l	57.20	114.40
	Applicare in autunno dallo stadio 4 foglie	11762	2,5 l	266.90	106.76
	della coltura o in primavera.		4 x 2,5 l	265.50	106.20
Credo ™					
250 g/l Hexythiazox; GHS09					
Acaricida per la lotta contro gli acari e i ragnetti rossi.					
Fragole, more, lamponi, mirtillo, ribes:	0.4 l/ha (0.04 %) contro il ragnetto giallo.				
Alberi a nocciolo e a granella:	0.32 l/ha (0.02 %) contro il ragno rosso.				
Vigna:	0.32 l/ha (0.02 %) contro il ragno rosso.				
Cucurbitacee, (in serra):	0.32 l/ha (0.032 %) contro il ragno rosso.				
Peperoni, pomodori (in serra):	0,04 %) contro il ragno rosso.				
Luppolo:	0,02% contro i ragnetti.	11855	0,5 l	219.—	438.—
Piante ornamentali:	0,02% contro i ragnetti rossi e gialli.		10 x 0.5 l	218.—	436.—

Corex

Fungicida e regolatore di crescita per lo sviluppo delle piante.

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Cuproxat® 12 liquido BIO *190 g/l Ossisolfato di rame; GHS09*					
Fungicida e battericida. Prodotto a base di rame liquido, esente da cloro.					
Bacche:	0.25 - 0.75 % contro le malattie delle macchie porpuree nelle fragole prima della fioritura e dopo il raccolto. 0.5 - 1.3 % contro le malattie degli steli, nelle more e nei lamponi.				
Frutticoltura:	0.25 - 0.75 % contro la ticchiolatura degli alberi a granella, contro la gommosi delle drupacee e il cancro batterico delle ciliege.				
Viticoltura:	0.25 % (4-10 l/ha) contro la peronospora e il rossore parassitario in miscela al 0.125 % di Folpet 80 WDG. 0.75 % trattamento di copertura fino alla fine di agosto.				
Pomodori e Melanzana:	1.3 - 1.8 % contro l'alternariosi e peronospora dei pomodori, septoriosi dei pomodori e melanzane, cancro batterico dei pomodori e striatura batterica.				
Fagiolo:	5 l/ha contro la scottatura batterica dei fagioli, batteriosi del fagiolo.				
Cocomero:	0.5 % (5 l/ha), contro maculatura angolare fogliare, peronospora della cucurbitacee.				
Carote:	13 - 18 l/ha contro l'alternariosi delle carote.				
Sedano, rapa, Sedano a costa:	13 - 18 l/ha contro la septoriosi del sedano.				
Cavoli:	0.5 % (5 l/ha) contro le nervature nere del cavolo.				
Barbabietole per insalata:	13 - 18 l/ha contro la cercosporiosi e la ramularia.				
Scorzonera:	13 l/ha contro la ruggine bianca della scorzonera.	11860	5 l 4 x 5 l	99.— 98.—	19.80 19.60
Barbabietole zucchero e da foraggio:	5.3 l/ha contro la cercosporiosi e la ramularia.	11861	10 l 2 x 10 l	188.50 188.—	18.85 18.80
Piante ornamentali:	1.3 % contro differenti malattie.				
Cymbal® 14 WG *45 % Cymoxanil; GHS07, 08, 09*					
Fungicida curativo nella vigna e nelle patate.					
Vigna:	0.016% (0.25 kg/ha) contro la peronospora. Impiegarlo in combinazione di 0.1% Folpet. Applicazione dallo stadio 3 foglie fino a metà agosto.				
Patate:	0.25 kg/ha contro la peronospora. Impiegarlo in combinazione di 0.5 l/ha di Cyazofamid (160 g/l) o con 0.4 l/ha Fluazinam (500 g/l).	11890	1 kg 10 X 1 kg	67.70 66.20	67.70 66.20
Cyrano® 7 *50 % Aluminiumfosetyl, 25 % Folpet, 4 % Cymoxanil; GHS07, 08, 09*					
Fungicida sistemico combinato.					
Viticoltura:	0.2 % contro la peronospora con effetto parziale contro oidio, marciume (botrite), black-not e effetto secondario contro il rossore parassitario. Trattamento prima e dopo il fiore, fino a meta agosto al più tardi. 0.2 - 0.25 % trattamento per elicottero. Mescolabile con i nostri fungicidi organici. Non mescolare con prodotti contenenti del rame.	11899	5 kg	181.—	36.20
Deux, 4-D Dicopur *496 g/l 2,4 D; GHS05, 07*					
Erbicida ormonale contro le malerbe a foglia larga, specialmente cardi e convolvoli.					
Frutticoltura:	1.5 l/ha. Contro le malerbe nella coltivazione delle pomacee e drupacee.				
Mais:	1.2 l/ha (solo nella varietà compatibili). altezza massima del mais: 20 cm.				
Cereali:	1.5 l/ha in primavera. Stadio 13-29 (BBCH).	14160	1 l 10 x 1 l	24.60 23.40	24.60 23.40
Prati e pascoli e superfici non coltivate:	0.15 ml/m^2 contro il senecio volgare, trattamento pianta per pianta.	14161	10 l 2 x 10 l	207.— 205.—	20.70 20.50

Cymbal® WG

Fungicida curativo per viti e patate

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Diagonal ® 34					
250 g/l Azoxystrobin; GHS09					
Fungicida per frutta, piccoli frutti, legumi, grandi colture e piante ornamentali.					
Piccoli frutti:	1 l/ha (0.1%) contro le malattie delle foglie e dei frutti.				
Frutta a nocciolo:	1.6 l/ha (0.1%) contro le malattie fogliari e dei frutti.				
Legumi:	0.8-1 l/ha (0.08 - 0.1%) contro le malattie fogliari e dei frutti.				
Grandi colture:	0.75-1 l/ha (0.1%) contro le malattie fogliari e dello stelo.				
Piante ornamentali:	0.1% contro le malattie fogliari e del fiore.	11933	5 l	322.40	64.48
Prato inglese e altri:	1 l/ha contro le malattie delle foglie.		4 x 5 l	321.90	64.38
Dialen ® 21					
480 g/l Dicamba; GHS07					
Erbicida sistemico contro le malerbe incluso il romice e il convolvolo.					
Maggese:	0.5 l/ha contro il romice e il convolvolo in miscela con 5 l/ha Glifonex TF o 4 l/ha Landmaster Supreme 480 TF. Ultima applicazione fine settembre.				
Spelta, farro, orzo, grano duro, frumento:	0.25 l/ha nell'orzo e frumento primaverile. Miscibile con Monitor.				
Mais:	0.3 - 0.5 l/ha come trattamento unico.	11940	1 l	62.30	62.30
	2 x 0.3 - 0.4 l/ha come trattamento in split		12 x 1 l	61.—	61.—
	(non passare 0.75 l/ha in totale).	11941	5 l	245.—	49.—
	Mescolabile con Frontier X2, Equip, Temsa Sc e Rimuron.		4 x 5 l	239.50	47.90
Dosatore graduato					
In polipropilene con scala di misurazione 100 ml.					
		13045	1 l	4.—	
Capacità: 1 litro e 3 litri.		13046	3 l	13.35	
Duplosan ® 12 KV Combi					
350 g/l Mecoprop-P, 160 g/l 2,4 D; GHS05, 07, 09					
Erbicida selettivo contro cardi, romici, aparine, senape dei campi, poligoni, ranuncolo acre, papavero dei campi, centonchio (erba gallina), erba calderina, ecc.					
Alberi a nocciolo e a granella:	2.5 - 3 l/ha contro le malerbe sensibili agli ormoni.				
Cereali:	2.5 - 3 l/ha dallo stadio accestimento fino inizio levata. Mescolabile con Monitor.				
Pascoli e prati:	2.5 - 3 l/ha ha come trattamento di superficie prima della semina di un nuovo prato. 0.5 - 1 % come trattamento localizzato con pompa a spalla. 10 % come trattamento pianta per pianta con l'apparecchio a mano umettante.				
Tappetti erbosi e terreni sportivi:	4 l/ha. Mescolato con un concime liquido, migliora l'efficacia.	12020	10 l	312.30	31.23
			2 x 10 l	311.80	31.18
Effican SG					
87 % Bentazon; GHS 05, 07					
Erbicida di contatto contro le malerbe a foglia larga.					
Fagioli con baccello:	0.5 - 0.8 kg/ha contro malerbe annuali.				
Valeriana, lino, iperico, melissa, menta, digitaria lanata, riso:	1.1 kg/ha, contro malerbe annuali.				
Miscela di trifoglio, erba medica:	1.1 kg/ha, contro malerbe annuali.	12032	500 g	52.50	105.—
Piselli senza baccello, Pisello proteico, soia, lino,			10 x 500 g	49.80	99.60
Cereali:	1.1 kg/ha, contro malerbe annuali.	12033	3 kg	247.—	82.33
Patate, Mais:	0.5 - 1.1 kg/ha, contro malerbe annuali.		4 x 3 kg	245.20	81.73
Equip® 7					
2.34% Foramsulfuron (22.5 g/l), 2.34% Isoxadifen-ethyl; GHS07, GHS09					
Erbicida sistemico contro le malerbe graminacee e a foglia larga nel mais.					
Mais:	1-2 l/ha in post-emergenza contro le malerbe graminacee e a foglia larga annuali e perenni.	12084	3 l	160.80	53.60
	Miscibile con Temsa SC, Frontier X2 e Dialen.		4 x 3 l	159.20	53.07

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Fazor® 3 *60 % Idrazide maleica GHS09* **Regolatore di crescita** per patate e per le colture orticole. ***Patate:*** 5 kg/ha quando i tubercoli che saranno raccolti, hanno raggiunto un calibro superiore a 25-30 mm. **Note applicative vedere pagina 39 Info Fazor!** Serve a sopprimere la germinazione delle patate, durante la conservazione e per controllare i ricacci delle patate nelle colture seguenti (circa 4 settimane prima della raccolta). ***Cipolle, aglio, scalogno:*** 3,5-4 kg/ha per sopprimere la germinazione durante la conservazione. Applicare Fazor alla maturità dei bulbi in generale quando circa il 10 % dei fusti si sono piegati (ca. 2 settimane prima del raccolto).	12110	5 kg 4 x 5 kg	196.30 195.80	39.26 39.16
Ferplus Top *2,4 % Eisen (Fe-EDDHA), 3 % N, 15 % K_2O; GHS07* Granulato a base di ferro celato solubile. Grande efficacia in tutti i tipi di terreno. ***Bacche, colture orticole, viticoltura, piante ornamentali:*** 50-100 kg/ha viticoltura, frutticoltura contro la clorosi ferrica. Applicare da febbraio a marzo. 0.3-0.7 kg/are nei cocomeri e pomodori. Incorporare nel terreno.	12120	5 kg 4 x 5 kg	96.70 96.20	19.34 19.24
Fertilinz® 9 Compresse fertilizzanti usate come aiuto alla crescita per tutte le piante. Le radici crescono direttamente in direzione delle compresse e prendono le sostanze necessarie alla loro crescita. Utilizzabile in selvicoltura, creazione di giardini e parchi, coltivazione di rose, rododendri, ricostruzioni di foreste in altitudine, rimboschimenti dopo caduta di valanghe, vivai e coltivazione alberi di Natale. ***Nuove piantagioni:*** 1 compressa per 30 - 45 cm di altezza della pianta o per cm di diametro del tronco. ***Colture permanenti:*** 2 compresse per specie a crescita lenta, 3-4 compresse per specie a crescita rapida. ***Grandi piante in vaso:*** 2 compresse.	12140	500 T.	211.90	
Fetrilon® 2 -Combi 1 *5,4 % Mg, 4 % Mn, 4 % Fe, 1,5 % Cu, 1,5 % Zn, 0,5 % B, 0,1 % Mo, 0,005 % Co, 3 % S* Concime fogliare speciale. Per evitare le carenze in microelementi. ***Viticoltura:*** 1 - 1.5 kg/ha contro il disseccamento del rachide. 2 - 3 trattamenti, il primo all'inizio dell'invaiatura. ***Campicoltura, frutticoltura e colture orticole:*** 1 kg/ha preventivamente o all'apparizione dei primi sintomi di carenza. ***Impiego:*** Mescolabile con i fungicidi e gli insetticidi. Non usare nelle colture protette (serre, tunnel).	12180	1 kg 16 x 1 kg	58.20 55.20	58.20 55.20
Finy *20 % Metsulfuron-methyl; GHS09* Erbicida contro le infestanti dicotiledoni e le graminacee. ***Cereali:*** in primavera allo stadio BBCH 13-30. 40 g/ha nei cereali seminato in autunno. 25 g/ha nei cereali seminato in primavera. Miscibile con Avero, Flurox, Sprinter, Legacy, Atlantis Star.	12194	60 g 10 x 60 g	80.70 79.—	

Finy

Erbicida contro le infestanti e le graminacee nei cereali.

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Flint® 7 *50 % Trifloxystrobin; GHS07, 09*					
Fungicida a largo spettro, altamente attivo per un controllo prolungato delle malattie.					
Colture di bacche:	200 - 500 g/ha contro le malattie delle foglie e molte altre				
Frutticoltura:	160 - 400 g/ha contro l'oidio e molte altre				
Viticoltura:	160 - 400 g/ha contro la peronospora e molte altre				
Colture orticole:	250 - 400 g/ha contro le malattie delle foglie e molte altre				
Luppolo:	0.025 % contro l'oidio.				
Patate:	250 g/ha contro alternaria.				
Piante ornamentali, rosai:	0.05 % contro le malattie delle macchie nere.				
Tappeti erbosi:	800 g/ha contro l'elmintosporiosi.	12195	1 kg	257.10	257.10
Zucche di ornamento:	500 g/ha contro l'oidio e molte altre.		10 x 1 kg	252.—	252.—
Floramite® 3 240 SC *240 g/l Bifenazate; GHS07, 08, 09*					
Acaricida contro tutti gli stadi dell'acaro giallo.					
Piante ornamentali (Colture in serra):	0.04 % (massimo 600 ml/ha) contro l'acaro giallo. Agisce contro le uova, le larve, le ninfe e gli adulti.	12200	250 ml	253.50	
			20 x 250 ml	252.—	
Flowbrix® 13 BIO *380 g/l I Ossicloruro di rame; GHS09*					
Fungicida liquido contro le malattie da fungo e le batteriosi.		12220	1 l	29.50	29.50
			10 x 1 l	28.10	28.10
Bacche, frutticoltura, vigna, campicoltura, colture orticole, piante ornamentali:	0.1 - 0.4 % contro le malattie da fungo e da batteri sulle foglie e sui frutti.	12221	5 l	127.80	25.56
			4 x 5 l	127.30	25.46
		12222	10 l	242.—	24.20
			2 x 10 l	241.10	24.11
Flurox™ 200 *200 g/l Fluroxypyr; GHS05, 08, 09*					
Erbicida sistemico contro le erbe infestanti, in particolari il caglio aparine.		12232	1 l	55.50	55.50
Cereali:	0.9 l/ha in primavera allo stadio 3 foglie fino allo stadio ultima foglia (BBCH 39). Anche per trattamenti tardivi contro caglio aparine. Miscibile con i soliti erbicidi per cereali.		12 x 1 l	52.90	52.90
		12233	5 l	214.10	42.82
			4 x 5 l	213.60	42.72
Folifert supermix *15 % N, 5 % P_2O_5, 5 % K_2O, 7.3 % MgO, 0.48 % B, 0.6 % Mn, 0.04 % Zn, 0.041 % Cu, 0.12 % Fe, 0.004 % Mo, 7.7 % S*					
Concime fogliare altamente solubile per tutte le colture. Abbassa il pH della poltiglia da irrorare.					
Impiego:	0.4 - 0.8 % (4.1 kg/ha) solo o in mescolanza con gli insetticidi e i fungicidi.	12302	Pacchetto di 6,150 kg	43.—	
Folpet 80 WDG *80 % Folpet; GHS07, 08, 09*					
Fungicida di contatto. Granulato solubile nell'acqua senza polvere.					
Frutticoltura:	0.1 - 0.125 % (1,6 - 2 kg/ha) contro la ticchiolatura, le malattie da conservazione, con efficacia parziale sulla muffa della cecidomia negli alberi a granella (eccetto le pere). Contro il corineo delle drupacee, l'antrancosi e la cilindrosporiosi degli alberi a nocciolo.				
Viticoltura:	0.125 - 0.15 % contro la peronospora, l'escoriosi e marciume bianco degli acini d'uva (fino a metà agosto). Buonissima efficacia secondaria contro la botrite e il rossore parassitario.	12320	1 kg	45.—	45.—
			10 x 1 kg	42.70	42.70
		12321	5 kg	93.50	18.70
Luppolo:	0.25 % contro la peronospora in 1000 - 2000 l d'acqua.	12323	20 kg	365.50	18.27

Floramite® 240 SC

- **Acaricida selettivo**
- **Nuovo modo d'azione**

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Frontier®[11] X2					
720 g/l Dimethenamid-P; GHS 07, 09					
Diserbante combinato contro le graminacee e le erbe infestanti a foglia larga.					
Fagioli con baccello:	1.2 - 1.4 l/ha, applicazione in pre-emergenza.				
Fava:	1.2 - 1.4 l/ha, applicazione in pre-emergenza.				
Barbabietola da	1.4 l/ha trattamento split, BBCH 10 - 12: 0.2 - 0.3 l/ha;				
zucchero e foraggio:	BBCH 14 - 16: 0.5 - 0.9 l/ha.	12420	1 l	61.90	61.90
Mais:	1.2 - 1.4 l/ha, in pre-emergenza fino allo stadio BBCH 13.		12 x 1 l	60.70	60.70
Soia:	1.2 - 1.4 l/ha, applicazione in pre-emergenza.	12421	5 l	272.40	54.48
Girasole:	1.2 - 1.4 l/ha, applicazione in pre-emergenza.		4 x 5 l	271.90	54.38
Galipan					
450 g/l Napropamid; GHS09					
Erbicida residuale selettivo con effetto sistemico contro le malerbe graminacee e a foglia larga.					
Colza:	3 l/ha in pre-emergenza				
Bacche:	2.5 l/ha				
Cavoli:	2.5 l/ha				
Formentino, Rucola:	0.85 l/ha				
Tabacco:	2 l/ha				
Alberi e		12461	5 l	220.—	44.—
Arbusti ornamentali :	2.5 l/ha		4 x 5 l	219.—	43.80
	Miscibile con Caravel e Zeppelin.				
Galipan 3					
187.5 g/l Dimethachlor, 187.5 g/l Napropamid, 30 g/l Clomazone; GHS07, 08, 09					
Diserbante ad ampio spettro contro malerbe a foglia larga e le graminacee nella colza.					
Colza:	3 l/ha in terreni leggeri e medio pesanti.				
	3.5 l/ha in terreni pesanti.				
	Trattamento dopo la semina, prima della germinazione	12463	5 l	199.50	39.90
	della colza. **Osservare le instruzioni PER.**		4 x 5 l	196.30	39.26
Glifonex®[7] TF					
360 g/l Glyphosate; GHS09					
Erbicida sistemico contro graminacee e malerbe a foglie larghe annuali e perenni. Applicazione in colture di bacche, frutta, vitticoltura, ortaggi, campicoltura, piante ornamentali, selvicoltura, terreni non coltivati e quelli a biodiversità.					
Impiego:	In post-emergenza delle malerbe e delle graminacee				
	con 100 - 300 l acqua/ha.				
	2 - 3 l/ha contro le malerbe e graminacee annuali.				
	4 - 10 l/ha contro le malerbe e graminacee perenni.	12488	1 l	23.90	23.90
	1.5 % per i trattamenti pianta per pianta con uno		12 x 1 l	22.70	22.70
	spruzzatore a spalla.	12489	5 l	63.80	12.76
	5-10 % per il trattamento pianta per pianta con		**4 x** 5 l	62.80	12.56
	apparecchi umettanti.	12491	20 l	242.50	12.12
Goltix®[23] compact					
90 % Metamitron; GHS07, 09					
Diserbante residuale e fogliare contro graminacee e malerbe annuali.					
Barbabietole per		12500	1 kg	83.90	83.90
insalata, Barbabietole	3 - 4 kg/ha in pre-emergenza o come trattamento		10 x 1 kg	82.20	82.20
da zucchero e da	frazionato (split). 1 - 1.5 kg/ha per trattamento frazionato	12501	5 kg	401.—	80.20
foraggio:	(split) miscelato con Beta Star / Betam LG e Frontex X2.		4 x 5 kg	399.—	79.80

Frontier X2

Erbicida per la campicoltura

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Goltix® 23 700 SC *700 g/l Metamitron; GHS07, 09* Diserbante residuale e fogliare contro graminacee e malerbe annuali. ***Barbabietole da zucchero e da foraggio:*** 3 - 5 l/ha in pre-emergenza e post-emergenza. ***Orticoltura (solo in pieno campo), Valeriana, erba grassa, actae, origano:*** 3 x 1 l/ha dallo stadio BBCH 14. ***Santoreggia, maggiorana, timo:*** 1.5 l/ha in pre-emergenza e 2 x 1.5 l/ha in post-emergenza fino allo stadio BBCH 33. ***Finocchio aromatico, carvi:*** 3 x 1 l/ha dallo stadio BBCH 14. ***Cetrioli, Zucchine:*** Trattamento superficiale tra le linee con 5 l/ha. ***Bietola (piantato):*** 1 - 2 l/ha 6 - 8 giorni dopo la piantagione dallo stadio BBCH 12. ***Bietola (seminato):*** 1 - 2 l/ha prima dell'emergenza della coltura. ***Piantaggine:*** 2 x 1 l/ha dallo stadio BBCH 14. ***Menta dal 2° anno:*** 2 x 1 l/ha dallo stadio BBCH 14. ***Origano:*** 3 x 1.5 l/ha dopo la piantagione dallo stadio BBCH 13 - 33. ***Barbabietola per insalata:*** 3 - 5 l/ha nella pre-emergenza e post-emergenza. ***Rucola:*** 1 l/ha prima della semina da incorporare ad una profondità di 5 cm. ***Erba cipollina:*** 3 x 1.5 l/ha dalo stadio BBCH 12. ***Spinaci:*** 1 - 2 l/ha dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura.	12510	5 l 4 x 5 l	231.50 231.—	46.30 46.20
Granat *400 g/l Propyzamid; GHS08, 09* Diserbante residuale sistemico contro le malerbe annuali e graminacee perenni. ***Colza:*** 1.25 - 1.875 l/ha in post-emergenza in autunno, **specialmente contro la coda di volpe comune**. ***Cicoria belga (produzione di radici):*** 2.8 - 3.1 l/ha ***Insalata (in pieno campo):*** 2.5 - 3.75 l/ha contro le dicotiledoni e graminacee annuali. ***Ribes, cassis, uva spina, frutta a granelli e a nocciolo, piante ornamentali:*** 2.5 - 6.25 l/ha contro dicotiledoni e graminacee.	12550	5 l 4 x 5 l	205.50 205.—	41.10 41.—
Kunshi® 26 *37.5% Fluazinam, 25% Cymoxanil; GHS07, 08, 09* Fungicida combinato. ***Patate:*** 0.5 kg/ha contro la peronospora delle patate. Periodo d'attesa: 2 settimane. Patate primaticce: 1 settimana.	12752 12753	Prodotto speciale 1 kg 6 x 1 kg 5 kg	111.80 109.50 533.60	111.80 109.50 106.72
Kupfer-Bordo LG / Poltiglia bordolese LG BIO *20 % rame (sotto forma di preparati a base di calce, poltiglia bordolese), GHS 09* Fungicida di contatto e battericida. Granulato solubile in acqua, non colorato. ***Bacche:*** 0.25 - 1.3% contro malattie da macchie sulle foglie. ***Alberi a granella:*** 0.125 - 0.5% contro la ticchiolatura. ***Alberi a nocciolo:*** 0.5 - 0.75% contro la bolla del pesco. ***Vigna:*** 0.25 - 0.75% contro la peronospora. ***Legumi:*** 0.5 - 1.8% contro la ruggine e le malattie batteriche. ***Patate:*** 17.5 kg/ha contro la peronospora delle patate. ***Barbabietole da zucchero:*** 4 kg/h contro cercosporiosi e ramularia. Massimo 4 trattamenti. Periodo d'attesa: 14 giorni.	12754 12755 12756	Prodotto speciale 2 kg 10 x 2 kg 10 kg 20 kg	31.90 30.20 113.— 214.60	15.95 15.10 11.30 10.73
Kusabi® 26 *27.5 % Pyriofenon (300 g/l); GHS08, GHS09* Fungicida protettore e curativo per la viticoltura. ***Vigna:*** 0.3 l/ha contro l'odio. Impiego a partire dallo stadio di 6 foglie fino a metà agosto.	12757	1 kg 6 x 1 kg	145.50 145.—	145.50 145.—

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Laguna *600 g/l Aclonifen GHS07, 08, 09*				
Diserbante contro le graminacee e malerbe annuali.				
Piselli: 2 l/ha in pre-emergenza, 1 l/ha in post-emergenza. ***Carote:*** 3 l/ha in pre-emergenza, 1 l/ha in post-emergenza. ***Ceci:*** 2 l/ha in pre-emergenza. ***Cipolle, aglio, scalogno (piantato):*** 3 l/ha dopo la semina, prima dell'emergenza della coltura. ***Finocchio dolce:*** 2 l/ha prima piantagione o dopo la semina. ***Lenticchie:*** 3 l/ha in pre-emergenza, 0.5 l/ha in post-emergenza. ***Sedano:*** 2 l/ha dopo la piantagione. ***Pisello proteico:*** 3 l/ha in pre-emergenza, 1 l/ha in post-emergenza. ***Fava, patate, girasole:*** 3 l/ha in pre-emergenza.	12758	5 l 4 x 5 l	205.— 204.10	41.— 40.82
Landmaster Supreme 480 TF *480 g/l Glyphosate*				
Erbicida contro le malerbe annuali e perenni.	12762 12763	5 l 4 x 5 l 15 l	135.— 134.50 349.—	27.— 26.90 23.27
Impiego: 1.5 - 7.5 l/ha in post-emergenza delle infestanti.	12764	200 l	3580.—	17.90
Legacy® 23 *500 g/l Diflufenican; GHS09*				
Erbicida contro amaranto, borsa pastore, chenopodio, canapa selvatica, galinsoga, caglio bianco, falsa ortica, papavero, poligoni, centonchio, veronica, viola dei campi.				
Spelta, triticale, orzo autunnale, avena autunnale e primaverile, segale autunnale: 0.25 l/ha, Applicazione: autunno fino allo stadio BBCH 29. ***Frumento autunnale:*** 0.25 l/ha, Applicazione: primavera fino allo stadio BBCH 30. Miscibile con Refine Extra SX, Finy, Avero, Flurox 200, Monitor, Sprinter, Atlantis Star.	12770	0,5 l 10 x 0,5 l	57.— 54.10	114.— 108.20
Legan WG *70 % Dithianon GHS07, 09*				
Fungicida da contatto.				
Alberi a granella: 0.05 % contro la ticchiolatura. ***Alberi a nocciolo:*** 0.05 % contro la cilindrosporiosi, il corineo delle drupacee, marciume amaro, bozzacchioni del susino, ruggine.	12773	1 kg 10 x 1 kg	82.10 80.40	82.10 80.40
Vigna: 0.05 - 0.075 % contro la peronospora, rossore parassitario, escoriosi.	12774	5 kg 4 x 5 kg	356.50 356.—	71.30 71.20
Piante ornamentali: 0.05 % contro le malattie da fungo sulle foglie, peronospora, ruggini, macchie nere.	12775	10 kg	710.—	71.—
Lentagran® 14 *45 % Pyridate; GHS07, 09*				
Erbicida di contatto contro: amaranto, veronica, galinsoga, chenopodio, canapa selvatica, camomilla, caglio bianco, senecio volgare, atriplice comune, falsa ortica, centonchio, forbicina comune.				
Ceci: 2 kg/ha in post-emergenza. Tempo di attesa: 45 giorni. ***Cavolo rapa, cavolo cappuccio:*** 2 kg/ha in post-emergenza. Tempo di attesa: 4 settimane. ***Porro, cipolle, scalogni:*** 2 kg/ha allo stadio 3 foglie della coltura. Tempo di attesa: 4 settimane. ***Asparagi:*** 2 kg/ha dopo il periodo di taglio. ***Miscela trifoglio-graminacee:*** 1-2 kg/ha in autunno dopo la germinazione fino a metà ottobre. ***Mais:*** 1.5 - 2 kg/ha dallo stadio di 2 foglio della coltura. ***Colza:*** 2 kg/ha iin post-emergenza nella primavera precoce. ***Tabacco:*** 1 kg/ha, 2 - 4 settimane dopo la piantagione.	12785	1 kg 10 x 1 kg	87.90 86.10	87.90 86.10

Lentagran® 600 EC

Erbicida di contatto contro le malerbe nel mais.

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Lentagran® 14 600 EC					
600g/l Pyridate; GHS02, 07, 09					
Erbicida di contatto contro le malerbe dicotiledoni nel mais.					
Impiego:	1 - 1,5 l/ha dallo stadio di 2 foglie del mais.	12787	5 l	420.50	84.10
	Miscibile con Temsa, Frontier X2, Equip e Rimuron.		4 x 5 l	420.—	84.—
Mandate® 23					
240 g/l Clodinafop-propargyl, 60 g/l Cloquintocet-mexyl; GHS07, 08, 09					
Erbicida sistemico contro la coda di volpe, avena selvatica, loglio e altre graminacee nei cereali.					
Spelta, segale, triticale, autunnale:	0.25 - 0.35 l/ha, in post-levata allo stadio BBCH 13 - 30.				
Frumento autunale e primaverile:	0.2 - 0.35 l/ha, in post-levata allo stadio BBCH 13 - 30.	12980	1 l	140.—	140.—
	Mescolabile con Miranda e Flurox 200.		12 x 1 l	139.30	139.30
Maschere antipolvere **(con valvola di respirazione)**					
Protegge dalla polvere di ogni tipo Per la zona della bocca e del naso. **Maschere per polveri sottili con valvola di espirazione FFP2.**		14000	(12 x 10) 10 Stk.	41.20	
MCPB LG					
400 g/l MCPB; GHS05, 07, 09					
Erbicida contro le specie di convolvolo, romici, cardi e ranuncoli.					
Lamponi, ribes rosso e nero, cereali con semine di trifoglio, fagioli con bacello, piselli proteici, miscele di trifoglio-graminacee, prati e pascoli, piante ornamentali:	4 l/ha. Applicare dopo lo stadio di 2 foglie dei trifogli. Semina del trifoglio rosso: dopo lo stadio delle 2 foglie. Romice da seme cresciuto nelle nuove semine. Miscibile con Asulam 1 l/ha.	13040	5 l	138.60	27.72
	Nei piselli miscibile con Effican SG.		4 x 5 l	138.10	27.62
Microthiol® 3 LG BIO					
825 g/l zolfo; GHS07					
Fungicida e acaricida per la vigna e per i legumi.					
Vigna:	0.1 - 0.4 % contro l'oidio.				
Vigna:	2 % contro l'erinosi, acariosi e escoriosi.				
Cocomeri:	2 l/ha contro l'oidio.				
Barbietola da insalata:	1.5 l/ha contro l'oidio.	13090	10 l	84.60	8.46
Mildicut® 10					
25 g/l Cyazofamid; GHS09					
Fungicida protettivo.					
Vigna:	0.25 % (4 l/ha) contro la peronospora. Trattamento prima e dopo il fiore, fino a metà agosto.	13120	1 l	33.40	33.40
	Mescolabile con Bogard, Kusabi e Prox.		12 x 1 l	31.70	31.70
***Rafano** (in piena terra):*	4 l/ha contro la ruggine bianca. Periodo d'attesa: 2 settimane.	13121	10 l	288.—	28.80
Miranda™					
400 g/l Flufenacet, 200 g/l Diflufenican; GHS07, 08, 09					
Diserbante combinato contro graminacee e malerbe a foglia larga.					
Spelta, triticale, grano duro, farro, orzo invernale, segale invernale, frumento autunnale:	0.4 - 0.6 l/ha contro malerbe e dicotiledoni annuali in autunno. Trattamento possibile in pre-emergenza o post-emergenza della coltura. Miscibile con Avero.	13142	1 l	152.—	152.—
			12 x 1 l	149.—	149.—

Microthiol® LG

Fungicida e acaricida per viti e ortaggi.

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Monitor® 17 *80 % Sulfosulfuron; GHS09*			Prodotto speciale		
Erbicida (sulfoniluree) per la lotta contro i pennacchini, gramigna, bromo sterile, caglio bianco, camomilla, centonchio, borsa pastore, ricacci di colza e altre.					
Spelta, triticale, grano duro, farro, frumento autunnale:	25 g/ha mescolato con 1 - 2 l/ha Codacide dallo stadio accestimento fino al massimo 2 nodi.	13180	25 g 10 x 25 g	90.— 88.10	
	Miscibile con Atlantis Star, Duplosan KV Combi, Refine Extra SX, Finy, Flurox 200 e Stabilan Plus.	13181	125 g 10 x 125 g	395.— 393.—	
Nimrod® 23 *250 g/l Bupirimate; GHS02, 07, 08, 09*					
Fungicida sistemico.					
Mele:	0.05 % (0.8 l/ha) contro l'oidio.	13260	1 l	101.—	101.—
Fragola:	0.1 % (1 l/ha) contro l'oidio.		12 x 1 l	98.90	98.90
Uva spina:	0.1 % (1 l/ha) contro l'oidio.	13261	5 l	476.—	95.20
Piante ornamentali:	0.1 % contro l'oidio.		4 x 5 l	475.—	95.—
Novodor® 22 3 FC BIO *3% Bacillus thuringiensis var. tenobrionis*					
Insetticida biologico (preparato a base di batteri) contro le larve della dorifora nelle patate e melanzane.					
Impiego:	3 l/ha contro lo stadio larve giovani . 5 l/ha contro lo stadio larve più anziane.	13280	5 l 4 x 5 l	215.20 214.50	43.04 42.90
Oblix® 3 MT *350 g/l Metamitron, 150 g/l Ethofumesate; GHS07*					
Erbicida contro malerbe dicotiledoni e graminacee.					
Barbabietole da insalata, da zucchero e da foraggio:	6 l/ha in post-emergenza. Possibili trattamenti frazionati (split).	13288	5 l 4 x 5 l	200.50 199.50	40.10 39.90
Oikos® 35 BIO NUOVO *26 g/l Azadirachtine A; GHS07, 09*					
Insetticida sistemico a base di Neem.					
Melo:	1.5 l/ha (0.94%) 1,5 l/ha (0,94%) contro l'afide del frassino.				
Lattuga:	1.5 l/ha contro gli afidi. Periodo di attesa: 1 settimana.	13300	1 l	236.40	236.40
Pomodori:	0.15% contro afidi e mosche bianche.		10 x 1 l	235.80	235.80
	Periodo di attesa: 3 giorni.	13302	3 l	685.50	228.50
Patate:	1.5 l/ha contro il coleottero della patata.		4 x 3 l	685.—	228.35
Oxidia *800 g/l Prosulfocarb; GHS07, 09*					
Erbicida contro malerbe dicotiledoni e graminacee.					
Patate:	3 - 5 l/ha in pre-emergenza.				
Patate di tavola e da foraggio:	4 - 4.5 l/ha in post-emergenza precoce in combinazione con Condoral.				
Spelta, triticale, orzo autunnale, segale autunnale, frumento autunnale:		13422	1 l 12 x 1 l	26.60 25.10	26.60 25.10
	4 - 5 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, autunno o in primavera.	13423	5 l 4 x 5 l	106.— 105.50	21.20 21.10

Oikos

Insetticida sistemico per arboricoltura, colture orticole e campicoltura

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Pendi *400 g/l Pendimethalin; GHS09*				
Diserbante ad ampio spettro.				
Piselli senza baccello: 1 l/ha, in post-emergenza.				
Carote: 2.5 - 4 l/ha, in pre-emergenza.				
Ceci: 3 l/ha, in pre-emergenza, Tempo di attesa: 63 giorni.				
Finocchio dolce, porro (seminati), scorzonera, cipolle: 2 - 4 l/ha, in pre-emergenza.				
Sedano rapa, specie di cavoli, porro (piantato), sedano da coste: 4 - 5 l/ha, prima della piantagione.				
Miscanto: 4 l/ha, in post-emergenza.				
Pisello proteico: 1 l/ha, in post-emergenza.				
Orzo, spelta, segale, triticale, frumento: 3 - 4 l/ha, applicazione in autunno.				
Patate: 4 - 5 l/ha, in pre-emergenza.				
Kenaf: 4 - 5 l/ha, in pre-emergenza.				
Lupino: 2.5 - 4 l/ha, in pre-emergenza.				
Mais: 3.5 l/ha, in pre-emergenza.				
Girasole: 3 - 4 l/ha, subito dopo la semina.	13425	1 l	29.80	29.80
Riso seminato su		12 x 1 l	28.30	28.30
terreno asciutto: 4 - 5 l/ha, in pre-emergenza.	13426	5 l	125.20	25.04
Prati e pascoli: 4 l/ha, in autunno, dopo l'ultimo sfalcio o pascolo.		4 x 5 l	124.20	24.84
Colture da fiore e 2.5 - 4 l/ha, prima di piantare o in primavera prima del	13427	10 l	248.10	24.81
piante verdi: germogliamento.		2 x 10 l	247.60	24.76
Permaforte Spray *Cyphénothrine, Pyrethrum, PBO; GHS02, GHS07, GHS09*				
Spray insetticida con effetto rimanente contro gli insetti nocivi. Efficace contro le mosche, zanzare, vespe, ragni, formiche e altri; nelle case e all'aperto. Il film è invisibile e inodore.				
	13455	400 ml	31.20	
Iniettore per le cavità: lungo 60 cm.In particolare per accedere alle cavità		12 x 400 ml	30.50	
(esempio nido d'ape).	13456	1 pezzi	3.70	
Permanent Super *8 g/kg Permetrina, 4 g/kg Estratto di piretro (25%), 0.5 g/kg Tetrametrina, GHS02, 09*				
Insetticida Aerosol, a base di acqua contro scarafaggi, formiche, pulci, ragni, terme, mosche, pesciolino d'argento	13461	500 ml	32.90	
e altri insetti nocivi.		12 x 500 ml	31.30	
Permasil Spray 2.0 *3% Diossido di silicio amorfo, 0.15% estratto di crisantemo; GHS02, GHS07, GHS09*				
Per lottare contro le cimici del letto, afidi rossi, zecche dei piccioni, coleotteri, formiche, pulci, pesciolini d'argento, scarafaggi e altri insetti rampicanti.				
Impiego: applicare sui luoghi di transito degli insetti.	13466	500 ml	32.80	
Una dose per circa 60 m lineari.		12 x 500 ml	31.20	
Piretro verde® 18 BIO *18.6 g/l Pyrethrine; GHS09*				
Preparato speciale per lottare contro afidi, mosca bianca, tripidi e dorifora nelle colture orticole e nelle piante ornamentali.				
Colture orticole: 2.5 l/ha (0.25%) nelle bacche andine, carciofi, melanzane, fagioli, piselli, cocomeri, Kardy, carote, finocchio, sedano rapa, cavoli diversi, zucche con la pelle commestible, porri, rafani, meloni, zucche da olio, peperoni, pastinaca, pepino, fava maggiore, ravanelli, barbabietole rosse da insalata, ramolaccio, rabarbaro, scalogno, scorzonera, asparagi, navone, zucche da mangiare (pelle non commestibile), betonica, sedano, pomodori, aglio, topinambur, angurie, prezzemolo gigante, granoturco dolce, cipolle. **Periodo di attesa in tutte le colture: 3 giorni.**				
1.5 l/ha insalata-Asia (Brassicaceae), crescione acquatico, cicoria, cima di Rapa,crescione, erbe culinarie, coste, bietola, formentino, Portulaca, rucola, insalate diverse, spinaci.	13496	1 l	88.40	88.40
Periodo di attesa in tutte le colture: 3 giorni.		12 x 1 l	86.50	86.50
Piante ornamentali: 0.3 % in colture fioricole, piante verdi, rose,	13497	5 l	403.80	80.76
piante e cespugli (fuori dalla foresta).		4 x 5 l	402.80	80.56

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Pirimor® 21 *50 % Pirimicarb; GHS06, 09*				
Insetticida che risparmia gli insetti ausiliari.				
Bacche: 0.04 % contro gli afidi e le cocciniglie.				
Frutticoltura: 0.02 - 0.04 % contro gli afidi e l'afide lanigero. Con efficacia parziale contro cocciniglia a virgola.				
Colture orticole: 0.05 % contro gli afidi. 0.05% con 5 l/metro lineare contro gli afidi delle radici. 0.1% con 5 l/m² innaffiare le piantine.	13500	500 g	55.20	110.40
Campicoltura: 0.15 - 0.25 kg/ha contro gli afidi nelle barbabietole da		6 x 500 g	52.50	105.—
zucchero, piselli, fava comune, patate, cereali e colza.	13501	3 kg	298.80	99.60
Piante ornamentali: 0.05 % contro gli afidi.		4 x 3 kg	298.30	99.43
Power Clean BIO *GHS05*				
Prodotto di pulizia per pulire le botti di trattamento. Pulisce accuratamente e rapidamente. Non è aggressivo per nessun materiale usato nelle botti.				
Impiego: è raccomandata una soluzione di acqua	13530	5 l	82.50	16.50
con 2% di Power Clean.		4 x 5 l	82.—	16.40
Prox *500 g/l Spiroxamine; GHS05, 07, 09*				
Fungicida sistemico.	13572	1 l	57.90	57.90
		12 x 1 l	55.—	55.—
	13573	5 l	255.70	51.14
Viticoltura: 0.05 % (fino a 0.8 l/ha) contro l'oidio.		4 x 5 l	255.20	51.04
Proxanil® 3 *50 g/l Cymoxanil, 400 g/l Propamocarb-hydrochlorid; GHS05, 07, 08, 09*				
Fungicida sistemico contro la peronospora.				
Patate: 2.5 l/ha contro la peronospora delle patate. Effettuare 6 trattamenti al massimo per coltura. Periodo di attesa: 3 settimane. Patate primaticce: periodo di attesa: due settimane.	13575	5 l	156.40	31.28
Miscibile con Aviso e Ranman Top.		4 x 5 l	155.90	31.18
Ranman® 10 Top *160 g/l Cyazofamid; GHS05, 09*				
Fungicida per le patate e per le colture orticole.				
Patate: 0.5 l/ha contro la peronospora. Azione antisporulante. Periodo di attesa: 2 settimane, primaticce: 1 settimana.				
Cocomeri, zucca a buccia commestibile, (piena terra): 0.5 l/ha contro la peronospora. Periodo di attesa: 3 giorni				
Zucca, zucchine (in serra): 0.5 l/ha contro la peronospora. Periodo di attesa: 3 giorni.				
Pomodori (in piena campo e in serra):	13661	1 l	121.10	121.10
0.5 l/ha contro la peronospora.		12 x 1 l	118.60	118.60
Periodo di attesa: 3 giorni.	13662	5 l	540.70	108.14
Tabacco: 0.5 l/ha contro la peronospora del tabacco.		4 x 5 l	540.20	108.04

Piretro verde BIO

Per la lotta contro gli insetti nelle colture orticole e piante ornamentali

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Rapid *0.95 % Emamectinbenzoat; GHS07, 09*				
Insetticida ad azione rapida.				
Albicocche, pesche, nettarine: 0.2 % (3.2 kg/ha) contro carpocapsa, tignola orientale del pesco, tignola del pesco. Periodo di attesa: 3 settimane.				
Frutta a granella: 0.2 % (3.2 kg/ha) contro la carpocapsa, tortrice dei frutti, piccola tortrice dei frutti, falena degli alberi da frutto. Periodo di attesa: 3 settimane.				
Frutta a nocciolo: 0.2 % (3.2 kg/ha) contro carpocapsa. Periodo di attesa: 3 giorni.				
Susina/susino: 0.2 % (3.2 kg/ha) contro carpocapsa. Periodo di attesa: 3 settimane.				
Cavoli a foglie, cavoli, cavoli di Bruxelles, cavolo a cappuccio: 0.15 % (1.5 kg/ha) contro nottua del cavolo, cavolaia maggiore, tignola del cavolo. Periodo di attesa: una settimana.				
Zucchine: 0.15 % (1.5 kg/ha) contro nottue. Periodo di attesa: 3 giorni.	13667	1 kg	59.—	59.—
Pomodori: 0.15 % (1.5 kg/ha) contro la minatrice sudamericana dei pomodori. Periodo di attesa: 3 giorni.		10 x 1 kg	56.60	56.60
	13668	5 kg	257.50	51.50
Piselli proteici: 1,5 kg/ha contro le nottue e le tortrici.		4 x 5 kg	253.20	50.64
Rasenrein *70 g/l MCPA, 70 g/l 2,4-D, 42 g/lMecoprop-P, 20 g/l Dicamba; GHS07, 09*				
Erbicida contro le infestanti annuali e perenni, incluso trifoglio bianco.	13681	100 ml	21.80	218.—
Tappeti erbosi e terreni sportivi: 2 %; Applicazione con nebulizzatore a spalla:		10 x 100 ml	20.80	208.—
75 ml in 3.5 l di acqua per 100 m^2.	13682	1 l	56.70	56.70
0.2 %: Annaffiatoio con accessorio		12 x 1 l	55.—	55.—
Refine® 24 Extra SX *33 % Thifensulfuron-methyl, 16.7 % Tribenuron-methyl; GHS09*				
Erbicida a largo spettro contro centonchio, falsa ortica, viola dei campi, romice, cardo, convolvolo, ricacci di colza, cicuta minore, camomilla e altre.				
Orzo, avena, segale, triticale, frumento, grano duro, spelta, farro: 60 g/ha in 200 - 400 l di acqua. Il trattamento viene effettuato in primavera dallo stadio 3 foglie fino all'ultima foglia. Efficace indipendentemente dalla temperatura. Miscibile con Avero, Monitor, Legacy, Sprinter, Flurox 200, Atlantis Star.	13700	150 g	162.70	
		10 x 150 g	162.20	
Revus® 21 *250 g/l Mandipropamid; GHS09*				
Fungicida parzialmente sistemico contro la peronospora nelle colture orticole e nella campicoltura.				
Carciofi, insalate-Asia, baby-Leaf, piselli, cicorie, cavoli (sviluppo delle infiorescenze), cavolo di Bruxelles, cima di rapa, ravanelli, spinaci, finocchi, erbe fini, prezzemolo, ramolaccio, coclearia, rucola, insalate, patate: 0.6 l/ha contro la peronospora.				
Tabacco: 0.5 l/ha contro la peronospora.	13730	1 l	94.40	94.40
Luppolo: 0.75 - 1.6 l/ha contro la peronospora.		12 x 1 l	92.50	92.50
Rezecta® 21 — **Consegna solo a disinfestatori professionali** *100 g/l Cyphenothrin; GHS08, 09*				
Insetticida microincapsulato contro gli insetti volanti e striscianti nei, e intorno agli edifici.				
Dossagio: 50-100 ml in 5 litri d'acqua per 100 m2 di superficie contro scarafaggi delle case, cimici del letto, pidocchi, pulci, pesciolini d'argento, formiche, ragni, mosche e molti altri.	13738	1 l	151.90	151.90
		12 x 1 l	151.10	151.10

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Rimuron NUOVO *25 % Rimsulfuron; GHS07, 09*				
Erbicida sistemico con uno spettro d'azione molto ampio.				
Mais: 30 - 40 g/ha o 2 x 20 g/ha tratamento frazionato. ***Patate:*** 40 g/ha o 2 x 20 g/ha tratamento frazionato. miscelato con Temsa, Frontier X2, Dialen e Condoral. Da miscelare sempre con 1-2 l/ha di Codacide.	13765	100 g 10 x 100 g	124.— 122.—	
Roguard® 11 Mouse Box *Scatola d'adescamento per topi*				
Scatola d'adescamento robusta a utilizzare con tutte le formulazioni. Scatola compatta con una serratura sicura contro tutte le manipolazioni. Igienica e facile da pulire con due sezioni per un efficacia massima.	13790	1 pezzi 100 x 1 pezzi	5.80 4.80	
Roguard® 11 Xtra *Scatola d'adescamento per ratti*				
La protezione approvata per adescare i ratti. Robusta e solida con una serratura sicura contro le manipolazioni. Diverse possibilità per fissarla in sicurezza. Igienica e facile da pulire con due sezioni per un efficacia massima.	13791	1 pezzi 100 x 1 pezzi	13.80 13.10	
Sheriff NUOVO *375 g/l fenpropidine, 100 g/l difenoconazole; GHS07, 08, 09*				
Fungicida liquido contro cercosporiosi, ramularia, oidio e ruggine delle barbabietole.				
Barbabietole da zucchero e da foraggio: 1 l/gh da fine giugno a settembre. Al massimo 2 trattamenti; periodo di attesa: 28 giorni.	13912 13913	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	93.70 90.90 400.30 399.80	93.70 90.90 80.06 79.96
Silwet® 5 L-77 *840 g/l Heptamethyltrisiloxane modificato; GHS07, 09*				
Bagnante di ultima generazione come aggiuntivo per erbicidi, fungicidi e insetticidi.				
Impiego: 0.1 l/ha con 100 - 200 l d'acqua/ha in campicoltura. 0.1 l/hal/ha con 200 - 500 l d'acqua/ha nelle colture perenni.	13920	1 l 12 x 1 l	99.80 97.80	99.80 97.80
Simplex ® 33 *100 g/l Fluroxypyr, 30 g/l Aminopyralid; GHS05, 07, 08, 09*				
Erbicida sistemico combinato contro le malerbe.				
Impiego: trattamento pianta per pianta con 0.5 - 2.5 % nei prati, pascoli, terreni verdi, campi aperti, sulle strade cantonali e federali, nelle scarpate e nelle strisce verdi lungo le vie di comunicazione. **Lotta possibile** contro rovi, crocifere velenose, convolvolo giapponese, cardi, ortica maschia, romici diversi, erba a grappolo e altre.	13921	1 l 12 x 1 l	107.80 107.20	107.80 107.20
Soleto ® 14 *500 g/l Metobromuron; GHS08, 09*				
Erbicida contro le dicotiledoni e le graminacee.				
Valerianella (seminata): 0.5 - 0.75 l/ha in pre-emergenza. ***Patate:*** 3 - 4 l/ha in pre-emergenza.	13924 13925	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	50.40 48.50 227.— 225.—	50.40 48.50 45.40 45.—

Sunrise

Erbicida di contatto per il controllo di erbe infestanti

Prodotto	N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg / l
Spark *80 % Lenacil; GHS05, 08, 09* Erbicidi contro le malerbe annuali. ***Fragole:*** 1.5 - 2 kg/ha ***Barbabietole per insalata, spinaci, scorzonera, porro (piantato):*** 1.5 - 2 kg/ha ***Barbabietola da zucchero:*** 1.5 - 2 kg/ha in pre-emergenza; 0.1 - 0.4 kg/ha in post-emergenza. Miscibile con Beta Star e Goltix 700 SC.	13930	1 kg 10 x 1 kg	118.90 116.40	118.90 116.40
Sprinter ® 25 *6,83 % Pyroxsulam, 2,28 % Florasulam, 6,83 % Cloquintocet-mexyl; GHS09* Diserbante sistemico per cereali con uno spettro di efficacia molto ampio. ***Impiego:*** 130 - 275 g/ha nel frumento, segale, triticale e spelta in primavera. Applicare sempre in miscela con un bagnante. Efficace con 220 g/ha contro la coda di volpe, agrostide, loglio, ricacci di colza, senape, viola dei campi, veronica, borsa pastore, canapa selvatica, cicuta minore, centonchio, camomilla, caglio bianco, papavero, romici e altre. Miscibile con Refine, Finy e Legacy. **Il pacchetto combinato (KP) contiene:** **1 x 400 g Sprinter e 1 x 2 l Agenti bagnanti Sprinter**	13970	1 KP 4 x 1 KP	219.60 218.40	
Stabilan ® 12 Plus *460 g/l Chlormequat; GHS05, 07* Regolatore di crescita per i cereali e le piante ornamentali. ***Frumento, spelta, triticale:*** 0.5 - 2.5 l/ha allo stadio 29 - 30 BBCH. ***Piante ornamentali:*** 0.1 - 0.5 % irrorare, 0.15 - 0.2 % polverizzare.	13986 13987	5 l 4 x 5 l 10 l 2 x 10 l	41.50 41.— 79.— 78.50	8.30 8.20 7.90 7.85
Storm® 11 Ultra Happen *0.0025 % Flocoumafen* Rodenticida di nuova generazione sottoforma d'esca molto attrativa. ***Impiego:*** I roditori e più particolarmente i ratti, consumano molto volentieri le piccole esche Storm (ca. 4g). Contro i topi depositare 2-3 esche in diversi posti. Contro i ratti depositare ca. 10 esche per ogni luogo d'adescamento. **Ubicare con le scatole a esca Roguard® Xtra e Roguard® Mouse Box.**	14038	300 g 40 x 300 g	26.50 25.80	
Sunrise *10.6 g/l Pyraflufen-ethyl; GHS05, 07, 09* Erbicida di contatto per combattere le malerbe nelle patate, per bruciare le foglie delle patate per la produzione di piante, patate di consumo e per l'eliminazione dei polloni in arboricoltura e viticoltura. ***Frutta a granella, frutta a nocciolo:*** 0.5 % dal 3° anno di produzione, BBCH 35 - 75. ***Viti:*** 0.5 % dal 3° anno di produzione, BBCH 19 - 75. ***Patate:*** 1 l/ha, pre e post emergenza, fino alla levata massima del 5 % delle patate, BBCH 00 - 09. ***Patate per la produzione di piante:*** 2 l/ha con la trinciatura meccanica del frascame. BBCH >50. ***Patate da tavola e da foraggio:*** 2 l/ha senza la trinciatura meccanica del frascame. BBCH 91. Intervallo di un minimo di 5 giorni tra le due applicazioni. Trattamento frazionato: 2 x 2 l/ha.	14044 14045	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	56.30 53.40 248.50 246.—	56.30 53.40 49.70 49.20
Surfy *790 g/l ethoxyl. Olio di semi di soia; GHS05* Agenti bagnanti e adesivi per prodotti fitosanitari in frutticoltura, viticoltura, colture orticole e campicoltura. ***Impiego:*** 0.15% (150 ml / 100 lt di acqua).	14046 14047	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	31.80 30.10 145.40 144.90	31.80 30.10 29.08 28.98

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Switch®21					
37.5 % Cyprodinil, 25 % Fludioxonil; GHS07, GHS09					
Fungicida sistemico.					
More, fragole, arbusti dell'uva spina, bacche di sambuco, mini kiwi, mirtilli, lamponi:	0.1 % (1 kg/ha) contro la botrite.				
Uva spina, arbusti di uva spina:	0.1 % (1 kg/ha) contro il colittrico.				
albicocche, nettarine, pesche, prugne:	0.06% (1 kg/ha) contro la moniliosi dei fiori e dei frutti.				
Vigna:	0.1% (1.2 kg/ha) contro la botrite.				
Melanzane, pomodori:	0.1% contro botrite e sclerotinia				
Fagioli:	0.5 - 0.8 kg/ha contro botrite e sclerotinia.				
Cicoria di Bruxelles:	36 g/to resp. 90 g/hl contro botrite e sclerotinia.				
Piselli:	1 kg/ha contro l'antracnosi, la botrite e la sclerotinia.				
Cocomeri:	0.1% contro botrite e sclerotinia.				
Lattughella (formentino):	0.6 kg/ha contro botrite e rizoctonia.				
Rucola:	0.5 - 0.7 kg/ha contro botrite e sclerotinia.				
Insalate:	0.5 - 0.8 kg/ha contro botrite, sclerotinia, rizoctonia.				
Asparagi:	1 kg/ha contro botrite, sclerotinia, rizoctonia.				
Cipolle:	0.1% (1 kg/ha) contro botrite e marciume bianco.				
Piante ornamentali:	0.1 - 0.12% contro botrite.	14048	300 g	78.30	261.—
Bosso:	0.1% contro Cylindrocladium.		12 x 300 g	76.70	255.66
Tappeto verde, campi sportivi:		14050	1 kg	231.50	231.50
	1.5 kg/ha contro la muffa delle nevi, marciume bianco.		10 x 1 kg	230.50	230.50
Talon®21 Wax Block					
0.005 % Brodifacoum					
Rodenticida contro i topi e i ratti riservato all'uso professionale per l'interno e l'esterno.					
Impiego:	Contro i topi: utilizzare un blocco a ogni postazione.				
	Posizionare i posti con le esche ogni 1-2 metri.	14054	1 kg	42.60	
	Contro i ratti: posizionare 2-3 blocchi per postazione con esca.		10 x 1 kg	40.60	
	Mettere le postazioni con l'esca ogni 5-10 m.	14051	5 kg	170.20	
Techno®24 10 CS					
100 g/l Lambda-Cyhalothrin; GHS07, 09					
Insetticida a largo spettro d'azione, micro incapsulato.					
Bacche:	0,1 - 0,2 l/ha.				
Alberi a granella:	0,24 l/ha				
Vigna:	0,01 %				
Colture orticole:	0,1 l/ha (0,01 %)	14057	2,5 dl	54.40	217.60
Campicoltura:	0,0625 - 0,1 l/ha		10 x 2,5 dl	51.70	206.80
Piante ornamentali:	0,1 - 0,3 l/ha (0,01 - 0,03 %)	14058	1 l	124.—	124.—
	Osservare le instruzioni PER.		12 x 1 l	123.50	123.50
Temsa SC					
9.2 % Mesotrione (100 g/l); GHS05, GHS07, GHS09					
Erbicida ad azione fogliare e residuale per la coltura del mais.		14065	1 l	65.—	65.—
Impiego:	0.5-1.5 1/ha in post-emergenza contro le malerbe		2 x 1 l	63.70	63.70
	graminacee e a foglia larga annuali.	14059	5 l	301.—	60.20
	Miscibile con Equip, Rimuron, Frontex X2 e Dialen.		4 x 5 l	295.60	59.12

Temsa SC

Erbicida ad azione fogliare e residuale per le colture di mais

Prodotto		N°	Imballaggio	Prezzo indicativo per imballaggio	Prezzo kg/l
Tip / Calcium BIO					
160 g/l Calcio come cloruro di calcio + bagnante speciale; GHS07					
Prodotto ad alta concentrazione di calcio per frutticoltura e le colture orticole.					
Frutticoltura:	10 l/ha contro il bitter-pit delle mele. Trattare diverse volte a intervalli di 10 a 14 giorni.				
Colture orticole:	5 l/ha. Trattare diverse volte a intervalli di 10 giorni. Mescolabile con i prodotti fitosanitari usuali.	14080	10 l	48.—	4.80
		14081	200 l	620.—	3.10
Valis®14 F					
6 % Valifenalate, 48 % Folpet; GHS05, GHS07, GHS08, GHS09					
Fungicida sistemico.					
Vigna:	0.125% (2 kg/ha) contro la peronospora della vigna, con efficacia parziale contro il marciume grigio (botrite). Anche per applicazione aerea.	14113	1 kg	53.10	53.10
			10 x 1 kg	50.40	50.40
		14114	5 kg	230.40	46.08
			4 x 5 kg	229.60	45.92
Zeppelin NUOVO					
333 g/l Dimetenamide-P, 167 g/l quinmérac ; GHS07, 09					
Erbicida sistemico combinato, contro le monocotiledoni annuali e le graminacee.					
Barbabietole da zucchero e da foraggio:	3 x con 0,3-0,5 l/ha ogni volta allo stadio BBCH 10-18, massimo trattamenti, frazionati se possibile.				
Colza:	1.5 l/ha allo stadio BBCH 00-18 (pre-o postlevata) Mescolabile con Beta Star, Goltix, Caravel e Galipan.	14134	5 l	326.40	65.28
			4 x 5 l	319.90	63.98

penergetic / VITAL

the natural biotechnology

- **Penergetic agisce stimolando il sistema immunitario delle piante.**
- **Vital è un corraborante biologico per le piante a base di micro-organismi effettivi e estratti di piante.**

Coltivazioni di alberi di Natale

Leu+Gygax SA

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Erbicida												
Erbicida totale ad azione fogliare	**Glifonex TF** 2-10 l/ha											
Erbicida totale ad azione fogliare	**Landmaster Supreme 480 TF** 1,5-7,5 l/ha											
Erbicida ad azione residuale	**Granat** 2,5-6,25 l/ha										**Granat** 2,5-6,25 l/ha	
Antigraminacee ad azione fogliare			**Agil** 0,75-2,5 l/ha									
Erbicida ad azione residuale			**Galipan** 2,5 l/ha									
Malerbe, azione fogliare					**MCPB LG** 0,4 %							
Fungicida												
Funghi patogeni del suolo			**Booster** 5 l/ha (Versare)									
Oidio			**Celos** 0,1-0,2 % BIO o **Nimrod** 0,1 %									
Peronospora			**Cuproxat liquide** 0,2-0,6 % BIO o **Flowbrix** 0,2-0,6 % BIO									
Macchie delle foglie			**Cuproxat liquide** 0,2-1 % BIO o **Flowbrix** 0,2-1 % BIO									
Botrite (marciume)			**Switch** 0,1-0,12 %									
Moniliosi delle foglie			**Legan WG** 0,05 %									
Moniliosi dei rami			**Bogard** 0,5 l/ha									
Deperimento delle gemme degli abeti blu			**Cuproxat liquide** 2,1 % BIO o **Flowbrix** 2 % BIO									
Oidio/Peronospora degli abeti			**Flint** 0,05 %									
Insetticida												
Afide delle gemme degli abeti					**Pirimor** 0,05 %							
Afidi dell'abete rosso Sitka		**Pirimor** 0,05 %										
Acari / ragnetti rossi			**Credo** 0,02 %		**Credo** 0,02 %							
Nottue			**XenTari** 0,1 % BIO									
Tripidi / bruchi			**Audienz** 0,04-0.08 % BIO									
Minatrice			**Audienz** 0,04-0.08 % BIO									
Afidi / thripidi			**Piretro Verde** 0,3 % BIO									
Afidi / acari			**Vista** 2 % BIO TEAM BF									
Cocciniglie lecanidi, afidi, falene, acari			**Winsum** 2 % BIO TEAM BF									
Ozziorinco			**Larvanem** 500'000 Organismi/m² BIO									
Bruchi del terriccio			**Entonem** 500'000 Organismi/m² BIO									
Rafforzamento												
Aminoacidi / Nutrimento delle piante			**Aminopower plus liquido** 5-8 TEAM BF / **Kickstart** 0,15 l/ha/400 l di acqua TEAM BF									
Starter			**Level 2** 1 l/ha TEAM BF									
Acido umico			**Liqhumus 18** 5-10 l/ha BIO TEAM BF / **Perlhumus** 150-400 kg/ha									
Microorganismi effettivi			**Vital** 1 l/ha BIO TEAM BF									
Estratti di piante / Concimi N			**Hi-Grow** 1 % (4 l per 400 l/di acqua) BIO TEAM BF									
Concimi												
Concimi per il terreno			**Harvel** 5-10 l/ha BIO TEAM BF									
Carenza di ferro			**Ferplus Top** 50-70 kg/ha									
Concime completo			**Fertilinz** 1 compressa di concime, alla piantagione									
Concime organico			**Pidel** 4 l/ha BIO TEAM BF									
Concime azotato			**Noctudor** 4 l/ha/800 l di acqua BIO TEAM BF									
Concime completo			**Folifert Supermix** 2-6 kg/ha									
Manganese			**MaxMan 400** 1 l/ha TEAM BF									
Boro			**Micro Bor** 1-3 l/ha BIO TEAM BF									
Concime NPK			**Concime liquido LG** 2-5 l/ha BIO TEAM BF									

Cereali Extenso

Leu+Gygax SA

	Avena	Orzo	Frumento / farro	Triticale	Segale	F 25 Accesti-mento	G 29 Fine accesti-mento	H 30 Inizio levata	I 31 1 nodo	32 stadio 2 nodi	K 37 Emissione ultima foglia	39 Ultima foglia dispiegata	49 Avvistamento resta	N 51 Spigatura	P 61 Inizio della fioritura	69 Fine fioritura	Osservazioni
Diminuzione dello stress dovuto dalla malattia	●	●	●	●	●	**S-System** 2-3 l/ha											1-2 applicazioni.
Diminuzione dello stress dovuto da insetti	●	●	●	●	●	**Fence N** 1.5-3 l/ha											1-2 applicazioni.
Aumenta la stabilità del cereale	●	●	●	●	●			**Final K** 3 l/ha			**Final K** 3 l/ha						
Diminuzione dello stress Aumento della qualità	●	●	●	●	●	**Penergetic p campicoltura** 0,2 kg/ha + **Vital** 1 l/ha		**Penergetic p campicoltura** 0,2 kg/ha + **Vital** 1 l/ha + **Polygrün** 1 l/ha				**Penergetic p campicoltura** 0,2 kg/ha + **Vital** 1 l/ha + **Polygrün** 1 l/ha					Prima della semina: **Penergetic b** 0.4 kg/ha + **Terrasan** 2.5 l/ha Tutti i prodotti del piano di trattamento Extenso possono essere miscelati con gli erbicidi Leu + Gygax AG.

Mais

Leu+Gygax SA

	prima della semina	Semina	Germinazione (09)	1 foglio (11)	3 foglie (13)	6 foglie (16)	8 foglie (18)	dopo il raccolto	Osservazioni
Strategie erbicide		**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**							
Variante standard in presenza di miglio, gramigna, loglio, cipero.				**Equip** 1.5 - 2 l/ha **+ Temsa SC** 0.8 - 1 l/ha **+ Frontier X2** 1.2 - 1.4 l/ha	**+ Azofix plus et Fosfix plus** 1-2 l/ha di ciascuna				**(SPe)**
Miglio, gramigna					**Rimuron** 0.04 kg/ha	**+ Temsa** 0.8-1 l/ha	**+ Frontier X2** 1.2 - 1.4 l/ha		
Erbicidi									
Semina diretta su banda fresata o pacciamata. L'aggiunta di Terrasan 1,5-5 l/ha favorisce la decomposizione dei residui organici.	**Landmaster Supreme 480 TF** 1.5 - 7.5 l/ha **Glifonex TF** 2-10 l/ha								Per distruggere le colture intercalari, i concimi verdi e le erbe infestanti (compresi i cardi). Conformità ai requisiti PER
Vulpin des champs, agrostide, folle avoine, ray-grass, sétaires, millets, panic pied de coq, etc.				**Equip** 1 - 2 l/ha					**(SPe)**
Repousses pdt, véroniques, lamier, gallinsoga, tabouret, arroche, capselle, aethuse, abutilon, etc.				**Temsa SC** 0.5 - 1.5 l/ha					
Millets, ray-grass, chiendents, amarantes, séneçon, camomille, gaillet, renouée persicaire, etc.				**Rimuron** 0.04 kg/ha					**(SPe)** Solo con un permesso speciale, restrizione PER
Romici, cardi, convolvolo.				**Dialen** 0.3 - 0.6 l/ha					
Amaranto, atreplice comune, forbicina comune, chenopodio, attaccamani, erba morella, cipero.					**Lentagran** 1.5 - 2 kg/ha ou	**Lentagran 600 EC** 1 - 1.5 l/ha			Miscibile con Dasul Extra 6 OD, Temsa SC e Equip.
Dicotiledoni annuali e cipero.					**Effican SG** 0.7 kg/ha	**+ Lentagran 600 EC** 1.5 l/ha			**(SPe)**
Miglio, amaranto, belladonna, camomilla, papavero.		**Frontier X2** 1.2 - 1.4 l/ha							
Insetti									
Per disturbare gli anelli		**Penergetic b VV** 0.07 kg/ha **Penergetic b wv** 0.06 kg/ha							Può essere miscelato con liquame. Può essere miscelato con liquame.
Limacce			**Amilon 5** 5 - 7 kg/ha						
Piralide del mais						**Audienz** 0,2 l/ha			Tempo d'impiego: al momento della quota piú alte del volo delle farfalle.
Biostimulatore									
Trattamento delle sementi	**Penergetic p campicoltura** 20 g/Dose								I biostimolanti aiutano i residui a decomporsi più rapidamente. Favoriscono l'attività del suolo, che fornisce alle piante più nutrienti. I biostimolanti possono essere miscelati con gli erbicidi.
Gestione dello stress	**Penergetic b terreno** 400 g/ha **+ Terrasan** 1.5-5 l/ha	**Polygrün** 1-1,5 l/ha 2-3 trattamenti **Penergetic p campicoltura** 150-200 g/ha **+ Vital** 1 l/h aggiungere agli erbicidi						**Penergetic b terreno** 400 g/ha	
Fertilizzanti fogliari									
carenza di potassio / manganese				**Final K** 3-4 l/ha **MaxMan 400** 1 l/ha					In caso di carenza di potassio e manganese. Nei terreni torbosi, 2-3 trattamenti. Miscibile con gli erbicidi.
Concime starter, per una forte formazione delle radici nella fase di crescita.	**Azofix plus** 1-2 l/ha / **Fosfix plus** 1-2 l/ha			**Level 2** 1,2 l/ha					Miscibile con erbicidi.
Stimolante della crescita				**Fetrilon Combi** 1 kg/ha o **Folifert supermix** 4,1 kg/ha **Kickstart** 0.15 l/ha					Miscibile con erbicidi.
Carenza di boro				**Micro Bor** 1 l/ha Quantità d'acqua 200 l/ha					Miscibile con erbicidi.

Tabella di efficacia degli erbicidi

■ = effetto buono
▲ = effetto moderato
□ = nessun effetto
1 = solo piccoli stadi
2 = con dosi elevate
3 = non resistente
4 = 10 – 20 cm di altezza
5 = Fase di rosetta
6 = 10 – 15 cm di altezza
7 = 20 – 30 cm di altezza
8 = Farinello comune

	Mais					Strategia nel mais		Cereali									Strategia nel cereali						Patate		Colza		Barbietola					Colture orticole								Erbicida totali	
	Temsa SC	Equip	Dialen	Rimuron	Zwei-4D	Rimuron + Temsa + Frontier X2	Equip + Temsa SC + Frontier X2	Atlantis Star	Finy	Sprinter	Flurox 200	Legacy	Refine extra SX	Mandate	Avero	Miranda	Miranda/Oxidia	Monitor + Codacide + Duplosan KV Combi	Refine Extra SX / oder Finy+ Sprinter	Monitor + Sprinter	Refine Extra SX + Avero + Flurox 200	Pendi/Oxidia	Condoral SC	Oxidia + Laguna + Condoral CS	Galipan	Zeppelin	Betam	Beta Star	Frontier X2	Goltix 700 SC Goltix compact	Beta Star + Goltix + Zeppelin	Caravel	Spark	Lentagran	Bolero	Pendi	Laguna	Soleto	Granat	Landmaster Supreme 480 TF, Gilliorex TF	Agil
Coda di volpe comune (Alopecurus m.)		■		■		■	■	■		■		▲		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	▲		■	■	■	■		■		▲	■	■	■	■	■	■
Pennacchini (Apera spica-venti)		■		■		■	■	■	▲	■		▲		▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■	■	■	■		■			■	■	■	■	■	■
Avena selvatica (Avena fatua)		■		■		▲	■	■		■				■	■	▲	▲	▲	■	■	■	▲	■	■				▲	▲		▲				■	▲	▲	▲	■	■	■
Loglio (Lolium spp.)		■		■			■	■	▲	■		▲		▲	■	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■					■	■		■					■		■	■	■
Sanguinella (Digitaria spp.)	■ 1			■		■	■	■						■	■	■	■	■		▲	■	■	■	■	■	▲		▲	■		▲	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■
Pabbio (Setaria spp.)		■		■		■	■	■	▲	▲				■	■	■	■	■	▲	▲	■	■	■	■	■	▲		▲	■		▲	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■
Giavone comune (Echinochloa c.-g.)	■ 1	■		■		■	■	■	▲	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■
Fienarola annua (Poa annua)		■		■		■	■	■	▲	▲		▲		▲		■	■	▲	▲	■		■	■	■	■	■ 1		▲	■	■	■	▲	■		■	■	■	■	■	■	▲
Ricacci di cereali	▲	■		■		■	■													■			■	■				▲	■	▲	▲		■		▲		▲	▲	■	■	■
Bromo del prati (Bromus spp.)		■		■			■	■		▲								■	▲	■			■	■		▲				▲	▲				■				■	■	■
Gramignone (Agropyron repens)		■		■		■	■							▲				■		■															▲		▲		■	■	■
Senape dei campi (Sinapis arvensis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	▲	▲	■		■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	
Amaranto (Amaranthus spp.)	■ 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ 1	■	■	▲	■	▲		■	■	■	■	▲	▲	■	
Mercorella (Mercurialis annua)	▲ 1	■	■	■	■	■	■	▲	■			▲	■			▲	▲	■	■		■	■	■	■	▲			■	■	▲	■	▲		■ 1		■	■	■	■	■	
Veronica (Veronica spp)	■		▲		▲	■	■	■	▲	■	▲	■	▲			■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	▲		■ 1	■	■	■	■	▲	■	
Fumaria Fumaria officinalis)			■		▲	■	■	■			▲		▲			▲	▲	■	▲		▲	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	▲	■	■	
Galinsoga (Galinsoga spp.)	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	▲		■	■			■	■	■	■	▲	■	▲	■	■		■ 1	■	■	■	■	■	▲	■	■		▲		▲		■	
Crespino dei campi (Sonchus spp.)		▲	■	■	■		▲	■	■	■	▲		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	▲		■	■		■	■ 1	■		■			■	
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum)		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	■	■	■	▲	■	■			■	■	▲	▲	■		■		■		■	■	▲	■	
Erba storna comune (Thlaspi arvense)	■	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	▲	▲	■	
Borse pastore comune (Capsella b.-p.)	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■ 1	■	■	■	■	■	■	■	■ 1	■	■	■		▲	■	
Canapetta comune (Galeopsis tetrahit)	■		■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■ 1	■	■	■	■	■ 1	■			■	■	▲	■	■		■	■	■	■	▲	■		■	
Cicuta aglina (Aethusa cynnapium)	■		▲	■	▲	■	■	▲	■	■	▲		■						■	■	■		▲	▲		■		▲	■	■ 2	■		▲		▲		▲			■	
Camomilla comune (Matricaria / Anthemis)	▲ 1	■	■ 1	■		■	■	■	■	■		▲	■			■	■	■	■	■	■	▲	■	■	▲	■			▲	■	■	▲	■	■ 1	▲	▲	■	■		■	
Papavero (Papaver rhoeas)			■	■	■	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ 1	▲	▲	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
Caglio, attaccaveste (Galium aparine)	▲ 1	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	▲	▲			■	■	■	■	■	■	■	▲	■	▲	■		■		▲	■	■		■	▲	▲	▲	■		■	
Poligono persicaria Polygonum persicaria)	■	▲	■	▲ 1		■	■	■	■	■		■	■			■	■	▲	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■	
Poligono avicolare (Polygonum aviculare)	■		■	▲ 1		■	■	■	■	■	▲	■	■			■	■	▲	■	■	■	■	■	■				▲		■	■	■	■		■	■	■	▲	■	■	
Poligono convolvulus (Polygonum convolvulus)	▲ 1		■	■ 2		▲ 1	▲	■	▲	■	■	■	■			■	■	▲	■	■	■	■	■	■		▲ 1	■	■	▲	■	■	■	■		■	■	▲	▲	■	■	
Fiordaliso (Centaurea cyanus)			■	■	■	■	■	▲	■	■	▲	▲	■ 1			▲	▲	■	■	■	■		■	■	▲	▲	■	■	■	■	■				▲				■	■	
Senecione comune (Senecio vulgaris)	▲		■		■ 1	■	▲	■	■	▲	■	▲	■			■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■		■	■	▲	■	■	■	■	■		▲	■	■		■	
Farinello comune (Atriplex / Chenopodium)	■	▲	■		■ 1	■	■	■	■	▲		▲	■ 1			■	■	■	▲	▲	■	■	■ 1	■ 1	■	▲	■	■	▲	■	■	■ 8	■	■	■	■	■	■	■	■	
Erba morella (Solanum nigrum)	■	■	■		▲	■	■	▲	■	▲	■	■	■			■	■	▲	■	▲	■	■	▲ 3	▲ 3		▲	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	▲	■	■	■	
Portulaca (Portulacca oleracea)				■ 1	▲	■	■	▲	▲			■	■			■	■	▲	■		■	■	■	■	▲		■	■	■	■	■	■	■	■ 1	■	■			■	■	
Viola dei campi (Viola arvensis)	▲ 1			▲		▲ 1	▲	■	■	■		■	▲			■	■	■	■	■	▲	■	■	■			▲	■	▲	■	■					■	▲	▲	▲	■	
Falsa ortica (Lamium spp.)	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	▲ 1	■	■	■ 1			■	■	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■		■		■			▲	■	
Nontiscordardimè (Myosotis a.)	▲	■	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■ 1	■	■		■	■		■		■	■	■		▲	■	
Centonchio comune (Stellaria media)	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ricacci di colza	▲	▲	■	■	■	■	▲	■	■	■		■	■			■	■	■	■	■	■	▲	■	■			▲ 1	■		■ 1	■		■		■	▲	■			■	
Ricacci di girasole	■	▲	■	■	▲	■	■	▲	■	■		■	■			■	■	■	■	■	■		■	■			▲ 7	▲ 7		▲ 7	▲ 7	▲		■ 1	■					■	
Cardo campestre (Cirsium arvense)	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲			■					■	■	▲	■																			■	
Romice da seme (Rumex obtusifolius)			■		■			▲	■	■	■	■ 1	■			■ 1	■ 1	■	■	■	■																		■ 1	■	
Renoncolo dei campi (Ranunculus spp.)			■		■	▲ 1	▲	■	■	■		■ 1	■			■ 1	■ 1	■	■	■	■		▲	▲	▲				▲ 1										■ 1	■	
Convolvolo (Convolvulus spp.)			■		■		▲	■	▲	▲	■		■					■	■	▲	■																			■ 2	

Patate

Leu+Gygax SA

	Semina	Germinazione 09	Levata 10-19	Chiusura degli steli 21-29	Chiusura delle file 31-39	Bottone fiorale 51	Fioritura 60-69	Sviluppo dei tuberi 70-79	Sfogliatura maturità 91-97	Osservazioni
Diserbo	**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**									
Nelle patate sotto plastica contro le malerbe e le graminacee annuali.	**Pendi** 3 l/ha **+ Condoral SC** 0,5 l/ha									Anche la miscela Pendi + Condoral SC è possibile su patate da semina per la produzione di tuberi. **(SPe)**
Malerbe annuali e gramiancee nelle patate di consumazione e di foraggio.	**Oxidia** 4-5 l/ha **+ Condoral SC** 0,5 l/ha **+ Azofix plus et Fosfix plus** 1-2 l/ha ciascuno									Pre-emergenza o post-emergenza precocce. **(SPe)**
	Oxidia 2 l/ha **+ Laguna** 2 l/ha **+ Condoral SC** 0,5 l/ha **+ Azofix plus et Fosfix plus** 1-2 l/ha ciascuno									Utilizzare la miscela solo in pre-emergenza.
Chenopodio bianco Nelle patate da consumare, foraggiere e per la produzione di sementi.	**Caravel** 0.2-0.25 l/ha									Utilizzare la miscela solo in pre-emergenza.
Erba di monte, dicotiledoni, comprese le graminacee annuali, miglio, gramigna, porcospino		**Rimuron** 40 g/ha + **Codacide** 2 l/ha								Per trattamenti frazionati 2 x 20 g/ha + Codacide 1 l/ha **(SPe)**
Graminacee e malerbe annuali nelle patate.	**Condoral SC** 0,5-0,75 l/ha		**Condoral S** in post-emergenza 0,3 - 0,6 l/ha							**Raccomandazioni varietali:** Trattamento solo in pre-emergenza con un massimo di 750 g di Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta e Marlen. **(SPe)**
Dicotiledoni annuali e graminacee nelle patate da consumazione e da foraggio.	**Condoral SC** 0,5-0,75 l/ha									*Trattamento solo in pre-emergenza con un massimo di 750 g di Condoral e in caso di necessità in post-emergenza su piante di 5 cm di altezza massima con massimo 400 g di Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola e Victoria.*
Dicotiledoni annuali (**gallio aparine e cipero).** Applicazione sotto foglia possibile.		**Effican SG** 0.5 - 1.1 kg/ha								Trattamento complementare contro **gallio** aparine e cipero. Trattare unicamente su colture non bagnate. Altezza delle piante da 10 a 20 cm. **(SPe)**
Trattamento sottofoglia contro mono e dicotiledoni (incluso il convolvolo)		**Agil** 1 - 2,5 l/ha	**Condoral SC** 0,5 l/ha **+ MCPB LG** 3 l/ha **+ Effican SG** 1 kg/ha							Agil contro la gramigna di circa 20 cm di altezza con 1,75-2,5 l/ha. Mescolabile con i nostri fungicidi. Non trattare sulle piante. **(SPe)**
Strategia fungicida con 8 applicazioni			**2 x Proxanil** 2,5 l/ha **+ Aviso** 2 kg/ha **+ Kickstart** 0.15 l/ha		**3 x Kunshi** 0,5 kg/ha **+ Bogard** 0,3-0,5 l/ha **+ Kickstart** 0.15 l/ha		**3 x Ranman Top** 0,5 l/ha **+ Aviso** 2 kg/ha			L'aggiunta di Bogard 0,5 l/ha migliora l'efficacia contro l'Alternaria. **(SPe)**
Per formare la peronospora delle patate con tempo piovoso			**Proxanil** 2,5 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha							Eventualmente ripetere il trattamento dopo 3 giorni. **(SPe)**
			Cymbal 0,25 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha							Eventualmente ripetere il trattamento dopo 3 giorni. **(SPe)**
Anti-germinazione Patate di consumazione e industriali.						**Fazor** 5 kg/ha				In condizioni di crescita ideale a partire da 25 mm di Calibro. Per deltagli vedere l'informazione su Fazor a pagina 41. **Efficace su ricacci di patate l'anno seguente.**
Lotta contro le malattie										
La peronospore della patata e l'alternariose.				**Aviso** 2 kg/ha + **Revus** 0,6 l/ha						Trattare di sequito tutti i 7-10 giorni. Buonissima efficacità contro l'alternaria. Quantità d'acqua, secondo la massa fogliare.
				Ranman Top 0,5 l/ha + **Bogard** 0,5 l/ha ou **Flint** 250 g/ha						Buona resistenza alla pioggia e efficacità anti sporulante. **Non mescolara Ranman con Silwet L-77. (SPe)**
Patate per la produzione di tuberi da seme.				**3 x Aviso** 2 kg/ha + **Revus** 0,6 l/ha		**3 x Ranman Top** 0,5 l/ha				Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**
Controllo dei parassiti										
Limacce	**Amilon 5** 5-7 kg/ha									
Dorifora						**Audienz** 0,05 l/ha				Massimo 2 trattamenti per coltura e per anno.
Dorifora						**Coragen** 60 ml/ha				Insetticida sistemico. Agisce contro tutti gli stadi delle dorifore. Solo con autorizzazione speciale.
Dorifora						**Oikos** 1.5 l/ha				Massimo 3 trattamenti per parcella e anno. **(SPe)**
Dorifora [L1 e L2]						**Novodor 3 FC** 3 - 5 l/ha				Solo contro gli stadi larvali giovani.
Contro gli afidi delle foglie vettori del virus	**Spray-Oil 7E** 7 l/ha dans 350 l in acqua o **Winsum** 2-3 % (10-15 l/ha in 500 l di acqua)									1 volta per settimane, da quando il 30 % delle piante sono levate. Mescolabile con i fungicidi L+G.
	Pirimor 150 g/ha									Solamente sotto tunnel o serra.
Biostimolatori										Applicazione sui tubercoli nelle seminatrice. Penergetic é mescolabile con prodotti a base di rame.
Trattamento della semente	**Penergetic p campicoltura** 250 g/ha				**Amino Power Plus liquido** 1-2 l/ha					Aumento della crescita.
Gestione dello stress	**Penergetic b terreno** 400 g/ha **Terrasan** 1.5-5			**Polygrün** 0,5-1 l/ha 2-3 applicazioni						dopo il raccolto **Penergetic b terreno** 400 g/ha **Miscibile con fungicidi.**
				Penergetic p campicoltura 100 g/ha **+ Vital** 1 l/ha ogni 7-10 giorni						
Fertilizzanti fogliari					**Dexa Pro** 4 l/ha					
Carenza in manganese			**MaxMan 400** 1 l/ha							Terreno torboso 2-3 applicazioni. Mescolabile con i nostri fungicidi.
Anti-carenza (Mg, Mn, B, ecc.) e formazione di amido			**Fetrilon-Combi** 1 kg/ha							Mescolabile con fungicidi LG.
Stimolanti della crescita			**Folifert supermix** 4.1 kg/ha o **Final K** 3 l/ha (dopo la chiusura delle file)							Aggiungere ai trattamenti fungicidi per migliorare la crescita. Abbassa il pH delle poltiglia.

Patate

Leu+Gygax SA

		Ossrevazioni
Disseccamento del frascame delle patate		
Senza distruzione meccanica del frascame. Disseccamento del fusto delle patate di consumazione e di foraggio, con efficacità sulle spore della peronospora.	**Sunrise** 2 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha	
Disseccamento del frascame delle patate con efficacità sulle spore della peronospora, **dopo aver distrutto meccanicamente il frascame.**	**Sunrise** 2 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha	
Variante split	**Sunrise** 2 l/ha + **evtl. Ranman Top** 0,5 l/ha **Sunrise** 2 l/ha + **evtl. Ranman Top** 0,5 l/ha	Massimo 2 trattamenti per coltura. Minimo 5 giorni tra i trattamenti.
Lumache	**Amilon 5** 5-7 kg/ha	Prima e dopo l'essiccazione.

Fazor®

Impedisce la germinazione delle patate, aglio, scalogno e cipolle durante la conservazione. Per controllare i ricacci delle patate nelle colture seguenti.

Vantaggio nella conservazione

- Nessuna fase gassosa nella conservazione
- I tubercoli possono venir spostati
- I tubercoli trattati possono venir messi vicino a tubercoli non trattati
- Nessuna fase di attesa durante la consevazione

Istruzioni per l'applicazione
Applicare nel campo su piante sane. Applicare su un tessuto fogliare attivo. Fazor viene assorbito tramite le foglie e distribuito attraverso i vasi nei tubercoli delle patate. Una taglia media delle gocce di trattamento, permette una migliore umettazione delle foglie. Non applicare quando la temperatura è superiore a 25° C. Non utilizzare in mescolanza con altri prodotti nella pompa. Fazor deve venir applicato come trattamento unico. Le applicazioni split non sono raccomandate.

Precisione dell'azione
La germinazione implica la divisione cellulare. Fazor sopprime efficacemente la formazione indesiderata della semenza delle patate attraverso il bloccaggio della divisione cellulare. La crescita in lunghezza e spessore delle cellule nei tubercoli non viene danneggiata.

Note sul momento dell'applicazione
Il buon momento per l'applicazione è quando i tubercoli hanno un diametro di 25 mm (30-35 mm per le varietà a grosso calibro). Questo corrisponde allo stadio, dove la divisione cellulare nei tubercoli è terminata. Tipicamente, questo corrispone a 3-5 settimane prima del disseccamento del frascame / raccolta delle patate. Applicato troppo presto, la divisione cellulare viene arrestata nei tubercoli e il risultato del trattamento, implica una riduzione della resa. Applicato troppo tardi, la sostanza attiva non ha abbastanza tempo per essere trasportata nella pianta, fino ai tubercoli e per ottenere una concentrazione sufficiente. L'effetto è così ridotto. Applicato 5 settimane prima della raccolta, dona il miglior risultato.

Note speciali
Utilizzare solamente in colture di patate, che sono sufficientemente alimentate in acqua. Quando è applicato su piante stressate, si potrebbe produrre una fitotossicità e l'effetto è ridotto. In condizioni di siccità, è raccomandato di irrigare con una applicazione di 20 mm di acqua all'ettaro. Nessuna ripetizione del trattamento è necessaria. Una volta assorbita dalle piante, la materia attiva Hydrazida maleica, resta attiva nel punto di crescita. Fazor, può ridurre il rischio di crescita secondaria, ma solamente se il prodotto è applicato abbastanza presto ed è già stato trasportato nei tubercoli.

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Soja	Prima della semina	Pre-emergenza	Cotiledoni 2 foglie 10-12	3-4 foglie 13-14	Formazione dei boccioli fiorali	Osservazioni
Erbicidi	**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**					
Contro le infestanti a foglia larga e le graminacee annuali, compreso il miglio.		**Frontier X2** 1.2-1.4 l/ha **+ Caravel** 0.25 l/ha				
Pre-emergenza e post-emergenza. malerbe foglia larga (soprattutto amaranto e erba morella).		**Bolero** 1 l/ha	**Bolero** 1 l/ha **+ Effican SG** 0,55-1,16 kg/ha			Trattamenti frazionati 2 x 0,5 l/ha Bolero e 2 x 0,55 kg/ha Effican SG.
Malerbe e graminacee annuali a foglia larga (poligoni e altaccamani), **cipero.**			**Effican SG** 1.1 kg/ha			A complemento del trattamento in pre-emergenza. Malerbe in fase di germinazione fino allo stadio delle 4 foglie. Effican SG non deve essere utilizzato nelle zone di protezione delle aque sotterranee S2.
Graminacee annuali, miglio, loietto, ricacci di cereali, gramigna.			**Agil** 1 - 2,5 l/ha			Applicazione a partire della prima foglie della coltura fino a quando si formano le prime gemme fiorali. Gramigna 2-2,5 l/ha.
Parassiti Lumache			**Amilon 5** 5 - 7 kg/ha			Non utilizzare più di 700 g di sostanza metaldeide attiva per ettaro sullo stesso appezzamento entro un anno.
Nottue			**Techno 10 CS** 0,075 l/ha			Massimo 1 trattamento per coltura e anno. Solo con autorizzazione speciale. **(SPe).**
Effarouchement		**Penergetic b VV** 0.7 kg/ha BF				Riduce i danni ai pascoli e alle colture causati dagli animali selvatici.
		Penergetic b WV 0.6 kg/ha BIO BF				

Girasoli	Prima della semina	Pre-emergenza	Cotiledoni 2 foglie	3-4 foglie	Formazione dei boccioli fiorali	Osservazioni
Strategia erbicida	**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**					
		Laguna 2 l/ha **+ Frontier X2** 0.9 l/ha **+ Pendi** 2 l/ha				**(SPe)**
Erbicidi						
Contro le dicotiledoni e graminacee annnuali compreso il miglio.		**Frontier X2** 1,2 - 1,4 l/ha				
Fertilizzante fogliare						
Carenza di boro				**Micro Bor** 3 l/ha BIO BF		Stadio 4 à 6 foglie.
Parassiti						
Lumache			**Amilon 5** 5 - 7 kg/ha			Non utilizzare più di 700 g di sostanza attiva metaldeide per ettaro sullo stesso appezzamento entro un anno.
Nottue			**Techno 10 CS** 0,075 l/ha			Massimo 1 applicazione per raccolto e anno. **(SPe).** Solo con autorizzazione speciale.
Effarouchement		**Penergetic b VV** 0.7 kg/ha BF				Riduce i danni aiprati e alle colture causati dagli animali selvatici.
		Penergetic b WV 0.6 kg/ha BIO BF				
Trattamento delle sementi	**Penergetic p campicoltura** 25 g / 25 kg BIO BF					

	Prodotti	Dosaggio	Osservazioni
Campi incolti e stoppie	**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**		
Erbicidi: Maggese, prato, semina diretta	**Glifonex TF**	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 10 l/ha)
Maggese, prato, semina diretta	**Landmaster Supreme 480 TF**	3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 7,5 l/ha)
	+		
Convolvolo, romice, cardo	**Dialen**	0,5 l/ha	Unicamente in miscela con 5 l/ha Glifonex TF o 4 l/ha Landmaster Supreme 480 TF. Ultima applicazione a fine settembre.
Lino	**Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.**		
Erbicidi: Dicotiledoni	**Effican SG**	1,1 kg/ha	In post-emergenza. Allo stadio 2-4 foglie delle malerbe a partire de 5 cm di altezza delle colture.
Fertilizzante starter	**Level 2**	0,8 l/ha	5 cm di altezza delle colture. Miscibile con gli erbicidi.
Nottue terricole o vermi grigi	**Techno 10 CS**	0,075 l/ha	Solo con autorizzazione speciale.
Prati e pascoli	**Azofix plus e Fosfix plus**	1-2 l/ha	Mescolabile con gli erbicidi e liquame.
Erbicidi: **a) Nuova semina**	**MCPB LG** **+ Effican SG**	2 l/ha 1,1 kg/ha	Nelle nuovo semine, prima del primo taglio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche allattanti, 2 settimane per i bovini fuori dal periodo allattante.
Nuova semina con romice giovane	**MCPB LG** **+ Asulam LG**	4 l/ha 1 l/ha	Il trifoglio deve avere due foglie vere. Non utilizzarlo in gemine di trifoglio alessandrino e trifoglio persiana. Periodo di attesa: 3 settimane per bovine allattanti, 2 settimane per gli altri bovini.
Miscela trifoglio-graminacee	**Lentagran**	1 - 2 kg/ha	In autunni, dopo l'ultima utilizzazione. Periodo die attesa: 3 settimane. 2 settmane per bovini fuori dal periodo di lattazione.
Erba medica	**Effican SG**	2 x 0,55 kg/ha	Trattamento split. Peridodo di attesa: 3 settimane.
Concime starter	**Level 2**	0,8 l/ha	5 cm di altezza della coltura. Mescolabile con gli erbici.
b) Trattamento della superficie:			
Romice	**Asulam LG** **+ Concime liquido**	4 l/ha 4 l/ha	Applicazione in primavera e autunno. Prima delle formazione delle infiorescenze. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice alpino, felce	**Asulam LG** **+ Concime liquido**	4 l/ha 4 l/ha	Il concime liquido favorisce l'effetto. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice giovane e altri dicotiledoni annuali	**MCPB LG**	4 - 6 l/ha	Nelle nuove semine, prima del primo sfalcio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche con latte, 2 settimane per le mucche e i bovini fuori periodo di lattazione.
Ranunculo	**MCPB LG**	4 - 6 l/ha	Nella seconda crescita. Trattamento in tempo di crescita. Periodo di attesa: 3 settimane per animali fuori periodo de lattazione 2 settimane.
Specie di cardi	**Duplosan KV Combi**	2,5 - 3,25 l/ha	
Erbacce e infestanti	**Landmaster Supreme 480 TF**	5 - 7,5 %	Trattamento superficiale prima della risemina
c) Trattamento pianta per pianta Romice e malerbe a foglia larga. Ortiche, senecio jacobea.	**Blackex** rapporto di miscelazione 1:2		Colorato in rosso. Trattare pianta per pianta. Periodo di attesa: 3 settimane per vacche con latte. 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Senecio tossico, veratro comune	**Deux 4-D**	0,4 - 0,5 %	
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giappone, cardi vivaci, romici.	**Simplex**	0,5-2,5 %	Polverizzatore a spalla / apparecchio manuale.
Artemisia velenosa (Seneco ppa)	**Asulam LG**	4 l/ha	Periodo di attesa: 3 settimane, animali non in lattazione 2 settimane
Superfici di compensazione della biodiversità			
Cardi, romici dei tetti, agropiro comune, vilucchio.	**Glifonex TF** **Landmaster Supreme 480 TF**	5 - 10 % 5 - 7,5 %	Applicazione con apparecchio manuale senza pol-verizzatore a spalla.
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giappone, cardi vivaci, romici.	**Simplex**	0,5-2,5 %	Trattamento pianta per pianta fino agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.
	Deux 4-D	0,4 - 0,5 %	Solamente trattamento pianta per pianta.

Piano di trattamento vigna 2024

Leu+Gygax SA

	Germogliamento	Punta verde	3 foglie	6 foglie	Grappoli separati	Bottoni fiorali separati	Fioritura	Allegagione	Piccoli piselli	Chiusura del grappolo	Invaiatura	Copertura
Stadio / BBCH	A / 01-03 800 l/ha	C-D / 09 800 l/ha	E / 13 600 l/ha	F / 16 600 l/ha	G / 53 800 l/ha	H / 55 1000 l/ha	I / 65 1200 l/ha	J / 73 1600 l/ha	K / 75 1600 l/ha	L / 77 1600 l/ha	M / 81 1600 l/ha	M / 85 1600 l/ha
Malattie												
Escoriosi	**Microthiol LG** 16 l/ha											
Rossore parassitario	**Legan WG** [14] 0,075 % = 0,6 kg/ha											
Marciume nero (Black-rot)		**Aviso** 0,2 %	**Aviso** 0,2 %	**Bogard** 0,015 %								
Peronospora				**Legan WG** [14] 0,075 % = 0,45 kg/ha	**Mildicut®** [7] 0,25 % = 2 l/ha	**Mildicut®** [7] 0,25 % = 2,5 l/ha	**Valis F** [14] 0,125 % = 1,5 kg/ha	**Cyrano** [14] 0,2 %=3,2 kg/ha	**Mildicut®** [7] 0,25 % = 4 l/ha **+ Folpet** 0,1 %	**Valis F** [14] 0,125 % = 2 kg/ha	**Bacchus** [16] 0,25 % = 4 l/ha	**Cuproxat® liquido** 0,75 % = 12 l/ha **Poltiglia bordolese** 0,75 % = 12 kg/ha
Oidio			**Celos** [17] 0,1-0,4%=0,6-2,4 kg/ha	**Celos** [17] 0,3-0,4%=1,8-2,4 kg/ha	**Kusabi** 0,0375 % = 0,3 l/ha	**Microthiol LG** 0,1-0,4 %=1,6-6,4 l/ha	**Bogard** 0,015%=0,18 l/ha	**Prox** [3] 0,05 % = 0,8 l/ha	**Kusabi** 0,0375 % = 0,3 l/ha	**Prox** [3] 0,05 % = 0,8 l/ha	**Kusabi** 0,0375 % = 0,3 l/ha	**Carbyc** 2-5 kg/ha **Olimag** 0,4 %
Marciume grigio							**Flint** [5] 0,025%=0,3 kg/ha	**Prestop** 2 kg/ha **Penergetic Vigna** 0,025%=0,3 kg/ha **+ Vital** 1 l/ha	**Cantus** [9d] 0,1%=1,2 kg/ha **+ Silwet L-77** [15] 0,1 l/ha **Penergetic Vigna** 0,025%=0,3 kg/ha **+ Vital** 1 l/ha	**Penergetic Vigna** 0,025%=0,3 kg/ha **+ Vital** 1 l/ha	**Switch** [9d] 0,1%=1,2 kg/ha **+ Silwet L-77** [15] 0,1 l/ha **Penergetic Vigna** 0,025%=0,3 kg/ha **+ Vital** 1 l/ha	**Prestop** 2 kg/ha
Insetti												
Acariosi della vite, Eriofide della vite	**Microthiol LG** 16 l/ha	**Siltac®plus** 0,15%										
Nottua terricola o chematobia Bormia delle gemme	**Audienz** 0,015% = 0,12 l/ha											
Acari	**Spray Oil 7E** [50] 1-2% = 8-16 l/ha	**Credo** 0,02 = 0,12 kg/ha	**Siltac®plus** 0,15%									
Tignole della vite						**Audienz** 0,015% = 0,12 l/ha		**XenTari®** 0,1 % = 1,2 kg/ha	**Audienz** 0,015% = 0,12 l/ha			
Mosca della ciliegia												**Drososan / Fruit Fly Attractant** (Trappola e feromone contra mosca del ciliegio) **Invelop** 12,75 kg/ha oppure **Audienz** 0,0067% = 0,12 l/ha
Qualità della frutta	**Ferplus Top** 50-100 kg/ha Spandere a febbraio/marzo	**Kickstart** 60-120 ml/ha diverse volte a distanza di 14 giorni			**Fence N** 2-3 l/ha rafforza le piante, specialemten in presenza di insetti)				**HBR** 2 l/ha			
Nutrienti e oligoelementi	Clorosi ferrica			contro cloriosi e altre mancanze	**Folifert supermix** 2 kg/ha			**Folifert supermix** 2 kg/ha		**Micro Bor** 1 l/ha		**2 x Fetrilon® Combi** 0,075 % = 1-1,5 kg/ha 1 trattamento = 10% Invaiautura 2 trattamento: = 10 giorni dopo Disseccamento del raspo
Erbicidi	**Sunrise** 0,5 % *oppure* **Landmaster Supreme 480 TF** 1.5 - 7.5 l/ha											

(Fonti di immagini: Agroscope)

Osservazioni generali:

Rispettare sempre le raccomandazioni e prescrizioni ufficiali della commissione di zona. Le dosi indicate e le date, sono da adattare in funzione della pressione della malattia e alle condizioni climatiche.

I numeri esposti, si rifanno alla classificazione dell'indice fitosanitario per la viticoltura. Alcune foto, sono state stampate con l'autorizzazione della stazione di ricerca di Changins-Wàdenswil ACW.

Piano di trattamento vigna 2024 senza residui di prodotti fitosanitari di sintesi

Leu+Gygax SA



Stade / BBCH	Gemma del cotone A / 01-03 800 l/ha	Germogliamento C-D / 09 800 l/ha	3 foglie E / 13 600 l/ha	6 foglie F / 16 600 l/ha	Grappoli separati G / 53 800 l/ha	Bottoni fiorali separati H / 57 1000 l/ha	Fioritura I / 65 1200 l/ha	Allegagione J / 71 1600 l/ha	Picolli piselli K / 75 1600 l/ha	Chiusura grappolo L / 77 1600 l/ha	Invaiatura M / 81 1600 l/ha	Copertura M / 85 1600 l/ha
Malattie												
Escoriosi		**Aviso** 0,2 %										
Marciume nero (Black-rot)					**Bogard** 0,0125 %							
Peronospora			**Aviso** 0,2 %	**Mildicut** 0,25 % = 1,5 l/ha	**Valis F** 0,125 % = 1 kg/ha	**Mildicut** 0,25 % = 2,5 l/ha	**Valis F** 0,125 % = 1.5 kg/ha	**Cyrano** 0,2 % = 3,2 kg/ha	**Cuproxat liquido** 3 l/ha	**Cuproxat liquido** 2,5 l/ha	**Cuproxat liquido** 2 l/ha	**Poltiglia bordolese LG** 1.5 kg/ha
Oidio			**Celos** [17] 0,1-0,4%=0,6-2,4 kg/ha	**Kusabi** 0,1125 l/ha	**Prox** 0,05 % = 0,4 l/ha	**Kusabi** 0,1875 l/ha	**Bogard** 0,0125 % = 0,15 l/ha	**Prox** 0,05 % = 0,8 l/ha	**Microthiol LG** 6 l/ha	**Microthiol LG** 6 l/ha	**Microthiol LG** 6 l/ha	**Carbyc** 5 kg/ha
Botrytis							**Flint** 0,25 % = 0,3 kg/ha		**Prestop** 2 kg/ha	**Penergetic p Vigna** 0,25 kg/ha	**Prestop** 2 kg/ha	**Penergetic p Vigna** 0,25 kg/ha
									Dexa Pro 4 l/ha	**Vital** 1 l/ha	**Dexa Pro** 4 l/ha	**Vital** 1 l/ha
										Action F Viti 10 l/ha	**HBR** 0,5 l/ha	**HBR** 0,5 l/ha
			Polygrün 0,5 l/ha		**Polygrün** 0,5 l/ha	**Polygrün Blüte** 1 l/ha	**Polygrün Blüte** 1 l/ha	**Polygrün** 0,5 l/ha	**Polygrün** 0,5 l/ha		**Hi-Grow** 5 l/ha	**Hi-Grow** 5 l/ha
Insetti												
Acari	**Microthiol LG** 2 % = 16 kg/ha											
Tignole della vite								**XenTari** 0.1 % = 1.2 kg/ha				
Mosca della ciliegia											**Invelop F** 12.75 kg/ha	
									Drososan / Fruit Fly Attractant trappola e feromone contra mosca del ciliegio			
Rafforzare le piante in caso di attacchi di insetti				**Pidel** 4 l/ha		**Fence N** 2-3 l/ha		**Olimag** 3 l/ha	**Olimag** 3 l/ha	**Olimag** 3 l/ha		
Rafforzare le piante con i fertilizzanti			**Kickstart** 0,15 l/ha	**Kickstart** 0,15 l/ha	**Kickstart** 0,15 l/ha				**Fetrilon-Combi 1** 1 kg/ha		**Fetrilon-Combi 1** 1 kg/ha	

(Fonti di immagini: Agroscope)

Viticoltura

Colture orticole

Leu+Gygax SA

Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

	Cavolfiori, broccoli, romanesco (cavoli a infiorescenza)	Cavolo cinese (Cavoli fogliacei)	Cavolo piuma (Cavoli fogliacei)	Cavolo bianco, rosso verzotto, romanesco, (Cavolo cappuccio)	Cavolo di Bruxelles	Cavolo rapa			GA	
Graminacee annuali, riccaci di cereali, gramigna	●	●	●	●	●	●	**Agil**	0,75 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Dicotiledoni annuali, monocotiledoni annuali	●	●	●	●	●	●	**Caravel**	0,25 l/ha		prima o subito dopo il trapianto.
Dicotiledoni annuali, monocotiledoni annuali	●			●	●	●	**Galipan**	2,5 l/ha		Prima della semina o dell'impianto, con incorporazione superficiale. Solo broccoli.
Dicotiledoni	●		●	●	●	●	**Lentagran**	2 kg/ha	28 / 42	3-4 settimane dopo il trapianto o la semina.
Erbicida prima del trapianto	●	●	●	●	●	●	**Pendi**	3,5 - 4,4 l/ha		Solamente possibile, se si trapianta con una **macchina assolcatrice.**
Erbicida a lunga efficacia nei cavoli piantati.	●	●	●	●	●	●	**Trax**	1,5 - 2 l/ha		Massimo 1 kg di materia attiva/ha. **(SPe)**
Malattie da fungo sulle foglie	●	●	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per anno. **(SPe)**
Malattie da fungo sulle foglie, oidio, peronospora delle crucifere, maculatura anulare del cavolo, ruggine bianca, effetto parziale: marciume grigio.	●	●	●	●	●		**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura. Solo cavolfiore.
Maculatura anulare nera del cavolo, malattie da fungo sulle foglie, marciume da phoma delle crocifere, effetto parziale: peronospora	●	●	●	●	●		**Flint**	0,4 kg/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Nervazione nera delle Crocifere	●	●	●	●	●	●	**Flowbrix** o **Cuproxast liquido**	0,2 %		Solo per la coltivazione di piante giovani. Solo per la coltivazione di piante giovani.
Nervazione nera delle Crocifere	●	●	●	●	●	●	**Poltiglia bordolese LG**	5 kg/ha		Solo per la coltivazione di piantine.
Malattie da fungo sulle foglie	●	●	●	●	●	●	**Quiz** 0,225 l/100 l +	**Magna Bon** 1 l/ha		2 trattamenti per l'avvio della coltura.
Peronospora	●				●		**Revus**	0,6 l/ha	14	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Altiche, nottue terricole o vermi grigi, nottue, tignola delle Crocifere, cecidomia del cavolo, mosca minatrice della colza, cavolaie	●	●	●	●	●	●	**Audienz**	0,03-0,04 % 0,3-0,4 l/ha	7	
Mosca del cavolo	●	●	●	●	●	●	**Audienz**	0,2-0,36 % 12-20 ml/1000 plants		Applicazione: per trattamenti di irrigazione delle giovani piante.
Tignola delle Crocifere	●	●	●	●	●	●	**Audienz**	0,2 l/ha	3	Dall'inizio dell'attacco. **(SPe)**
Afidi	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde**	2,5 l/ha	7	Massimo 4 trattamenti a 7 giorni di intervallo. **(SPe)**
Afidi	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,05 %	7	Dall'inizio dell'attacco. **(SPe)**
Nottue defogliatrici, nottua del cavolo, tignola delle Crocifere, cavolaie	●	●	●	●	●		**Rapid**	1,5 kg/ha	7	**SPe)**
Aleurodidi, afidi, ragnetti, insetti succhiatori	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,1 - 0,15 %	14	Unicamente per tempo secco, durante la giornata. La poltiglia deve asciugare rapidamente.
Afidi, altiche, nottue terricole o vermi grigi, nottue (defogliatrici), cecidomia del cavolo, tignola delle Crocifere, minatrici, tripidi, aleurodidi, cavolaie.	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Parzialmente con autorizzazione speciale. **(SPe)**
Aleurodidi, afidi, ragnetti	●	●	●	●	●	●	**Vista**	20 l/ha	7	Bagnare bene la pianta da tutte le parti. Efficacia solo per contatto diretto.
Nottue (defogliatrici), tignola del cavolo, cavolaie.	●	●	●	●	●	●	**XenTari**	1 kg/ha		
	●	●	●	●	●	●	**Noctudor**	0,5 %		A intervalli di 7-14 giorniCavboli
Rafforzare le piante in caso di attacchi di insetti	●	●	●	●	●	●	**Pidel**	0,4 %		A intervalli di 7-14 giorni.
	●	●	●	●	●	●	**Harvel**	5-10 l/ha		Applicazioni al suolo.
Soluzione di azoto organico con estratti di piante	●	●	●	●	●	●	**Fence N**	1,5 - 3 l/ha		
Carenza di calcio (annerimento del cuore)	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi STIPP** **Tip-Calcium**	3 l/ha 1,5 - 3 l/ha		Specialmente per il cavolo cinese, cavolfiore e cavolo di Bruxelles minimo 3 trattamenti.
Carenza di boro	●	●	●	●	●	●	**Micro Bor**	3 l/ha		Solo al bisogno, (BBCH16-18).
Stimolatore della crescita	●	●	●	●	●	●	**Fetrilon Combi**	0,1 - 1 kg/ha		Aggiungere ai trattamenti con fungicidi e insetticidi.
Carenza di magnesio	●	●	●	●	●	●	**Olimag**	0,4 - 0,6 %		
	●	●	●	●	●	●	**Polygrün**	1 l/ha		2 - 3 trattamenti.
Vitalità legata alla gestione dello stress, dovuto al clima	●	●	●	●	●	●	**Vital**	1 l/ha		2 - 3 trattamenti.
	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p orticoltura**	0,1-0,2 kg/ha		2 - 3 trattamenti.

SPe = Prestazione delle acque (consultare tabella pagina 61 a 67)

Colture orticole

Leu+Gygax SA

Carote

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

Dicotiledoni annuali, monocotiledoni annuali	**Pendi + Caravel**	1-2 l/ha 0,15 l/ha		Immediatamente dopo la semina. In pre-emergenza non su semina superficiale.
Dicotiledoni annuali, monocotiledoni annuali	**Laguna**	2-3 l/ha	80	In pre-emergenza (immediatamente dopo la semina), più 1 l/ha in post-emergenza (BBCH 13). **(SPe)**
Dicotiledoni annuali, monocotiledoni annuali	**Condoral SC**	0,1-0,2 l/ha		Applicazione: allo stadio 10-16 BBCH. Trattamento split (massimo 0.6 l/ha **(SPe)**
Graminacee annuali, ricacci di cereali, gramigna	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	28	2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Alternaria, gambo nero	**Cuproxat liquido**	13-18 l/ha	21	4 kg di rame metallico al massimo per ha e anno.
Favorisce la resistenza alle malattie	**Quiz**	0,2 %	21	
Alternaria, gambo nero	**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Alternaria, gambo nero	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per appezzamento e anno.
Alternaria, gambo nero oidio	**Flint**	0,4 kg/ha	7	Massimo 3 trattamenti per appezzamento e anno **(SPe).**
Mosca della carota, nottue del terreno	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Polverizzare durante il periodo di volo della mosca, ripetere tutti i 7 giorni. **(SPe).**
Afidi delle foglie, mosca minatrice, mosca della carota, tripidi.	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Trattare a 7-14 giorni di intervallo. Massimo 2 trattamenti per coltura. **(SPe)** Solo con autorizzazione speciale.
Afidi	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Massimo 2 trattamenti a 7-10 giorni d'intervallo. **(SPe)**
Afidi, tripidi	**Siltac plus**	0,15 %		2-3 trattamenti a 7-10 giorni d'intervallo. Massimo 2 trattamenti per coltura.
Afidi, mosca bianca	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti, Intervallo tra i trattamenti almeno 7 giorni. **(SPe)**
Crescita migliorata	**Magna Bon**	0,5-2 l/ha		Soluzione di concime di rame solubile in acqua.
Crescita migliorata	**Kickstart**	0,15 l/ha		Uso multiplo. Il fertilizzante oltre che micro-nutrienti, contiene zinco e acidi fulvici.
Crescita migliorata	**Final K**	1-1,5 l/ha		2-3 trattamenti
Crescita migliorata	**Azofix plus**	1,5 l/ha		Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Crescita migliorata	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		Aumenta il fosforo disponibile per le piante.

Diagonal®

Fungicida per frutta, piccoli frutti, legumi, grandi colture e piante ornamentali

Leu+Gygax SA

Cipolle / Scalogno

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

	Cipolle (condimento)	Cipolle vegetali	Erba cipollina	Scalogno			GA	
	●	●	●		**Pendi**	2-3 l/ha		Prima della germinazione delle malerbe Diminuire la dose nei suoli leggeri. Profondità di semina minimo 3 cm.
Contro dicotiledoni	●	●	●	●	**Lentagran**	2 kg/ha	28	In post-emergenza a partire dallo stadio 3 foglie.
Contro graminacee annuali e gramigna	●	●	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contra gramigna.
Contro dicotiledoni e graminacee annuali	●	●	●	●	**Laguna**	3 l/ha		Pre-emergenza. Solamente nei bulbi piantati. **(SPe)**
Cladosporiosi, muggine, macchie foglieri	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. **(SPe)**
Oidio	●	●	●	●	**Carbyc** 0,3-1 %	2,5-5 kg/ha	1	2 trattamenti a intervalli di 10 giorni. **(SPe)**
Peronospora	●	●	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura. **(SPe)**
Botrite	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha	14	Massimo 2 trattamenti all'anno **(SPe)**
Marciume bianco della cipolla	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha		Massimo 2 trattamenti all'anno. 1° trattamento allo stadio a 2 foglie 2° trattamento 3 settimane dopo (semina autunnale in primavera). **(SPe)**
Tripidi				●	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura/anno.
Mosca minatrice, tripidi	●	●	●		**Audienz**	0,4 l/ha	7	Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. **(PSe)**
Afidi, mosca bianca	●	●	●	●	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti per coltura. Trattare ad intervalli da 7 giorni. **(PSe)**
Afidi	●	●		●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Non omologato nell'erba cipollina. **(SPe)**
Afidi delle foglie, nottue terricole, tignola del porro, mosca minatrice, tripidi	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture. Trattare a intervalli di 7-14 giorni **(PSe)** Solo con autorizzazione speciale.
Contro gli insetti succhiatori	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,15 %		Max. 3 trattamenti per coltura. Trattare ad intervalli di 7-14 giorni.
Nottue				●	**XenTari**	1 kg/ha		Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali a digiuno. **(SPe)**
Lumache	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Spandere sul terreno. Non sporcare le parti commestibili delle piante.
Campagnoli, talpe	●	●	●	●	**Campa** 1-5 cartucce / colonia			Chiudere bene le gallerie.
Anti-germinativo	●	●		●	**Fazor**	3,5-4 kg/ha		20-30 % degli steli piegati. Per i dettagli vedere pagina 41 informazioni su Fazor.
	●	●	●	●	**Dexa Pro**	4 l/ha		Aggiungere alla poltiglia.
	●	●	●	●	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Aggiungere alla poltiglia.
Vitalità e gestione dello stress	●	●	●	●	**Polygrün**	1 l/ha		2-3 trattamenti. Dallo stadio BBCH 14.
	●	●	●	●	**+ Vital**	1 l/ha		
	●	●	●	●	**+ Penergetic p** coltura orticole	0,1 kg/ha		
	●	●	●	●	**Azofix plus e Fosfix plus**	1 l/ha		Aumentare l'azoto e il fosforo nel suolo

Colture orticole

Leu+Gygax SA

Cucurbitacee

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

	Cetrioli, cetrioli da inscatolare, cetriolini	Anguria	Melone	Zucca da olio	Zucca con buccia commestibile	Zucca con buccia non commestibile			GA	
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali (piena terra)	●				●		**Goltix 700 SC**	5 l/ha		Applicazione tra le file. Massimo 1 trattamento per coltura.
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali (piena terra)				●		●	**Caravel**	0,25 l/ha		Pre-emergenza: Subito dopo la semina
Gommosi delle cucurbitacee [Didymella bryoniae]	●						**Bogard**	0,5 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**
Alternaria, oidio, cladosporiosi					●		**Bogard**	0,5 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**
Peronospora	●				●		**Booster**	3,5 l/ha	15	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Oidio	●	●	●	●	●	●	**Carbyc** BIO TEAM BF	1 % 3-5 kg/ha		Utilizzare allo stadio BBCH 12 - 89.
Oidio	●	●	●	●	●	●	**Celos** BIO	0,1-0,2 % 1-2 kg/ha	3	Attenzione alle temperature.
Oidio	●	●	●	●	●	●	**Microthiol LG** BIO TEAM BF	2 l/ha	3	
Antracnosi, ticchiolatura	●		●		●		**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio / Peronospora	●	●	●	●	●	●	**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	21	Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio / Peronospora (in serra)	●		●		●		**Diagonal**	0,08 % 0,8 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio,	●				●		**Flint**	0,5 % 0,5 kg/ha	3	Trattare a partire dall'attacco.
Gommosi delle cucurbitacee	●	●	●	●	●	●	**Flint**	0,25 kg/ha	3	Massimo 3 trattamenti.
Effetto parziale: Maculature angolari, peronospora delle Cucurbitacee	●						**Flowbrix** BIO	2 l/ha	21	Primo trattamento: dall'inizio dell'attacco. Trattare poi a intervalli di 7-10 giorni. Prodotto di alta qualità.
	●						**Cuproxat liquido** BIO	4 l/ha	21	
	●						**Poltiglia bordolese LG** BIO	0,5 % 5 kg/ha	21	
Botrite (in serra)	●						**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %		Massimo 4 trattamenti con 3 settimane d'intervallo.
Gommosi delle cucurbitacee (in serra)	●						**Prestop** BIO TEAM BF	1 %		Ripetere i trattamenti a intervalli di 3-4 settimane.
Malattie causate da funghi patogeni del suolo [Fusarium spp, Phytophthora spp, Pythium spp, Rhizoctonia spp].	●						**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 kg/m^3		Irrigazione prima della semina o della piantagione. Coltivazione di giovani piante e trattamento dei semenzai.
Peronospora (in serra)	●	●	●	●	●	●	**Ranman Top**	0,5 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti
Botrite, sclerotinia	●						**Switch**	0,1 %	3	Massimo 2 trattamenti per cultura. **(SPe)**
		●	●			●	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	3	In serra, massimo 3 trattamenti.
	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 kg/ha	3	Periodo di attesa per la zucca d'olio: 14 giorni
Afidi, tripidi	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,1 %		2-3 trattamenti a 7-10 giorni d'intervallo.
Afidi	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,05 %	7	Rispetta gli ausiliari (senza l'afide del melone).
Nottue	●	●	●	●	●	●	**Rapid**	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Massimo 2 trattamenti per anno. **(SPe)**
Acari rossi (uova, larve, adulti)	●	●	●	●	●	●	**Acramite**	0,25 l/ha	7	**(SPe)**
Acari rossi (uova, larve, adulti)	●	●	●	●	●	●	**Credo**	0,32 l/ha	7	Applicabile fino all'11.07.2025 al più tardi. **(SPe)**
Afidi, acari rossi	●	●	●	●	●	●	**Vista** BIO TEAM BF	20 l/ha	7	Cercare di bagnare bene le piante.
Afidi, acari rossi	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha		Cercare di bagnare bene le piante.
Nottue	●		●		●	●	**XenTari** BIO TEAM BF	0,1 % 1 kg/ha		
Senità del fogliame	●	●	●	●	●	●	**Dexa Pro** BIO TEAM BF	0,7-1 %		Utilizzare allo stadio BBCH 12 - 89.
Concime con magnesio	●	●	●	●	●	●	**Olimag** TEAM BF	0,4-0,8 %		Incorporare prima o dopo il trapianto.
Carenza in ferro (per es. cocomeri verdi in serra)	●	●	●	●	●	●	**Ferplus Top**	0,3-0,7 kg/are		

Colture orticole

Leu+Gygax SA

Malattie / Insetticidi — **GA = Giorni di attesa**

Erbette da cucina

	Prezzemolo	Erba Cipollina	Basilico	Salvia	Aneto	Cumino				
Graminacee annuali	●						**Agil**	0,75-1,25 l/ha	21	In post-emergenza
Malerbe e graminacee annuali	●				●		**Caravel**	0,15 l/ha	90	In pre-emergenza, subito dopo la semina.
Malerbe e graminacee annuali		●				●	**Goltix 700 SC**	2-4,5 l/ha	40	Trattamento split
Malattie fungine delle foglie, alternaria, septoriosi, ticchiolatura	●	●	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	21	Massimo 3 trattamenti per parcella e per anno,
Alternaria, septoriosi, ruggine	●	●					**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Funghi patogeni del suolo [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●	●	●	●	●	●	**Prestop** BIO TEAM BF	500 g/m^3		Prima della semina o dell'impianto, possono essere mescolati al substrato.
Elmintosporiosi	●	●	●	●	●	●	BIO TEAM BF **Quiz** 0,225 %	**+ Magna Bon** 1 l/ha TEAM BF		2 trattamenti per avviare la coltura.
Peronospora delle erbette	●	●	●	●	●	●	**Revus**	0,6 l/ha	7	Max. 1/6 trattamenti per parcella e anno.
Crisomelidi, mosca minatrice, tripidi, altiche, Nottue terricole o vermi grigi, nottue	●	●	●	●	●	●	**Audienz** BIO	0,02% 0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Afidi, mosca bianca	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	1,5 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Afidi della foglia	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Insetti succhiatori	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,1-0,15 l/ha		Ripetere a distanza di 5-7 giorni.
Afidi, altiche, nottue terricole o vermi grigi, tignola del porro, mosca minatrice, psilla della carota, tripidi	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura. Solo con autorizzazione speciale.
Afidi, ragnetti	●	●	●	●	●	●	**Vista** BIO TEAM BF	2 % 20 l/ha	7	Applicare secondo le necessità, se necessario ripetere.
Nottue	●	●	●	●	●	●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	Non applicare in condizioni di freddo. Solo sui giovani stadi larvali.
Limacce del genere Deroceras, Limacce del genere Arion	●	●	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Non sporcare le parti di piante commestibili.
Talpidi (fam.) Campagnoli	●	●	●	●	●	●	**Campa** TEAM BF	1-5 cartouches/colonie		Chiudere bene le gallerie.
Rinforzamento delle piante	●	●	●	●	●	●	**Fence N** BIO TEAM BF	1,5-3 l/ha		Utilizzare allo stadio BBCH 12-49.
Concime con mangesio	●	●	●	●	●	●	**Olimag** TEAM BF	0,4-0,8 %		Utilizzare allo stadio BBCH 12-49.
Fertilità del terreno	●	●	●	●	●	●	**Penergetic b** BIO TEAM BF	0,3-0,5/ha		Prima della semina o trapianto.
Salute dei vegetali	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p legumi**	0,1 kg/ha BIO TEAM BF		Ripetere più volte.
Salute dei vegetali	●	●	●	●	●	●	**Vital** BIO TEAM BF	1 l/ha		Microorganismi effettivi.
Stimolatore biologico	●	●	●	●	●	●	**HBR** TEAM BF	1-2 l/ha		Riduce lo stress climatico.
Umate di potassio organico	●	●	●	●	●	●	**LiqHumus 18** BIO TEAM BF	35 l/ha		Forma l'humus.
Fertilità del terreno	●	●	●	●	●	●	**Terrasan** BIO TEAM BF	1,5-5 l/ha		Microorganismi effettivi.
Stimolatore bio	●	●	●	●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	1,5-3 l/ha		Estratti di alghe.
Concime fogliare	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,4 % TEAM BF		Concime a base di calcio.
Concime fogliare	●	●	●	●	●	●	**Kickstart** TEAM BF	0,1 l/ha		Oligo-elementi.

SPe = Prestazione delle acque (consultare tabella pagina 61 a 67)

Colture orticole

Leu+Gygax SA

GA = Giorni di attesa

Finocchio

Mono e dicotiledoni annuali	**Laguna**	2 l/ha	90 70	seminato piantato Subito dopo la semina o il trapianto. Terreni legeri dosaggio inferiore.
Malerbe e graminacee	**Pendi**	2-4 l/ha		
Graminacee annuali	**Agil**	1 l/ha	28	
Mono e dicotiledoni annuali	**Caravel**	0,25 l/ha	60	seminato: in pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. piantato: subito dopo il trapianto.
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Dall'inizio dell'attacco. Massimo 3 trattamenti per parcella e anno, **(SPe)**
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie, peronospora delle ombrellifere	**Diagonal**	1 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Peronospora delle ombrellifere	**Revus** **+ Quiz**	0,6 l/ha 1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, nottue terricole o vermi grigi, mosca minatrice, psilla della carota, mosca de la carota, tripidi	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Solo con autorizzazione speciale. **(SPe)**
Afidi, tripidi	**Siltac plus**	0,1 l/ha		Cercare di bagnare bene le piante.
Larve defogliatrici, nottue terricole o vermi grigi, nottue (defogliatrice), mosca minatrice, tripidi.	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7 giorni.
Afidi, mosca bianca	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti a intervalli di 7 giorni.
nottue (defogliatrice)	**XenTari**	1 kg/ha	3	Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali giovani.
Stimolazione della crescita	**HBR**	1 l/ha		Contro lo stress da freddo.
Carenza di boro	**Micro Bor**	1-3 l/ha		Ripetere se necessario.
Carenza di calcio e oligo-elementi	**Basfoliar Combi** STIPP	3 l/ha		2 - 3 volte.

Porri

Erbicida dopo la piantagione	**Spark**	2 kg/ha		Massimo 1 trattamento per coltura. **(SPe)**
	Lentagran	2 kg/ha	28	a partire dallo stadio 3 foglie.
Graminacee, ricacci di cereali, gramigna	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Malerbe e graminacee	**Pendi**	2-4 l/ha		Porri seminati. In pre-emergenza.
Malerbe e graminacee	**Pendi**	4-5 l/ha		Porri trapiantati. Prima del trapianto.
Cladosporiosi, ruggine, macchie purpuree	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. **(SPe)**
Alternaria spp. Phytophthora spp.	**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. **(SPe)**
Alternaria, cladosporiosi dei porri, fitoftoria del porro, ruggine dei porri.	**Flint**	0,4 kg/ha	14	Massio 2 trattamenti allo stadio BBCH 41-49.
Mosca minatrice, nottue terricole o vermi grigi, afidi delle foglie, tignola della cipolla, tripidi.	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Trattare a intervalli di 7-14 giorni. Massimo 3 trattamenti con questa materia attiva. **(SPe).** Solo con autorizzazione speciale.
Tignola della cipolla	**XenTari**	1 kg/ha	7	
Insetti succhiatori	**Siltac plus**	0,15 %		La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Tignola della cipolla	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura. **(SPe)**
Mosca minatrice, tripidi	**Audienz**	0,4 l/ha	7	Massimo 4 trattamenti per parcella/anno/coltura. **(SPe)**
Afidi, mosca blanca	**Piretro verde**	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti par colture e anno. Trattare a intervalli di 7 giorni. **(SPe)**
Migliora la crescita.	**Azofix plus**	1,5 l/ha		Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Migliora la crescita.	**Fosfix plus**	1,5 l/ha		Aumenta il fosforo disponibile per le piante.

SPe = Prestazione delle acque (consultare tabella pagina 61 a 67)

Colture orticole

Leu+Gygax SA

Pomodori

GA = Giorni di attesa

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

Graminacee annuali e gramigna	**Agil**	1,5-2,5 l/ha	56	7-10 giorni dopo il trapianto. **(SPe)**
Erbicida in piena terra	**Condoral SC**	0,5 l/ha		Stadio 2-3 foglie delle malerbe.
Alternaria, septoriosi, oidio	**Bogard**	0,05 %	3	Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**
Oidio Peronospora marciume bruno	**Bogard** **+ Ranman Top**	0,05 % 0,05 %	3	Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**
Oidio	**Celos** BIO	0,1-0,2 %	3	Attenzione alla temperatura.
Oidio	**Carbyc** BIO TEAM BF	0,5-1 %		Applicare allo stadio BBCH 12-89.
Alternaria, peronospora del pomodoro, (effetto partziale), septoriosi, cancro batterico del pomodoro	**Cuproxat liquido** BIO	1,3-1,8 %	3	
	Flowbrix BIO	0,45-0,7 %	3	
	Poltiglia bordolese LG BIO	1,3-1,8 %	3	
Alternaria, oidio, peronospora del pomodoro	**Diagonal**	1 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Muffa grigia, sclerotina (in	**Pyrus 400 SC**	0,5 %		
Botrite	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %		
Fusarium spp., phytophthora, spp., pythium spp., rhizoctonia spp.	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %		Inaffiare (sotto serra).
Botrite, sclerotinia	**Switch**	0,1 %	3	Massimo 2 trattamenti per coltura. **(SPe)**
Mosca minatrice	**Audienz** BIO	0,4-0,8 l/ha	3	**(SPe)**
Acari, agrotide, tripidi	**Audienz** BIO	0,03-0,04% 0,3-0,4 l/ha	3	**(SPe)**
Minatrice dei pomodori	**Audienz** BIO	0,03% 0,3 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura e anno.
Acari,diversi	**Acramite**	0,25 l/ha	3	Applicabile fino all'11.07.2025 al più tardi. **(SPe)**
Afidi diversi	**Credo**	0,04 %	3	**(SPe)**
Mosca bianca, afidi	**Oikos** BIO	0,15 %	3	In caso di infestazione 2-3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, mosca bianca	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti per coltura. Trattare a distanza di minimo 7 giorni. **(SPe)**
	Pirimor	0,05 %	7	Rispetta gli ausiliari. **(SPe)**
Afidi, altiche, mosca minatrice, tripidi	**Rapid**	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Massimo 2 trattamenti. **(SPe)**
Mosca bianca	**Siltac plus**	0,1 %		La poltiglia polverizzata deve asciugare rapidamente.
Nottue	**Techno 10 CS**	0,01 % 0,1 l/ha	3	Trattamenti a intervalli di 7 - 14 giorni. Massimo 2 trattamenti con questa sostanza attiva **(SPe).** Solo con autorizzazione speciale.
	Vista BIO TEAM BF	2 % 20 l/ha	7	Non trattare al di sopra dei 25 °C.
	XenTari BIO TEAM BF	0,1 %		In caso di infestazione, 2 - 3 trattamenti a intervalli di 7 - 10 giorni.
Carenza di calcio Botrite sui fiori	***Insetti utili: contattare il vostro consulente regionale L+G***			
Carenza di ferro	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,3 % (2-3 l/ha) TEAM BF		Trattare 3-5 volte se necessario al 0.1 %. Inaffiare 5 l/m² durante 1 settimana, secondo bisogno.
Carenza di magnesio	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Concime fogliare compatibile con le piante.
Biostimolare organico	**Aminopower plus** TEAM BF	1-2 l/ha		Miscibile con i fungicidi.

Colture orticole

Insalate, cicoria, indivia, lattughe diverse

Leu+Gygax SA

GA = Giorni di attesa

	Lattuga cappuccio	Insalata (Asteraceae)	Indivia e cicoria a foglie	Baby-Leaf	Cicoria (produzione radici)	Formentino	Ruccola			GA	
Graminacee, ricacci di cereali					●			**Agil**	1 l/ha	56	Solamente Baby-Leaf (Chenopodiaceae)
Graminacee, ricacci di cereali				●				**Agil**	0,75-2,5 l/ha	21	Solamente Baby-Leaf (Chenopodiaceae)
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali				●		●	●	**Galipan**	0,85 l/ha	21	Solamente Baby-Leaf (Brassicaceae) pieno campo
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali							●	**Goltix 700 SC**	1 l/ha	35	Pieno campo
Erbicidi dopo il trapianto o la semina	●	●	●		●			**Granat**	2,5-3,75 l/ha		Pieno campo
Pre-emergenza						●		**Soleto**	0,5-0,75 l/ha		solamente su colture seminate. **(SPe)**
A partire dallo stadio 3 foglie della coltura							●	**Trax**	0,5 l/ha	14	Pieno campo **(SPe)**
Peronospora	●			●				**Bion**	60 g/ha	7	Solamente Baby-Leaf
Oidio			●			●		**Bogard**	0,5 l/ha	21	Massimo 3 trattamenti per parcella e per anno.
Antracnosi della lattuga	●		●					**Bogard**	0,5 l/ha	21	Massimo 3 trattamenti per parcella e per anno.
Alternaria, peronospora, ruggine					●			**Bogard**	0,5 l/ha	21	Massimo 1 trattamento per coltura.
Peronospora	●	●	●	●	●			**Booster**	3-3,5 l/ha	14 15	Massimo 4 trattamenti per coltura.
Elmintosporiosi				●				**Diagonal**	1 l/ha	7	Solamente Baby-Leaf (Brassicaceae). Massimo 1 trattamento
Oidio delle Asteracee, ticchiolatura					●			**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Peronospora, rhizoctonia della lattuga. Effetto parziale: marciume grigio.	●	●	●					**Diagonal**	1 l/ha	14	Solamente 2 trattamente per coltura.
Malattia da fungo sulle foglie, peronospora. Effetto parziale: marciume grigio							●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Alternaria spp.				●				**Flint**	0,4 kg/ha	21	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Marciume grigio (Botrytis cinerea), sclerotonia.	●	●	●	●				**Flint**	0,4 kg/ha	21	Massimo 2 trattamenti per colture. Solo Baby-Leaf (Asteraceae)
Peronospora	●	●	●	●			●	**Revus**	0,6 l/ha	7	All'inizio dell'attacco.
Phytophthora cryptogea					●			**Revus**	0,5 ml/m²	21	All'inizio della coltura forzata solo un trattamento.
Botrite, rhizoctonia solani, sclerotonia	●	●	●		●			**Switch**	0,5-0,8 kg/ha		Trattamenti fino a 14 giorni dopo il trapianto. **(SPe)**
Botrite, rhizoctonia solani	●	●	●		●			**Switch**	0,6 kg/ha	35	Trattamenti fino a 14 giorni dopo il trapianto. Massimo 4 trattamenti per anno.
Botrite, rhizoctone solani					●			**Switch**	4,5 g/m²	21	Massimo 1 trattamento per ciclo di produzione.
Larve defogliatrici, Nottue terricole o vermi grigi, nottue, mosca minatrice, tripidi				●				**Audienz**	0,2 l/ha	3	Solamente Baby-Leaf (Brassicaceae)
Nottue terricole o vermi grigi, nottue, tripidi	●	●	●	●				**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura. Solamente Baby-Leaf (Asteraceae)
Nottue terricole o vermi grigi, nottue (defoliatrice)				●				**Audienz**	0,2-0,4 l/ha	7	Massimo 1 trattamento per coltura. Solamente Baby-Leaf (Chenopodiaceae)
Mosca minatrice, mosca della barbabietola				●				**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura. Solamente Baby-Leaf (Chenopodiaceae)
Tripidi				●				**Audienz**	0,2 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura. Solamente Baby-Leaf (Chenopodiaceae)
Mosca minatrice, mosca della barbabietola						●		**Audienz**	0,03 % 0,3 l/ha	14	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Larve defogliatrici, Nottue terricole o vermi grigi, altiche							●	**Audienz**	0,02 % 0,2 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per coltura.
Afidi	●	●	●					**Oikos** BIO TEAM BF	1,5 l/ha	7	
Afidi	●	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	1,5 l/ha	3	Solamente Baby-Leaf (Brassicaceae)
Afidi				●	●	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	eccetto Baby-Leaf (Asteraceae)
Afidi delle radici	●	●	●					**Pirimor**	0,1 % 5 g/m² plante	42	Massimo 1 trattamento per coltura.
Afidi, insetti succhiatori	●	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,1-0,15 %		Quantità d'acqua 400 l/ha. La poltiglia deve asciugare rapidamente.
Afidi delle foglie, nottue terricole o vermi grigi, mosca minatrice, tripidi	●	●	●	●	●		●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Massimo 2 trattamenti per colture a intervalli di 7 giorni con autorizzazione speciale. **(SPe)**
Nottue defogliatrice	●	●	●	●	●	●	●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	
Carence di calcio (Disseccamento interno	●	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi STIPP** TEAM BF	3 l/ha		Specialmente cicorino, lattuga cappuccio e insalata (Asteracea).
Vitalità e gestione dello stress legato al clima	●	●	●	●	●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	0,5 kg/ha		2-3 trattamenti.
	●	●	●	●	●	●	●	**Vital** BIO TEAM BF	0,1 %		2-3 trattamenti.
	●	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p colture orticole** BIO TEAM BF	0,1 kg/ha		2-3 trattamenti.
Stimola le piante che soffrono di condizioni stressanti	●	●	●	●	●	●	●	**Olimag** TEAM BF	0,4-0,6 %		Applicazione: 2-3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.

Piante ornamentali / Giardino

Leu+Gygax SA

Erbicidi

Spettro dd'azione	Colture					Prodotto		Osservazione
	Alberi e arbusti (fuori foresta)	Coltura di fiori e piante verdi	Maggese / Terreno a riposo	Rose	Tappeto erboso e campi da sport			
Graminacee annuali, miglio	●	●		●		**Agil**	1-1,25 l/ha	Assicurarsi della compatibilità colturale.
Poa annua	●	●		●		**Agil**	2,5 l/ha	
Gramigna	●	●		●		**Agil**	1,5-2,5 l/ha	
Dicotiledoni incluso il trifoglio bianco					●	**Duplosan KV Combi**	4 l/ha	Non utilizzare subito dopo lo sfalcio del tappeto.
						o		
Malerbe annuali e vivaci,					●	**Rasenrein**	2 %	
Specie di veronica					●			
Bugola rampicante					●			
Edera terrestre					●			
Dicotiledoni annuali e graminacee	●					**Galipan**	2,5 l/ha	
Dicotiledoni annuali e graminacee (pieno campo)	●	●		●		**Glifonex TF**	2-3 l/ha	Erbicida totale. Attenzione alla deriva.
Dicotiledoni vivaci e graminacee	●	●		●		**Glifonex TF**	4-10 l/ha	
Monocotiledoni e dicotiledoni annuali	●					**Granat**	2,5-4 l/ha	Applicare da fine ottobre a metà gennaio. Assicurarsi della compatibilità colturale.
Gramigna	●					**Granat**	5-6,25 l/ha	
Dicotiledoni vivaci e graminacee annuali (pieno campo)	●		●			**Landmaster Supreme 480 TF**	1,5-2,25 l/ha	Erbicida totale. Attenzione alla deriva.
Dicotiledoni annuali e graminacee pluriennali	●		●			**Landmaster Supreme 480 TF**	1,5-7,5 l/ha	
Gramigna	●		●			**Landmaster Supreme 480 TF**	1,5-3 l/ha	
Dicotiledoni annuali e graminacee (pieno campo)	●					**Trax**	2 l/ha	Massimo un'applicazione per coltura e per anno. Dopo il trapianto .

Piante ornamentali / Giardino

Leu+Gygax SA

Concimi e diversi

Spettro d'azione	Alberi e arbusti (fuori foresta)	Floricoltura e piante verdi	Maggese	Bosso	Rose	Tappeto erboso e campi da sport	Prodotti		Osservazioni
Miglioramento dell'umidificazione	●	●	●	●	●	●	**Silwet L-77**	0,1 l/ha	A quantità d'acqua ridotta, migliora la distribuzione della materia attiva.
Miglioramento dell'adesività	●	●	●	●	●	●	**Codacide** BIO TEAM BF	2 l/ha	Come additivo ai trattamenti fungicidi o insetticidi.
Carenza di ferro (Fe)	●	●		●	●	●	**Ferplus Top**	0,3-0,7 kg/ha	Disperdere e incorporare all'inizio dell'inverno.
Concimazione con effetto a lungo termine	●	●		●	●	●	**Fertilinz** (Compresse di concime)	1-4 compresse/piante	Per nuovi trapianti o come starter in primavera.
Concime fogliare	●	●		●	●	●	**Concime liquido LG**	0,2-0,5 %	Come additivo ai trattamenti fungicidi e insetticidi.
Concime speciale per carenze di micro-elementi	●	●		●	●	●	**Fetrilon-Combi** [1]	1-1,5 kg/ha	Non utilizzare nelle colture protette.
Preparazione con batteri	●	●	●	●	●	●	**Azofix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha	Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Preparazione con batteri	●	●	●	●	●	●	**Fosfix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha	Aumenta il fosforo disponibile per le piante.
Concime liquido a base di estratti d'alghe	●	●		●	●	●	**Polygrün Blüte** TEAM BF	2-3 l/ha	Miglioramento della fioritura e dell'allegagione.
Rafforzamento delle piante	●	●		●	●	●	**Dexa Pro** TEAM BF	0,7-1 l/100 l	Estratto di piante.
Rafforzamento delle piante	●	●		●	●	●	**Fence N** BIO TEAM BF	3-5 l/ha	Concime organico azotato con estratti vegetali.
Rafforzamento delle piante	●	●		●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	0,5-1 l/ha	Come additivo ai trattamenti fungicidi o insetticidi.
Rafforzamento delle piante	●	●		●	●	●	**Vital** BIO TEAM BF **+ Penergetic** BIO TEAM BF	1 l/ha o 3-5 ml/l d'acqua 250 g/ha	Aumenta l'efficacia dei concimi. Aumenta il tenore in materia organica del terreno.
Incremento della partenza delle piante	●	●	●	●	●	●	**Kickstart** TEAM BF	250 ml/400 l d'aqua	Spruzzare 0,15 l/ha.
Aumento dell'attività microbiologica del terreno	●	●	●	●	●	●	**Terrasan** BIO TEAM BF	1,5-2 l/ha	
	●	●	●	●	●	●	**LiqHumus 18** BIO TEAM BF	35-45 l/ha	Queste raccomandazioni possono variare in funzione della proprietà del terreno e delle condizioni di crescita. Aumenta il tenore in materia organica del terreno.
Aumenta il potere tampone del terreno. Rafforza la crescita delle piante. Migliora l'assorbimento dei nutrimenti da parte dell'apparato radicale.	●	●	●	●	●	●	**Perlhumus** BIO TEAM BF Tappeto erboso annuale Semina del tappeto erboso Giardino Piante ornamentali, vivace e arbusti	 10 kg/100 m² 20-30 kg/100 m² 5-10 kg/100 m² 10-15 kg/100 m²	
Concime azotato con zolfo	●	●		●	●	●	**Agro N fluid** TEAM BF	4-6 l/ha	Può essere utilizzato come concime fogliare, irrigazione goccia a goccia o per sistema di irrigazione.
Biostimolare organico	●	●		●	●	●	**Aminosan** BIO TEAM BF	BIO 5-7 l/ha TEAM BF	
Concime con solfato di magnesio	●	●		●	●	●	**Olimag** TEAM BF	2-4 l/ha	Rafforza le piante in caso di malattie e d'attacco di insetti.
Concime con zinco, concime starter	●	●		●	●	●	**Level 2** TEAM BF	0,8-1,2 l/ha	In condizioni di stress climatico. Viene assorbito dalle foglie e dalle radici.
Promozione della crescita	●	●		●	●	●	**Pidel** BIO TEAM BF	0,1-1 %	Spruzzare.
Attività del suolo	●	●		●	●	●	**Harvel** BIO TEAM BF	0,1-1 %	Annaffiare.

Piante ornamentali / Giardino

Leu+Gygax SA

Fungicidi

Spettro d'azione	Colture: Alberi e arbusti (fuori foresta)	Floricoltura e piante verdi	Bosso	Rose	Tappeto erboso e campi da sport	Zucca ornamentale	Prodotti		Osservazioni
Malattie da fungo delle foglie	●	●	●	●		●	**Bogard**	0,05 %	Se necessario ripetere il trattamento dopo 10-14 giorno. **(SPe)**
Moniliosi dei fiori e dei rami	●		●	●					
Oidio	●	●	●	●		●			
Ruggine			●	●	●	●			
Malattie delle macchie nere				●					
Peronospora su piante ornamentali		●					**Booster**	0,5 %	Massimo 6 trattamenti per parcella e anno.
Malattie causate da funghi patogeni presenti nel suolo	●		●	●			**Booster**	5 l/ha	Irrigare, massimo 6 trattamenti per parcelle e anno. 1° trattamento alla piantagione.
Oidio	●	●	●	●	●	●	**Carbyc** BIO TEAM BF	3-5 kg/ha	Materia di base, trattare a distanza di 10 giorni.
Oidio	●	●	●	●		●	**Celos** BIO	0,1-0,2 %	
Corineo	●								Unicamente lauro ceraso.
Malattia da fungo sulle foglie	●	●	●	●		●	**Cuproxat liquido** BIO	0,2-1 %	Osservare la compatibilità colturale.
Peronospora	●	●	●	●		●	**Cuproxat liquido** BIO	0,2-0,6 %	
Bruciatura delle gemme	●								Unicamente rododendro.
Bruciatura delle gemme	●						**Cuproxat liquido** BIO	2,1 %	Unicamente abete blu.
Batteriosi		●					**Cuproxat liquido** BIO	0,2 %	Unicamente begonia e gerani.
Cancro della conteccia				●			**Cuproxat liquido** BIO	1,3 %	Trattamento in autunno e in inverno.
				●				0,2 %	
Malattia da fungo sulle foglie		●					**Diagonal**	0,1 %	Unicamente cardo blu.
Oidio, ruggine, botrite	●	●					**Diagonal**	0,1 %	Solo su crisantemi e gigli, garofani e rose.
Malattia da fungo sulle foglie, Gaeumannomyces graminis var. avenae, Ophiosphaerella herpotricha, Pythium spp., anthracnose del tappeto erboso, rizottonie delle graminacee, Filo rosso del tappeto erboso, muffa delle nevi.					●		**Diagonal**	1 l/ha	Massimo 3 trattamenti per parcella e anno.
Malattia da fungo sulle foglie, Deperimento,Marciume grigio,Oidio, Peronospora, Peronospora della patata	●	●	●	●	●	●	**Ortiga** BIO TEAM BF	1 %	Materia di base, trattamento ogni 14 giorni.
Funghi e batteri patogeni, Elicitore, rafforzare la resistenza delle piante	●	●	●	●	●	●	**Sambesi** BIO TEAM BF	1-2 %	Materia di base, trattamento ogni 14 giorni. Non mescolare con altri antiparassiteri.

Piante ornamentali / Giardino

Leu+Gygax SA

Fungicidi

Spettro d'azione	Alberi e arbusti (fuori foresta)	Floricoltura e piante verdi	Bosso	Rose	Tappeto erboso e campi da sport	Zucca ornamentale	Prodotti		Osservazioni
Maculature fogliari	●	●	●	●		●	**Flint**	0,05 %	Massimo 3 trattamenti per parcella e anno.
Oidio	●	●	●	●		●			
Peronospora	●	●	●	●		●			
Ruggine	●	●	●	●		●			
Ticchiolatura				●					
Botrite	●	●	●	●		●			
Oidio					●		**Flint**	0,8 kg/ha	Massimo 3 trattamenti per parcella e anno.
Elmintosporiosi					●				
Anthracnosi del tappeto erboso					●				
Rincosporiosi					●				
Ruggine					●				
Filo rosso					●				
Macchie d'estate					●				
Dollar spot delle graminacee					●				
Gommosi						●	**Flint**	0,5 kg/ha	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Oidio						●			
Maculature fogliari	●	●	●	●		●	**Flowbrix** BIO	0,2-1 %	
Peronospora	●	●	●	●		●	**Flowbrix** BIO	0,2-0,6 %	Unicamente lauro ceraso e rododendro.
Vaiolatura della frutta a nocciolo	●	●	●	●		●			
Disseccamento dei bottoni fiorali	●	●	●	●		●			
Disseccamento dei bottoni fiorali	●						**Flowbrix** BIO	2 %	Unicamente abete blu.
Disseccamento dei bottoni fiorali				●			**Flowbrix** BIO	0,2 %	
Oidio	●	●	●	●		●	**Nimrod**	0,1 %	
Bolla dell'azalea		●					**Legan WG**	0,05 %	Unicamente azalee. **(SPe)**
Maculature fogliari	●	●	●	●		●			**(SPe)**
Peronospora	●	●	●	●		●			**(SPe)**
Ruggine	●	●	●	●		●			**(SPe)**
Ticchiolatura				●					**(SPe)**
Malattie causate da funghi patogeni presenti nel suolo		●				●	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %	In serra. Applicare stadio 13-65 (BBCH).
Botrite		●				●			In serra. Dopo il trapianto.
Malattie causate da funghi patogeni presenti nel suolo		●				●	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 kg/m^3	In serra. Mescolare con il substrato prima di seminare o trapiantare.
Oidio	●	●	●	●	●	●	**Quiz** BIO TEAM BF	0,1-0,3 %	
Peronospora	●	●	●	●	●	●			
Botrite	●	●	●	●		●	**Switch**	0,1-0,12 %	Massimo 2 trattamenti per parcella e per anno. **(SPe)**
Cylindrocladium buxicola			●				**Switch**	0,1 %	Massimo 4 trattamenti. Applicare da metà aprile a ottobre. **(SPe)**
Muffa delle neve						●	**Switch**	1,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti. per parcella e per anno.

Piante ornamentali / Giardino

Leu+Gygax SA

Insetticidi

Spettro d'azione	Colture						Prodotti	Osservazioni
							Alberi e arbusti (fuori foresta)	
							Floricultura e piante verdi	
							Maggese / Terreno a riposo	
							Bosso	
							Rose	
							Tappeto erboso e da sport	
Lumache	●	●		●	●	●	**Amilon 5** 5-7 kg/ha	Tossico per animali domestici.
Piralide del bosso				●			**Buxatrap + Pherodis** BIO TEAM BF	Esca con feromone sessuale.
Acaro rosso Acari dei giardini	● ●	● ●		● ●	● ●		**Credo** 0,02 %	Fino a 2 settimane dopo il germogliamento o in giugno. **(SPe)** Applicazione in pieno campo: da maggio **(SPe)**
Mosca minatrice	●	●		●	●		**Audienz** 0,04-0,08 %	**(SPe)**
Acari dei giardini	●	●		●	●		**Floramite 240 SC** 0,04 %	Solamente in serra. Effetto contro tutti gli stadi.
Ragnetti	●	●		●	●		**Acramite 480 SC** 0,02 % 0,2 l/ha	Solamente in serra. Effetto contro tutti gli stadi.
Afidi, tripidi	●	●		●	●		**Piretro verde** BIO 0,3 %	Massimo 4 trattamenti per coltura/anno. Con un intervallo di almeno 7 giorni.
Larve defogliatrici, tripidi, piralide del bosso	●	●		●	●		**Audienz** BIO 0,03-0,04 %	**(SPe)**
Crisiomelidio Afidi Cimice Nottue terricole Cecidomia Tripidi Mosca del terreno Mosca bianca		● ● ● ● ● ● ● ●					**Techno 10 CS** 0,01 % 0,1 l/ha	Non può entrare in contatto con piante in fiore e con mielata trattare solo in serata, fuori dal volo delle api **(SPe).** Solo con autorizzazione speziale.
Piralide del bosso				●			**Techno 10 CS** 0,015 %	**(SPe)** Solo con autorizzazione speziale.
Tipulidi (larve)						●	**Techno 10 CS** 0,03 % 0,3 l/ha	Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7 giorni **(SPe).** Solo con autorizzazione speziale.
Afidi	●	●		●	●		**Pirimor** 0,05 %	Massimo 3 trattamenti.
Piralide del bosso				●			**Rapid** 0,2 %	**(SPe)**
Insetti succhiatori	●	●		●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF 0,1-0,15 %	La potiglia polverizzata, deve asciugare rapidamente.
Cocciniglia ostriforme Falena sfogliatrice Cocciniglia nera Ragno rosso	● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●		**Spray Oil 7-E** BIO TEAM BF 3,5 %	Applicazione: in inverno
Cocciniglie nere Afidi Falena sfogliatrice Briobia (ragnetti diversi)	● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●		**Winsum** BIO TEAM BF 2 %	Applicazione: stadio 13-90 (BBCH). Solo nei giardini.
Nottue	●	●		●	●		**XenTari** BIO TEAM BF 0,1 %	Non utilizzare con tempo freddo.
Afidi Briobia (ragnetti diversi) Mosca blanca	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●		**Vista** BIO TEAM BF 2 %	
Afidi	●	●		●	●	●	**Ortiga** BIO TEAM BF 0,7 %	

Leu+Gygax SA

Protezione delle acque (SPe) / protezione delle piante non bersaglio

Come regola generale, l'applicazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti deve avvenire a una distanza di 3 m dalle acque superficiali e dalle aree boschive (margini dei boschi, siepi, ecc.).
Nella produzione di PIR, in genere si deve rispettare una distanza di 6 m per i pesticidi e di 4 m per i fertilizzanti dalle acque superficiali.
Le distanze da rispettare sono elencate nella tabella seguente.

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Absolut	W 6761-1	Cereali	6			1		
Aceto Fix	Materia prima	tutti	6			1		
Acramite 480 SC	W 6957	Fragole	6			1		
		Melanzane	6			1		
		Cucurbitacee (Cucurbitaceae)	6			1		
		Peperone	6			1		
		Pomodori	6			1		
		Piante ornamentali	6			1		
Action F arbo	Concime	tutti	3					
Action F viti	Concime	tutti	3					
Agil	W 6969	tutti	6			1		
Agro N fluid	Concime	tutti	3					
Amilon 5	W 7083	tutti	6			1		
AminoPower Plus liquid	Concime	tutti	3					
Aminosan	Concime	tutti	3					
Asulam LG	W 6997-4	tutti	6			1		
Atlantis Star	W 7314-1	Cereali	6		6	1		
Audienz	W 6020	Frutticoltura	20			1		
		Sambuco	20			1		
		altri	6			1		
Avero	W 7268-1	tutti	6			1	S2 / Sh	
Aviso	W 2935-2	tutti	6			1		
Azofix plus	Engrais	tutti	3					
Bacchus	W 4878	Vite	6			1		Massimo 4 kg di rame metallico / ha / anno. Massimo 6 kg di rame metallico / ha / anno durante 5 anni. Massimo 20 kg di rame metallico / ha.

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Basfoliar Combi Stipp	Concime	tutti	3					
Beta Star	W 6932-1	tutti	6			1		
Betam LG	W 6938-2	tutti	6			1		
Bion	W 5370	tutti	6			1		6 m per lo spazio abitativo e strutture pubbliche
Blackex	W 4162	tutti	6			1		
Bogard	W 5056-1	Rose	20			1		
		Fioricoltura e piante verdi	20			1		
		Rose	20			1		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	50			2		
		Patate	6			1		
		Pomodori	6			1		
		Asparagi	6			2		
		Sedano	6			2		
		Erba cipollina	6			2		
		Rabarbero	6			2		
		Barbabietola	6			2		
		Prezzemolo	6			2		
		Pastinaca	6			2		
		Valerianella	6			2		
		Porro	6			2		
		Zucche (buccia commestibile)	6			1		
		Erbette da cucina	6			2		
		Cavoli	6			2		
		Finocchio dolce	6			2		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Bogard	W 5056-1	Aglio	6			2		
		Scalogni	6			2		
		Cipolle	6			2		
		Carote				2		
		Cetrioli	6			1		
		Indivia e cicoria da foglia	6			2		
		Lattuga capuccio	6			2		
		Cicoria belga [produzione dei radici]	6			2		
		Vite	6			1		
		Frutticoltura	20			1		
		Bacche	20			1		escluse le fragole
		Fragole	6			2		
Bolero	W 6099-2	tutte	6			1		
Booster	W 6841-1	tutte	6			1		
Brevis	W 6996	tutte	6					
Campa	W 2743-1	tutte	6			1		
Cantus	W 6150	tutte	6			1		
Captan 80 WDG	W 6635	tutte	20			1		
Caravel	W 7168-2	tutte	6			1		
Carbyc	Sostanza base	tutte	6			1		
Celos	W 6873	tutte	6			1		
Codacide	W 7002	tutte	6			1		
Comfort	W 6392-1	Cereali	20			1		basso dosaggio
		Cereali	20			2		alto dosaggio
Condoral SC	W 6630-1	Patate	6			1		Pre-emergenza
Concime liquido LG	Concime	tutte	3					
Coragen	W 7291	Patate	6			1		
Corex	W 7030-1	tutte	6			1		Chlorantraniliprole massimo 2 volte / coltura/ 2 anni / per parcella
Credo	W 6982-1	Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	6	6		1		
		Fioricoltura e piante verdi	6	6		1		
		Rose	6	6		1		
		Fragole	6	6		1		
		Luppolo	50	6		1		
		Vite	20	6		1		
		Frutticoltura	50	6		1		
		Mora	20	6		1		
		Mirtilo	20	6		1		
		Lampone	20	6		1		
		Specie di ribes	20	6		1		
		altri	6			1		
Cuproxat liquido	W 2710	tutte	6			1		massimo 4 kg di rame metallico/per ha/per anno. massimo 6 kg di rame metallico/per ha/per anno durante 5 anni. massimo 20 kg di rame metallico/per ha.
Cymbal WG	W 7484-2	tutte	6			1		
Cyrano	W 6219	Vite	6	6		1		
Dexa Pro	Concime	tutte	3					
Dialen	W 4571-2	tutte	6			1		
Duplosan KV Combi	W 5164	tutte	6			1		20 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Diagonal	W 7496	Frutticoltura	20			1	S2/Sh	
		Luppolo	20			1	S2/Sh	
		Rose	6			2	S2/Sh	
		Floricoltura e piante verdi	6			2	S2/Sh	
		altri	6			1		
Effican SG	W 5320-2	tutte	6		3	1	S2 / Sh	Aree carsiche massimo 0,96 kg Bentazone/ha/ parcella/2 anni.
Equip	W 6222	tutte	6	6		2		alto dosaggio
			6	6		1		basso dosaggio
Ethephon LG	W 3064-2	tutte	6			1		
Fazor	W 6797	tutte	6			1		3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Fence N	Concime	tutte	3					
Ferplus Top	Concime	tutte	3					
Fertilinz	Concime	tutte	3					
Fertilon Combi [1]	Concime	tutte	3					
Final K	Concime	tutte	3					
Finy	W 6921-1	tutte	6		50	1		alto dosaggio
			6		20	1		basso dosaggio
Flint	W 5994	tutte	6			1		
Floramite 240 SC	W 6626	tutte	6			1		Massimo 4 kg di rame metallico / ha / anno. Massimo 6 kg di rame metallico / ha / anno durante 5 anni. Massimo 20 kg di rame metallico / ha.

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Flowbrix	W 6383	tutte	6			1		
Flurox 200	W 7217	Cereali	6			1		
Folifert Supermix	Concime	tutte	3					
Folpet 80 WDG	W 6680	Frutticoltura	20	6		1		
		Viticoltura	6	6		1		
		Campocoltura	50	6		1		
Fosfix Plus	Concime	tutte	3					
Frontier X2	W 6075-4	tutte	6			1		
Galipan	W 7510	tutte	6			1		
Galipan 3	W 6023-2		6			1	S2 / Sh	massimo 0.75 kg Dimethachlor/ha/ per parcella / 3 anni.
Glifonex TF	W 7129	tutte	6			1		
Goltix 700 SC	W 6875	tutte	6			1		
Goltix WG	W 6199-2	tutte	6			1		
Granat	W 6703-1	tutte	6			1		
Harvel	Concime	tutte	3					
HBR	Concime	tutte	3					
Hi-Grow	Concime	tutte	3					
Huile minérale	W 1896	tutte	6			1		
Invelop F	Sostanza base	tutte	6			1		
Kickstart	Concime	tutte	3					
Kunshi	W 7036	Patate	6		3	1		
Bouillie bordolaise LG (Poltiglia bordolese)	W 2116	tutte	6			1		massimo 4 kg di rame metallico/per ha/per anno. massimo 6 kg di rame metallico/per ha/per anno durante 5 anni. massimo 20 kg di rame metallico/per ha.
Kusabi	W 7513	tutte	6			1		
Laguna	W 7370	Piselli	20			3		bass dosaggio
		Piselli	20			2		alto dosaggio
		Carote	20			3		Post-emergenza
		Carote	20			4		Pre-emergenza
		cecci	20			4		
		Aglio	20			4		
		Scalogni [trapianto]	20			4		
		Cipolle [trapianto]	20			4		
		Finocchio dolce [trapianto]	20			3		
		Finocchio dolce [seminato]	20			3		
		Sedano rapa	20			3		
		Sedano da coste	20			3		
		Lenti	20			4		
		Favette	20			4		
		Pisello proteico	20			4		
		Patate	20			4		
		Girasole	20			4		
		Pisello proteico	20			2		
Landmaster Supreme 480 TF	D 6622	tutte	6			1		
Legacy	W 6844	tutte	6			1		
Legan WG	W 7127	Frutta a granelli	50	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Ciliegio	50	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Prugno	50	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Vite	20	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Azalee	20	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	50	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Fioricultura e piante verdi	20	6		1		massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
		Rose	20	6				massimo 3400 g Dithianon per ha / per anno
Lentagran	W 7231	tutte	3		3			3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Lentagran 600 EC	W 5262	Mais	3		3			3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Level 2	Concime	tutte	3					
LiqHumus 18	Concime	tutte	3					
Mandate	W 6723	tutte	6			1		
MaxMan 400	Concime	tutte	3					
MCPB LG	W 2070	tutte	6			1		
Micro Bor	Concime	tutte	3					
Microthiol LG	W 7479-1	Vite	6		20	1		6 m da aree residenziali e strutture pubbliche
		altri	6			1		
Mildicut	W 6379	tutte	6			1		
Miranda	W 6226-1	Cereali	6			2		Pre-emergenza
		Cereali	6			1		Post-emergenza
Monitor	W 5463	tutte	6		3	1		Massimo 1 trattamento / 2 anni / parcella

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Moddus	W-3070-1	tutte	6			1		
Nimrod	W 6845	Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	20			1		
		altri	6			1		
Noctudor	Concime	tutte	3					
Novodor 3 FC	W 5925	tutte	6			1		
Oblix MT	W 7180-2	tutte	6			1		
Oikos	W 7490-2	Mele	20			1		
		altre	6			1		
Olimag	Concime	tutte	3					
Ortiga	Sostanza base	tutte	6			1		
Oxidia	W 7369	tutte	6			1		
Pendi	W 7242	tutte	6			1		
Penergetic	Concime	tutte	3					
Perlhumus	Concime	tutte	3					
Phytonic	W 6875	tutte	6			1		
Pidel	Concime	tutte	3					
Piretro Verde	W 7462	Alchechengio	20			2		
		Carciofi	20			2		
		Fagioli	20			2		
		Piselli	20			2		
		Cardone	20			2		
		Carote	20			2		
		Finocchio dolce	20			2		
		Sedano rapa	20			2		
		Zucche (buccia commestibile)	20			2		
		Melone	20			2		
		Zucche da olio	20			2		
		Pastinaca	20			2		
		Pepino	20			2		
		Fave	20			2		
		Rabarbero	20			2		
		Scorzonera	20			2		
		Asparagi	20			2		
		Zucche (buccia non commestibile)	20			2		
		Tuberina	20			2		
		Sedano da coste	20			2		
		Topinambur	20			2		
		Angurie	20			2		
		Prezzemolle tuberoso	20			2		
		Mais dolce	20			2		
		Insalata asiatiche (Brassicaceae)	6			1		
		Crescione acquatico	6			1		
		Cima di Rapa	6			1		
		Crescione	6			1		
		Ruccola	6			1		
		Cavoli/rape da taglio	6			1		
		Melanzane	50			3		
		Cicoria belga	6			2		
		Erbette da cucina	6			2		
		Bietola	6			2		
		Valerianella	6			2		
		Portulaca	6			2		
		Insalata (Asteraceae)	6			2		
		Spinaci	6			3		
		Centrioli	50			3		
		Peperone	50			3		
		Pomodori	50			3		
		Aglio	20			3		
		Porro	20			3		
		Barbabietole	20			3		
		Scalogno	20			3		
		Cipolle	20			3		
		Cavoli	20			2		
		Rafano	20			2		
		Ravanelli	20			2		
		Ramolaccio	20			2		
		Rapa di Brassica rapa e B. napus	20			2		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	100			3		
		Fioricultura e piante verdi	50			3		
		Rose	50			3		
Pirimor	W 5105	Bacche	20	6		1		excluse le fragole
		Fragole	6	6		1		
		Frutta a granelli	50	6	20	1		
		Frutta a nocciolo	50	6	20	1		
		Baby-Leaf (Brassicaceae)	6	6		1		
		Melanzane	20	6		1		
		Cetrioli	20	6		1		
		Peperone	20	6		1		
		Pomodori	20	6		1		
		Alchechengio	6	6		1		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Pirimor	W 5105	Carciofi	6	6		1		
		Insalata asiatica	6	6		1		
		Fagioli	6	6		1		
		Cicoria belga	6	6		1		
		Cima di Rapa	6	6		1		
		Cipolle dolci	6	6		1		
		Carote	6	6		1		
		Aglio	6	6		1		
		Sedano rapa	6	6		1		
		Cavoli	6	6		1		
		Crescione	6	6		1		
		Erbette da cucina	6	6		1		
		Zucche (buccia commestibile)	6	6		1		
		Rafano	6	6		1		
		Melone	6	6		1		
		Valerianella	6	6		1		
		Zucche da olio	6	6		1		
		Anguria	6	6		1		
		Pepino	6	6		1		
		Ravanelli	6	6		1		
		Barbabietole	6	6		1		
		Ramulaccio	6	6		1		
		Ruccolae	6	6		1		
		Scalognio	6	6		1		
		Scorzonera	6	6		1		
		Rapa di Brassico e rapa B. napus	6	6		1		
		Zucche (buccia non commestibile)	6	6		1		
		Cipolle da tavola	6	6		1		
		Crosnes du japon	6	6		1		
		Tuberina	6	6		1		
		Topinambur	6	6		1		
		Pastinaca	6	6		1		
		Prezzemolo tuberoso	6	6		1		
		Mais dolce	6	6		1		
		Baby Leaf	6	6		1		
		Piselli	6	6		1		
		Fave	6	6		1		
		Bietola	6	6		1		
		Spinacio	6	6		1		
		Asparagi	6	6		1		
		Rabarbero	6	6		1		
		Insalata Asteraceae	6			1		
		Fava	6			1		
		Pisello proteico	6	6		1		
		Cereali	6			1		
		Patate	6			1		
		Colza	6			1		
		Barbabietole	6			1		
		Piante ornamentale	6			1		
Polygrün	Concime	tutte	3					
Polygrün Blüte	Concime	tutte	3					
Prestop	W 6872	tutte	6			1		
Prosper	W 5934	Vite	50			2		
Prox	W 7404-2	Vite	50			4		
		Vite	60			4		Applicazione dell'aria
Proxanil	W 7421-1	Patate	6			1		
Quiz	Sostanza base	tutte	6					
Ranman Top	W 6889	Melanzane	6	6		1		
		Pomodori	6	6		1		
		Cetrioli al aperto	6	6		1		
		Zucche al aperto	6	6		1		
		altre	6			1		
Rapid	W 6748-2	Bosso	50	6	50	1		
		Pisello proteico	6	6	20	1		
		Pomodori	6	6	20	1		
		Zucche	6	6	20	1		
		Cavoli	6	6	20	1		
		Frutta con guscio	50	6	100	1		Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima).
		Frutta a nocciolo	50	6	100	1		Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima).
		Frutta a granelli	50	6	100	1		Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima).
Rasenrein	W 7416-2	tutte	6			1		Thifensulfuronmethyl massimo 1 x / 3 anni / parcella

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Refine Extra SX	W 7303	tutte	20		6	2		
Revus	W 6509	Luppolo	20			1		
		altre	6			1		
Rimuron	W 7565	tutte	6			1		
Sambesi	Sostanza base	tutte	6			1		
Sheriff	W 7031-2	tutte	6			1		
Siltac plus	Div.	tutte	6			1		
Silwet L-77	W 6405	tutte	6			1		
Simplex	W 7433-1	tutte	6			1	S2 / Sh	
Soleto	W 7256-1	Patate	6		20	1		
		Valerianella	6			1		
		Soja	6		6	1		
		Girasole	6		6	1		
Spark	W 7198	tutte	20	6		1	S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	tutte	6			1		
Sprinter	W 7427-1	tutte	6		6	1		
S-System	Concime	tutte	3					
Stabilan Plus	W 3072	tutte	6			1		
Sunrise	W 7340-2	Frutta a granelli	20		20	3		
		Frutta a nocciolo	20		20	3		
		Vite	20		20	3		
		Patate	6		6	2		
		Patate disseccamento	20		20	3		
Surfy	W 7485	tutte	6			1		
Switch	W 5218	Alberi e arbusti	20			1		
		Cetrioli	20			1		
		Pomodori	20			1		
		Melanzane	20			1		
		Vite	20			1		
		Frutta a nocciolo	20			1		
		Bacche	20			1		escluse le fragole
		Sambuco	20			1		
		Cipolle	6	6		1		
		Insalata (Asteraceae)	6	6		1		
		Ruccola	6	6		1		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Switch	W 5218	Valerianella	6	6		1		
		altre	6			1		
Techno 10 CS	W 7226	Frutta a granelli	100			1		
		Lamponi	50			1		
		Luppolo	50			1		
		Bosso	50			1		
		Tappeti erbosi	50			1		
		altre	20			1		
Temsa	W 7041	Mais	6			1		
Terrasan	Concime	tutte	3					
Tip Calcium	Concime	tutte	3					
Valis F	W 7196	Vite	20			1		
		Vite	60			1		Applicazione dell'aria
Vista	W 4682-1	tutte	6			1		
Vital	Div.	tutte	6			1		
Winsum	W 7360	tutte	6			1		
XenTari	W 7360	tutte	6			1		
Zeppelin	W 7320-3	tutte	6			1		
Zwei, 4-D Dicopur	W 2594	Frutticoltura	20			1		massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni.
		Cereali	20			1		massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni.
		Mais	20			1		massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni.
		altre	6			1		massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni.

Condizioni di vendita e consegna

Prezzi IVA:
Questa lista dei prezzi rimpiazza tutte le versioni precedenti. Sono sommessi a condizioni: i cambiamenti dei prezzi come pure le condizioni di consegna, delle irregolarità e errori di stampa. Diversi prodotti, sono sommessi all'ordinanza sulla tassa di incitazione sui composti volatili organici (OCOV) e sono tassati 3.00 CHF/kg COV. L'IVA e le tasse COV saranno applicate alla maniera seguente:
– Prezzo di acquisto: l'IVA e le tasse COV non sono incluse e saranno notificate separatamente sulla fattura.
– Prezzo di vendita: l'IVA del 2.6 % sui prodotti fitosanitari e i concimi, rispettivamente del 8.1 % per gli altri prodotti, come pure la tassa COV sono inclusi.

Consegna:
Le consegne franco domicilio, tramite autotrasportatore o treno sono fissate a CHF 2'000.00 (gennaio a maggio) e a CHF 1'000.00 (giugno a dicembre). Per le consegne al disotto dei prezzi citati, un supplemento di CHF 80.00 per il trasporto sarà fatturato. Per la consegna tramite posta, un supplemento di CHF 5.00 è calcolato per la francatura del pacco. Per le consegne inferiori a CHF 100.00 e per i pacchi con prodotti pericolosi, un contributo di CHF 13.00 sarà fatturato all' affrancatura.

Ordinanza sui prodotti tossici:
Alla ricezione della merce, il destinatario si impegna a osservare le prescrizioni federali sul commercio dei prodotti tossici.

Garanzia di qualità:
I nostri prodotti fitosanitari, sono omologati tramite l'ufficio federale dell'agricoltura e l'ufficio federale della sanità pubblica.
Noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti, venduti unicamente negli imballaggi d'origine intatti.
Solo le indicazioni e le prescrizioni di concentrazioni figuranti sull'imballaggio sono determinanti come sistema d'impiego.
Noi decliniamo tutte le responsabilità per i danni che potrebbero intervenire a seguito di errori commessi nell'immagazzinare e nell'impiego dei nostri prodotti o a circostanze indipendenti dalla nostra volontà.

Immagazzinamento:
Conservare i prodotti per polverizzazione in un posto secco, fuori gelo e sottochiave.

Danni dovuti al trasporto:
Essi devono essere immediatamente annunciati alle ferrovie, alla posta o all'autista del trasporto, al momento della ricezione, non fatto, alcun risarcimento sarà effettuato.

GHS:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Esplosivo	Estremamente infiammabile	Comburente	Gas sotto pressione	Corrosivo	Attenzione pericoloso	Pericoloso per la salute	Molto tossico	Pericoloso per l'ambiente acquatico

Avvelenamento:
In caso di avvelenamento con prodotti fitosanitari, consultare immediatamente un medico.
Per informazioni su cosa fare, chiamate il,
Centro svizzero di informazione tossicologica di Zurigo. Tel. 145 o 044 251 66 66 (24 h)

Tabella di dosaggio

Esempio Concentrazione desiderata 0,2 %
300 litri = 600 g di prodotto

Concentrazione in %

Poltiglia	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	
10 litri	5	7.5	10	12.5	15	20	30	40	50	60	70	75	80	100	In grammi o in cm^3
100 litri	50	75	100	125	150	200	300	400	500	600	700	750	800	1	Quantità espresse in kg o litri
200 litri	100	150	200	250	300	400	600	800	1	1,2	1,4	1,5	1,6	2	
300 litri	150	225	300	375	450	600	900	1,2	1,5	1,8	2,1	2,25	2,4	3	
400 litri	200	300	400	500	600	800	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	4	
500 litri	250	375	500	625	750	1	1,5	2	2,5	3	3,5	3,75	4	5	
600 litri	300	450	600	750	900	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5	4,8	6	
700 litri	350	525	700	875	1.05	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,25	5,6	7	
800 litri	400	600	800	1	1,2	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6	6,4	8	
900 litri	450	675	900	1,125	1,35	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	6,75	7,2	9	
1000 litri	500	750	1	1,25	1,5	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	
1200 litri	600	900	1,2	1,5	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	12	
1500 litri	750	1,125	1,5	1,875	2,25	3	4,5	6	7,5	9	10,5	11,25	12	15	
2000 litri	1	1,5	2	2,5	3	4	6	8	10	12	14	15	16	20	

Kusabi®

Un nuovo principio attivo contro l'oidio

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA