

| Konserven- und Eiweisserbsen                                                              | Vor der Saat                                                                                                                   | Vorauflauf               | Keimblatt -<br>2-Blatt<br>10-12                                                                                                                                                                                                                        | 3-4 Blatt<br>13-14     | Bildung<br>Blütenknospen<br>51-59                                                                               | Hülsenbildung<br>71-79 | Hinweise                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unkrautbekämpfung</b>                                                                  | <b>Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
| Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich)                               |                                                                                                                                | <b>Laguna</b><br>3 l/ha  | <b>Effican SG</b> 0,8 - 1,1 kg/ha<br>+ <b>Pendi</b> 0,9 l/ha                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                 |                        | Splitbehandlung möglich. (GWS)                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                |                          | <b>Laguna</b> 1 l/ha                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                 |                        | Laguna nur in Eiweisserbsen einsetzen. (GWS)                                                                   |                                                                                     |
| Einjährige Unkräuter und Ungräser                                                         |                                                                                                                                | <b>Caravel</b> 0,25 l/ha |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        | Nur in Erbsen mit Hülsen.                                                                                      |                                                                                     |
| Vorauflauf und Nachauflauf<br>Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten) |                                                                                                                                | <b>Bolero</b> 1 l/ha     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        | Im Nachauflauf mischbar mit Effican SG. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen. (GWS)                    |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                |                          | <b>Bolero</b> 1 l/ha + <b>Effican SG</b> 1,1 kg/ha                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
| Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln                                                    |                                                                                                                                |                          | <b>MCPB LG</b> 4 l/ha                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                 |                        | Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen. Mischbar mit Effican SG.                                           |                                                                                     |
| Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke                                        |                                                                                                                                |                          | <b>Agil</b> 1 - 2,5 l/ha                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                 |                        | Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospe <b>Quecke</b> 1,75-2,5 l/ha.              |                                                                                     |
| <b>Blattdüngung</b>                                                                       |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
| Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Graufäule                                        |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Diagonal</b> 1 l/ha |                                                                                                                 |                        | Eiweisserbse: max. 2 Behandlungen im Abstand von 8-12 Tagen. Wartefrist: 2 Wochen.                             |                                                                                     |
| Brennfleckenkrankheit, Graufäule, Sclerotinia-Fäule                                       |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Switch</b> 1 kg/ha  |                                                                                                                 |                        | Erbse: max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 10 Tagen. Wartefrist: 2 Wochen.                           |                                                                                     |
| <b>Schädlinge</b>                                                                         |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
| Schnecken                                                                                 |                                                                                                                                |                          | <b>Amilon 5</b> 5-7 kg/ha                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                 |                        | Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. |                                                                                     |
| Eulenraupen, Erbsenwickler                                                                |                                                                                                                                |                          | <b>Rapid</b> 1,5 kg/ha                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                 |                        | Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)                                                                         |                                                                                     |
| Erbsenwickler, Erdräupen                                                                  |                                                                                                                                |                          | <b>Techno 10 CS</b> 0,075 l/ha                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                 |                        | Nur Eiweisserbsen. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. (GWS)<br>Nur mit Sonderbewilligung.                       |                                                                                     |
| Blattläuse                                                                                |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>Pirimor</b> 0,15 kg/ha                                                                                       |                        | Wartefrist 2 Wochen. Schont Nützlinge. Bei Auftreten ab Beginn der Blüte bis Beginn Hülsenbildung.             |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>Siltac plus</b> 0,15 %  |                        | Wassermenge 500-800 l/ha. Anwendung: Nur bei trockenem Wetter. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.        |                                                                                     |
| Schnecken                                                                                 |                                                                                                                                |                          | <b>Audienz</b> 0,2 l/ha/ha                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                 |                        | Nur in Erbsen mit Hülsen.                                                                                      |                                                                                     |
| Eulenraupen, Erbsenwickler                                                                |                                                                                                                                |                          | <b>Piretro Verde</b> 2,5 l/ha                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                 |                        | In Erbsen, Wartefrist: 3 Tage. (GWS)                                                                           |                                                                                     |
| Erbsenwickler, Erdräupen                                                                  |                                                                                                                                |                          | <b>XenTari</b> 1 kg/ha                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                 |                        | In Erbsen mit Hülsen, Wartefrist: 3 Tage.                                                                      |                                                                                     |
| <b>Starter und Booster</b>                                                                |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
| Für starke Wurzelbildung in Erbsen und Soja                                               |                                                                                                                                |                          | <b>Penergetic p Gemüse</b> 100 g/ha  + <b>Vital</b> 1 l/ha  alle 7 - 10 Tage |                        |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                |                          |  <b>Level 2</b> 0,8 l/ha oder <b>Kickstart</b> 0,15 l/ha                     |                        |                                                                                                                 |                        | Mischbar mit Herbiziden.                                                                                       |                                                                                     |