

Lauch			WF = Wartefrist in Tagen	
Herbizid nach der Pflanzung	Spark	2 kg/ha	28	Maximal 1 Behandlung pro Kultur. (GWS)
	Lentagran	2 kg/ha		Ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser und Unkräuter	Pendi	2-4 l/ha		Lauch gesät. Im Voraufbau.
Ungräser und Unkräuter	Pendi	4-5 l/ha		Lauch gepflanzt. Vor der Pflanzung.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Alternaria spp. Phytophthora spp.	Diagonal	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Alternaria spp. Lauchrost, Papierfleckenkrankheit, Samtfleckenkrankheit	Flint	0,4 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen. Stadium 41-49 (BBCH).
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 3 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Lauchmotte	XenTari 	1 kg/ha	7	
Blattsaugende Insekten	Siltac plus 	0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Lauchmotte	Audienz 	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Minierfliegen, Thripse	Audienz 	0,4 l/ha	7	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle/Jahr/Kultur. (GWS)
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)
Wachstumsförderung	Azofix plus 	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	Fosfix plus 	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors
Randen				
Ausfallgetreide, Einjährige Gräser und Quecken	Agil	1 - 2,5 l/ha	56	
Herbizid nach dem Auflaufen	Beta Star + Goltix 700 SC	1,5 + 1,5 + 2,5 l/ha + 1 l/ha		pro Splitbehandlung.
Einj. Unkräuter	Betam LG	6 l/ha		Anwendung: Nachaufbau.
Einj. Gräser und Unkräuter	Oblix MT	6 l/ha		Splitbehandlung
Herbizid vor dem Auflaufen	Spark	1,5-2 kg/ha		Nach der Saat vor dem Auflaufen. (GWS)
Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheiten	Bogard	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
	Flowbrix 	4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
	oder Cuproxat flüssig 	8-12 l/ha	21	Hochwertiges Kupferpräparat.
Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheiten	Kupfer-Bordo LG 	13-18 kg/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektare und Jahr.
Echter Mehltau	Microthiol LG 	1,5 l/ha	14	Anwendung: Bei Befallsbeginn
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Blattsaugende Insekten	Siltac plus 	0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)
Eulenraupen	XenTari 	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.
Wachstumsförderung	Azofix plus 	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	Fosfix plus 	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors
Pflanzenstärkung	Fence N 	1,5-3 l/ha		Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Bormangel	Micro Bor 	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	MaxMan 400 	1 l/ha		Speziell in Moorböden.

Insbesondere bei Wetterstress.