

Oignons / Echalottes

Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.

	Oignon (condiment)	Oignon potager	Ciboulette	Echalottes			
Contre dicotylédones Contre graminées annuelles et chiendent Contre dicotylédones et graminées annuelles	●	●	●		Pendi	2-3 l/ha	Avant la levée des mauvaises herbes. Diminuer la dose sur sols légers. Profondeur de semis à 3 cm, post-levée à partir du stade 3-feuilles.
	●	●	●	●	Lentagran	2 kg/ha	28 Post-levée à partir du stade 3-feuilles.
	●	●	●	●	Agil	1 - 2,5 l/ha	56 2-2,5 l/ha contre chiendent.
	●	●	●	●	Laguna	3 l/ha	Pré-levée. Seulement sur bulbes plantés. (SPe)
Cladosporiose, rouille, taches pourpres Oïdium Mildiou Botrytis Pourriture blanche des Allium	●	●	●	●	Bogard	0,5 l/ha	14 Max. 3 traitements par année. (SPe)
	●	●	●	●	Carbyc	0,3-1% 2,5-5 kg/ha	1 Traitement à l'intervalle de 10 jours.
	●	●	●	●	Diagonal	1 l/ha	1 Traitement à l'intervalle de 10 jours.
	●	●	●	●	Switch	1 kg/ha	14 Max. 2 traitements par année. (SPe)
	●	●	●	●	Switch	1 kg/ha	1 ^{ère} traitement au stade 2 feuilles 2 ^{ème} traitement 3 semaines plus tard (semis d'automne traiter au printemps). (SPe)
Thrips				●	Audienz	0,2 l/ha	7 Max. 3 traitements par culture/année.
Mouches mineuses, thrips	●	●	●		Audienz	0,4 l/ha	7 Max. 4 traitements par parcelle et année dans cette culture. (PSe)
Pucerons, mouches blanches	●	●	●	●	Piretro verde	2,5 l/ha	3 Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours. (PSe)
Pucerons	●	●	●	●	Pirimor	0,5 kg/ha	7 Pas d'homologation sur ciboulette. (SPe)
Pucerons du feuillage, noctuelles en terricoles, teigne de poireau, mouches mineuses, thrips.	●	●	●	●	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14 Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours. (PSe) seulement avec autorisation spéciale.
Contre les insectes suceurs.	●	●	●	●	Siltac plus	0,15 %	Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours.
Noctuelles				●	XenTari	1 kg/ha	Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire (SPe)
Limaces	●	●	●	●	Amilon 5	7 kg/ha	Epandre sur le sol, Ne pas saupoudrer les parties comestibles des plantes.
Campagnols terrestres, taupes	●	●	●	●	Campa	1-5 cartouches / colonie	Les galeries doivent être bien refermées.
Anti-germinatif	●	●	●	●	Fazor	3,5-4 kg/ha	20-30 % des tiges couchées. Pour les détails voir page 65 information sur Fazor.
	●	●	●	●	Dexa Pro	4 l/ha	Ajouter à la bouillie.
	●	●	●	●	Fetrilon-Combi 1	1 kg/ha	Ajouter à la bouillie.
Vitalité et gestion du stress	●	●	●	●	Polygrün	1 l/ha	2-3 traitements dès le stade BBCH 14.
	●	●	●	●	+ Vital	1 l/ha	
	●	●	●	●	+ Penergetic p cultures maraîchères	0,1 kg/ha	
	●	●	●	●	Azofix plus et Foxfix plus	1 l/ha	Pour augmenter la disponibilité de l'azote et du phosphore.