

Fungicidi

| Spettro | Colture | | | | | Prodotti | Osservazioni |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Alberi e arbusti (fuori foresta) | |
| | | | | | | Floricoltura e piante verdi | |
| | | | | | | Bosso | |
| | | | | | | Rose | |
| | | | | | | Tappeto erboso e campi da sport | |
| | | | | | | Zucca ornamentale | |
| Oidio Elmintosporiosi Anthracnosi del tappeto erboso Rincosporiosi Ruggine Filo rosso Macchie d'estate Dollar spot delle graminacee | | | | | | ● Flint 0,8 kg/ha | Massimo 3 trattamenti per parcella e anno. |
| Gommosi Oidio | | | | | | ● Flint 0,5 kg/ha | |
| Malattia da fungo sulle foglie | ● | ● | ● | ● | | ● Flowbrix  0,2-1 % | Unicamente lauro ceraso e rododendro. |
| Peronospora Corineo Bruciatura delle gemme | ● | ● | ● | ● | | ● Flowbrix  0,2-0,6 % | |
| Cancro | ● | | | | ● | Flowbrix  2 % | Unicamente abete blu. |
| | | | | | | Flowbrix  0,2 % | |
| Oidio | ● | ● | ● | ● | | ● Nimrod 0,1 % | |
| Bolla dell'azalea Malattia da fungo sulle foglie Peronospora Ruggine Malattia delle macchie nere | | ● | | | | ● Legan WG 0,05 % | Unicamente azalee. (SPe) (SPe) (SPe) (SPe) |
| Malattie causate da funghi patogeni del terreno. | | ● | | | | ● Prestop  0,5 % | In serra. Applicare stadio 13-65 (BBCH). |
| Botrite | | ● | | | ● | | In serra. Dopo il trapianto. |
| Malattie causate da funghi patogeni presenti nel suolo | | ● | | | | ● Prestop  0,5 kg/m ³ | In serra. Mescolare con il substrato prima di seminare o trapiantare. |
| Oidio Peronospora | ● | ● | ● | ● | ● | ● Quiz  0,1-0,3 % | |
| Botrite | ● | ● | ● | ● | | ● Switch 0,1-0,12 % | Massimo 2 trattamenti per parcella e per anno. (SPe) |
| Cylindrocladium buxicola | | ● | | | | ● Switch 0,1 % | Massimo 4 trattamenti. Applicare da metà aprile a ottobre. (SPe) |
| Muffa delle neve | | | | | ● | ● Switch 1,5 kg/ha | Massimo 2 trattamenti. per parcella e per anno. |