

# Patate

Semina

Germinazione

Levata

Chiusura degli steli

Chiusura delle file

Bottone fiorale

Fioritura

Sviluppo dei tuberi

Sfogliatura maturità

09

10-19

21-29

31-39

51

60-69

70-79

91-97



## Osservazioni

### Diserbo

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

Nelle patate sotto plastica contro le malerbe e le graminacee annuali.

**Pendi**  
3 l/ha +  
**Condoral SC** 0,5 l/ha

Anche la miscela Pendi + Condoral SC è possibile su patate da semina per la produzione di tuberi. **(SPe)**

Malerbe annuali e graminacee nelle patate di consumazione e di foraggio.

**Oxidia** 4-5 l/ha  
+ **Condoral SC** 0,5 l/ha  
+ **Azofix plus e Fosfix plus** 1-2 l/ha

Pre-emergenza o post-emergenza precoce. **(SPe)**

**Oxidia**  
+ **Laguna**  
+ **Condoral SC**  
2 l/ha  
2 l/ha  
0,5 l/ha

Utilizzare la miscela solo in pre-emergenza. **(SPe)**

**Chenopodio bianco**  
Nelle patate da consumare, foraggiare e per la produzione di sementi.

**Caravel**  
0,2-0,25 l/ha

Utilizzare la miscela solo in pre-emergenza.

**Graminacee e malerbe annuali** nelle patate.

**Condoral SC**  
0,5-0,75 l/ha

**Condoral SC**  
0,3 - 0,6 l/ha in post-emergenza

**Raccomandazioni varietali:**  
Trattamento solo in pre-emergenza con un massimo di 750 g di Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta e Marlen. **(SPe)**

**Dicotiledoni annuali e graminacee** nelle patate da consumazione e da foraggio.

**Condoral SC**  
0,5-0,75 l/ha

Trattamento solo in pre-emergenza con un massimo di 750 g di Condoral e in caso di necessità in post-emergenza su piante di 5 cm di altezza massima con massimo 400 g di Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola e Victoria.

Dicotiledoni annuali (**gallo aparine e cipero**).  
Applicazione sotto foglia possibile.

**Effican SG** 0,5 - 1,1 kg/ha

Trattamento complementare contro gallo aparine e cipero. Trattare unicamente su colture non bagnate. Altezza delle piante da 10 a 20 cm. **(SPe)**

**Graminacee annuali e gramigna** (incluso lolio, panichi ecc.).  
Trattamento sotto foglia contro mono- e dicotiledoni (convolvolo incluso).

**Agil** 1 - 2,5 l/ha

**Condoral SC** 0,5 l/ha  
+ **MCPB LG** 3 l/ha + **Effican SG** 1 kg/ha

Agil contro la gramigna di circa 20 cm di altezza con 1,75-2,5 l/ha. Mescolabile con i nostri fungicidi. Non trattare sulle piante. **(SPe)**

### Strategia fungicida con 8 applicazioni

2 x  
**Proxanil** 2,5 l/ha  
+ **Aviso** 2 kg/ha  
+ **Kickstart** 0,15 l/ha

3 x  
**Kunshi** 0,5 kg/ha  
+ **Bogard** 0,3-0,5 l/ha  
+ **Kickstart** 0,15 l/ha

3 x  
**Ranman Top** 0,5 l/ha  
+ **Aviso** 2 kg/ha

L'aggiunta di Bogard 0,5 l/ha migliora l'efficacia contro l'Alternaria. **(SPe)**

Possibilità di arrestare lo sviluppo delle malattie fogliari (peronospora).

**Proxanil** 2,5 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha

**Cymbal** 0,25 l/ha + **Ranman Top** 0,5 l/ha

Eventualmente ripetere il trattamento dopo 3 giorni. **(SPe)**  
Eventualmente ripetere il trattamento dopo 3 giorni. **(SPe)**

### Anti-germinazione

Patate di consumazione e industriali.

**Fazor**  
5 kg/ha

In condizioni di crescita ideale a partire da 25 mm di Calibro. Per dettagli vedere l'informazione su Fazor a pagina 39. **Efficace su ricacci di patate l'anno seguente.**

### Lotta contro le malattie

La peronospora della patata e l'alternariose.

**Aviso** 2 kg/ha + **Revus** 0,6 l/ha

**Ranman Top**  
0,5 l/ha

+ **Bogard**  
0,5 l/ha

o **Flint**  
250 g/ha

Trattare di seguito tutti i 7-10 giorni. Buonissima efficacia contro l'alternaria. Quantità d'acqua, secondo la massa fogliare.

Buona resistenza alla pioggia e efficacia anti sporulante. **Non mescolare Ranman con Silwet L-77.** **(SPe)**

Patate per la produzione di tuberi da seme.

3 x  
**Aviso** 2 kg/ha  
+ **Revus** 0,6 l/ha

3 x  
**Ranman Top** 0,5 l/ha

Massimo 3 trattamenti. **(SPe)**

### Controllo dei parassiti

Lumache

**Amilon 5** 5-7 kg/ha

Dorifora

**Audienz** 0,05 l/ha

Dorifora

**Coragen** 60 ml/ha

Dorifora [L1 e L2]

**Novodor 3 FC** 3 - 5 l/ha

Contro gli afidi delle foglie vettori del virus

**Spray-Oil 7E** 7 l/ha in 350 l di acqua o **Winsum** 3 % (10-15 l/ha in 500 l di acqua)

**Pirimor** 150 g/ha

Massimo 2 trattamenti per coltura e per anno.  
Insetticida sistemico. Agisce contro tutti gli stadi delle dorifore. Solo con autorizzazione speciale.

Solo contro gli stadi larvali giovani.

1 volta per settimane, da quando il 30 % delle piante sono levate. Mescolabile con i fungicidi L+G. Solamente sotto tunnel o serra.

### Biostimolatori

Trattamento della semente

**Penergetic p campicoltura** 250 g/ha

**Amino Power Plus liquido** 1-2 l/ha

Gestione dello stress

**Penergetic b terreno** 400 g/ha

**Polygrün** 0,5-1 l/ha 2-3 applicazioni

**Terrasan** 1,5-5

**Penergetic p campicoltura** 100 g/ha + **Vital** 1 l/ha ogni 7-10 giorni

Applicazione sui tubercoli nelle seminatrici. Penergetic è mescolabile con prodotti a base di rame.

Aumento della crescita.

dopo il raccolto

**Penergetic b terreno** 400 g/ha **Miscibile con fungicidi.**

### Fertilizzanti fogliari

Carenza in manganese

**MaxMan 400** 1 l/ha

Terreno torboso 2-3 applicazioni. Mescolabile con i nostri fungicidi.

Anti-carenza (Mg, Mn, B, ecc.) e formazione di amido

**Fetrilon-Combi** 1 kg/ha

Mescolabile con fungicidi LG.

Stimolanti della crescita

**Folifert supermix** 4,1 kg/ha o **Final K** 3 l/ha (dopo la chiusura delle file)

Aggiungere ai trattamenti fungicidi per migliorare la crescita. Abbassa il pH delle poltiglia.