

# Cultures maraîchères

Maladies / Ravageurs			DA = Délai d'attente en jours	
<b>Poireau</b>				
Herbicide après la plantation.	<b>Spark</b>	2 kg/ha		Max. 1 traitement par culture. (SPe)
	<b>Lentagran</b>	2 kg/ha	28	A partir du stade 3-feuilles.
Graminées, repousses céréales, chiendent	<b>Agil</b>	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contre chiendent.
Mauvaises herbes et graminées	<b>Pendi</b>	2-4 l/ha		Poireau semé. En prélevée.
Mauvaises herbes et graminées	<b>Pendi</b>	4-5 l/ha		Poireau planté. Avant la plantation.
Cladosporiose, rouille, taches pourpres.	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	21	Max. 3 traitements par année. (SPe)
Alternaria spp. Phytophthora spp.	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	14	Max. 3 traitements par année. (SPe)
Alternarioses, cladosporiose des oignons, phytophthora du poireau, rouille du poireau.	<b>Flint</b>	0,4 kg/ha	14	Max. 2 traitements, au stade 41-49 (BBCH).
Mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillages, teigne du poireau, thrips.	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	Traitements à des intervalle de 7 à 14 jours. Max. 3 traitements avec cette matière active. (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
Teigne du poireau	<b>XenTari</b> 	1 kg/ha	7	
Contre les insectes suceurs	<b>Siltac plus</b> 	0,15 %		La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Teigne du poireau	<b>Audienz</b> 	0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements par culture. (SPe)
Mouches mineuses, thrips	<b>Audienz</b> 	0,4 l/ha	7	Max. 4 traitements par parcelle/année/culture. (SPe)
Pucerons, mouches blanches	<b>Piretro verde</b> 	2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements par culture et année. Traitements à l'intervalle de 7 jours. (SPe)
Amélioration de la croissance	<b>Azofix plus</b> 	1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de l'azote.
Amélioration de la croissance	<b>Fosfix plus</b> 	1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de phosphore.