







Pois de conserve et pois protéagineux

	avant le semis	Pré-levée	Cotylédons - 2 feuilles 10-12	3-4 feuilles 13-14	Apparition boutons floraux 51-59	Formation des gousses 71-79	Notes
Herbicides	Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.						
Dicotylédones annuelles (spéc. gailllets et chénopodes)		Laguna 3 l/ha	Effican SG 0,8 -1,1 kg/ha + Pendi 0,9 l/ha				Application en split possible. (SPe) Utiliser Laguna seulement dans les pois protéagineux. (SPe)
Dicotylédones et graminées annuelles		Caravel 0,25 l/ha					Uniquement pour pois non écosés.
Pré-levée et post-levée. Dicotylédones et graminées (spécialement amarant et morelles noires).		Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Effican SG 1,1 kg/ha				En post-levée miscible avec Effican SG. Dans les pois de conserve utiliser 0,8 l/ha Bolero. (SPe)
Dicotylédones annuelles, rumex, chardons			MCPB LG 4 l/ha				Emploi avant la formation des premiers boutons floraux. Miscible avec Effican SG.
Graminées annuelles, millets, ray-grass, repousses de céréales, chiendents			Agil 1 - 2,5 l/ha				Application dès l'apparition de la première vraie feuille de la culture jusqu'à la formation des boutons floraux. Chiendents 1,75-2,5 l/ha .
Engrais foliaires							
Anthraxnose du pois, mildiou, pourriture grise				Diagonal 1 l/ha			Protéagineux: max. 2 traitements à l'intervalle de 8-12 jours. Délai d'attente: 2 semaines.
Anthraxnose du pois, pourriture grise, sclérotinose				Switch 1 kg/ha			Pois: max. max. 2 traitements à l'intervalle de 10 jours. Délai d'attente: 2 semaines.
Ravageurs							
Limaces			Amilon 5 5-7 kg/ha				Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
Chenilles, Tordeuse du pois			Rapid 1,5 kg/ha				Max. 2 traitements par année. (SPe)
Tordeuse du pois, noctuelles, terricoles			Techno 10 CS 0,075 l/ha				Uniquement pour pois protéagineux. 1 traitement par culture et année. (SPe) . Seulement avec autorisation spéciale.
Pucerons					Pirimor 0,15 kg/ha		Délai d'attente 2 semaines. Ménage les auxiliaires. Emploi dès la floraison jusqu'à la formation des gousses.
					Siltac plus 0,15 % 		Quantité d'eau 500 l/ha. Remarques: seulement par temps sec. Le produit doit sécher rapidement.
			Audienz 0.2 l/ha/ha				Uniquement pour pois non écosés.
			Piretro Verde 2,5 l/ha				Pour pois, délai d'attente: 3 jours.
			XenTari 1 kg/ha				Pour pois non écosés, délai d'attente: 3 jours.
Engrais starter et booster							
Pour des racines fortes dans les pois et le soja					Penergetic p cultures maraichères 100 g/ha 	+ Vital 1 	
							
			 Level 2 0,8 l/ha ou Kickstart 0,15 l/ha 				Miscible avec des herbicides.