


Pommes de terre



Notes

Dés herbage		Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.							
Dans des pommes de terre sous plastique contre adventices annuelles et graminées	Pendi 3 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha								Le mélange Pendi et Condoral SC est aussi possible sur pommes de terre pour la production de plants (SPe)
Adventices annuelles et graminées dans les pommes de terre de consommation et fourragère	Oxidia 4-5 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha + Azofix plus et Fosfix plus 1-2 l/ha chacun								Pré-levée ou post-levée précoce. (SPe)
	Oxidia 2 l/ha + Laguna 2 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha + Azofix plus et Fosfix plus 1-2 l/ha chacun								Utiliser le mélange uniquement en pré-levée. (SPe)
Chénopode blanc dans les pommes de terre de consommation et fourragère. Pommes de terre pour la production de plants	Caravel 0.2-0.25 l/ha								Utiliser le mélange uniquement en pré-levée.
Gaillet, dicotylédones inclus graminées annuelles, millets, chiendent, amarante	Rimuron 40 g/ha + Codacide 2 l/ha								En cas de traitements fractionnés 2 x 20 g/ha + Codacide 1 l/ha. (SPe)
Graminées annuelles et adventices dans les pommes de terre	Condoral SC 0,5-0,75 l/ha	Condoral SC en post-levée 0,3 - 0,6 l/ha							Recommandations variétales: Traitement seulement en pré-émergence avec au maximum 750 ml de Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Félicia, Lady Rosetta et Marlen. (SPe) Traitement seulement en pré-émergence avec au maximum 750 ml de Condoral et en cas de besoin en post-émergence sur des plantes de 5 cm de hauteur au maximum 400 ml de Condoral: Attention aux variétés Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola et Victoria.
Adventices annuelles et graminées dans les pommes de terre de consommation et fourragère	Condoral SC 0,5-0,75 l/ha								Traitement complémentaire des gaillets et souchets. Traiter uniquement sur cultures sèches. Hauteur des plantes 10 à 20 cm. (SPe)
Dicotylédones annuelles (gaillet et souchet) Application sous foliaire possible.		Effican SG 0.5 - 1.1 kg/ha							Agil contre chiendents d'environ 20 cm de hauteur avec 1,75 - 2,5 l/ha. Miscible avec nos fongicides. Uniquement sous foliaire. (SPe)
Graminées annuelles et chiendent (inclus ray-grass, millets etc.) Traitement sous feuillage contre mono et dicot (liserons inclus)		Agil 1 - 2,5 l/ha	Condoral SC 0,5 l/ha + MCPB LG 3 l/ha + Effican SG 1 kg/ha						
Stratégie des fongicides avec 8 applications		2 x Proxanil 2,5 l/ha + Aviso 2 kg/ha + Kickstart 0.15 l/ha		3 x Kunshi 0,5 kg/ha + Bogard 0,3-0,5 l/ha + Kickstart 0.15 l/ha		3 x Ranman Top 0,5 l/ha + Aviso 2 kg/ha			Un ajout de Bogard 0,5 l/ha améliore l'efficacité contre l'alternariose. (SPe)
Traitement de barrage anti-mildiou		Proxanil 2,5 l/ha + Cymbal 0,25 l/ha		Ranman Top 0,5 l/ha + Ranman Top 0,5 l/ha					Eventuellement répéter le traitement après 3 jours. (SPe) Eventuellement répéter le traitement après 3 jours. (SPe)
Anti-germinatif				Fazor 5 kg/ha					En conditions poussantes à partir de 25 mm de calibre. Pour détails voir l'information sur Fazor à la page 65. Efficace sur repousses de pommes de terre l'année suivante.
Lutte contre les maladies									
Le mildiou de la pomme de terre et l'alternariose		Aviso 2 kg/ha + Revus 0,6 l/ha		Ranman Top 0,5 l/ha + Bogard 0,5 l/ha ou Flint 250 g/ha					Traiter ensuite tous les 7-10 jours. Très bonne efficacité contre Alternariose. Quantité d'eau selon la masse foliaire. Très bonne résistance à la pluie et efficacité anti-sporulante. Ne pas mélanger Ranman avec Silwet L-77. (SPe)
Pommes de terre pour la production de plants		3 x Aviso 2 kg/ha + Revus 0,6 l/ha		3 x Ranman Top 0,5 l/ha					Maximum 3 traitements. (SPe) Maximum 3 traitements. (SPe)
Lutte contre les ravageurs									
Limaces		Amilon 5 5-7 kg/ha							
Doryphores				Audienz 0,05 l/ha					Maximum 2 traitements par culture et année.
Doryphores				Coragen 60 ml/ha					Insecticide systémique agit contre tous les stades des doryphores. Œufs + adultes + larves. Seulement avec autorisation spéciale.
Doryphores				Oikos 1.5 l/ha					Max. 3 traitements par parcelle et année. (SPe)
Doryphores [L1 et L2]				Novodor 3 FC 3 - 5 l/ha					Seulement contre les jeunes stades larvaires
Contre les pucerons du feuillage vecteurs de virus		Spray-Oil 7E 7 l/ha dans 350 l de l'eau ou Winsum 2-3 % (10-15 l/ha dans 500 l de l'eau)							1 fois par semaines, dès que 30 % des plantes sont levées. Miscible avec les fongicides L+G.
		Pirimor 150 g/ha							Seulement sous tunnel ou sous serres.
Bio stimulateurs									
Traitement de tubercules		Penergetic p grandes cultures 250 g/ha		Amino Power Plus liquide 1-2 l/ha					Application sur les tubercules dans la planteuse. Penergetic est miscible avec des produits cupriques.
Gestion du stress		Penergetic b sol 400 g/ha Terrasan 1.5-5		Polygrün 0,5-1 l/ha 2-3 applications Penergetic p grandes cultures 100 g/ha + Vital 1 l/ha tous les 7-10 jours					Augmentation de la croissance. après la récolte Penergetic b sol 400 g/ha Miscible aux fongicides.
Engrais foliaires									
Carence en manganèse				Dexa Pro 4 l/ha					Sol tourbeux 2-3 applications. Miscible avec nos fongicides.
Anti-carentiel (Mg, Mn, B, etc.) et formation d'amidon				MaxMan 400 1 l/ha Fetrlon-Combi 1 kg/ha					Miscible avec les fongicides L+G.
Stimulants de croissance				Folifert supermix 4.1 kg/ha ou Final K 3 l/ha (après la fermeture des rangs)					Ajouter au traitements fongicides pour améliorer la croissance: Baisser le ph dans la bouillie.