

GA = Giorni di attesa

Pomodori (Colture sotto protezione)

Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.

Graminacee annuali e gramigna	Agil	1,5-2,5 l/ha	56	7-10 giorni dopo il trapianto. (SPe)
Erbicida in piena terra	Condoral SC	0,5 l/ha		Stadio 2-3 foglie delle malerbe.
Malattia della foglia, septoriosi	Bogard	0,05 %	3	Massimo 3 trattamenti. (SPe)
Oidio	Bogard	0,05 %	3	Massimo 3 trattamenti. (SPe)
Peronospora	+ Ranman Top	0,05 %		
Oidio	Celos	0,1-0,2 %	3	Attenzione alla temperatura.
Oidio	Carbyc	0,5-1 %		Applicare allo stadio BBCH 12-89.
Alternaria, peronospora del pomodoro, (effetto parziale), septoriosi, cancro batterico del pomodoro	Cuproxat liquido	1,3-1,8 %	3	
	Flowbrix	0,45-0,7 %	3	
	Poltiglia bordolese LG	1,3-1,8 %	3	
Alternaria, oidio, peronospora del pomodoro	Diagonal	1 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Botrytis	Prestop	0,5 %		
Fusarium spp., phytophthora, spp., pythium spp., rhizoctonia spp.	Prestop	0,5 %		Inaffiare (sotto serra).
Botrite, sclerotinia	Switch	0,1 %	3	Massimo 2 trattamenti per coltura. (SPe)
Mosca bianca	Audienz	0,4-0,8 l/ha	3	(SPe)
Acari	Acramite	0,25 l/ha	3	(SPe)
Acari	Credo	0,04 %	3	(SPe)
Afidi, mosca bianca	Piretro verde	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti per coltura. Trattare a distanza di minimo 7 giorni. (SPe)
Afidi diversi	Pirimor	0,05 %	7	Rispetta gli ausiliari. (SPe)
Minatrice del pomodoro	Rapid	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Massimo 2 trattamenti. (SPe)
Insetti succhiatori	Siltac plus	0,1 %		La poltiglia polverizzata deve asciugare rapidamente.
Afidi, altiche, mosca minatrice, tripidi	Techno 10 CS	0,01 % 0,1 l/ha	3	Trattamenti a intervalli di 7 - 14 giorni. Massimo 2 trattamenti con questa sostanza attiva (SPe). Solo con autorizzazione speciale.
Mosca bianca	Vista	2 % 20 l/ha	7	Non trattare al di sopra dei 25 °C.
Nottue	XenTari	0,1 %		In caso di infestazione, 2 - 3 trattamenti a intervalli di 7 - 10 giorni.
Insetti utili: contattare il vostro consulente regionale L+G				
Carenza di calcio Botrite sui fiori	Basfoliar Combi STIPP	0,2-0,3 % (2-3 l/ha)		Trattare 3-5 volte se necessario al 0.1 %. Inaffiare 5 l/m ² durante 1 settimana, secondo bisogno.
Carenza di ferro	Fetrilon-Combi ¹	1 kg/ha		Concime fogliare compatibile con le piante.
Bioestimolare organico	Amino Power plus	1-2 l/ha		Miscibile con i fungicidi.
Carenza di magnesio	Olimag	0,4%		Miscibile con i fungicidi.