

			GA = Giorni di attesa	
Finocchio				
Mono e dicotiledoni annuali	Laguna	2 l/ha	70	seminato prima del trapianto/pre-levata (SPe) piantato Subito dopo la semina o il trapianto.
Malerbe e graminacee	Pendi	1,5-2l/ha		
Graminacee annuali	Agil	1 l/ha	28	seminato: in pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. piantato: subito dopo il trapianto.
Mono e dicotiledoni annuali	Caravel	0,25 l/ha	60	
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie	Bogard	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti per parcella e anno, Dall'inizio dell'attacco. (SPe)
Cercospora, ramularia, macchie delle foglie, peronospora delle ombrellifere	Diagonal	0,25 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Peronospora delle ombrellifere	Revus + Quiz	0,6 l/ha 1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, nottue terricole o vermi grigi, mosca minatrice, psilla della carota, mosca de la carota, tripidi	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Solo con autorizzazione speciale. (SPe)
Afidi, tripidi	Siltac plus	0,1 l/ha		Cercare di bagnare bene le piante.
Larve defogliatrici, nottue terricole o vermi grigi, nottue (defogliatrice), mosca minatrice, tripidi.	Audienz	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, mosca bianca	Piretro verde	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
nottue (defogliatrice)	XenTari	1 kg/ha	3	Non applicare in condizioni di freddo. Solo su stadi larvali a digiuno.
Stimolazione della crescita	HBR	1 l/ha		Contro lo stress da freddo.
Carenza di boro	Micro Bor	1-3 l/ha		Ripetere se necessario.
Carenza di calcio e oligo-elementi	Basfoliar Combi	3 l/ha		2 - 3 volte.
Porri				
Erbicida dopo la piantagione	Spark	2 kg/ha		Massimo 1 trattamento per coltura. (SPe)
	Lentagran	2 kg/ha	28	a partire dallo stadio 3 foglie.
Malerbe, ricacci di cereali, gramigna	Agil	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Malerbe e graminacee	Pendi	2-4 l/ha		Porri seminati. In pre-emergenza.
Malerbe e graminacee	Pendi	4-5 l/ha		Porri trapiantati. Prima del trapianto.
Cladosporiosi, ruggine, macchie purpuree	Bogard	0,5 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria spp. Phytophthora spp.	Diagonal	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria, cladosporiosi dei porri, fitoftoria del porro, ruggine dei porri.	Flint	0,4 kg/ha	14	Massio 2 trattamentiallo stadio BBCH 41 - 49.
Mosca minatrice, nottue terricole o vermi grigi, afidi delle foglie, tignola della cipolla, tripidi.	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Trattare a intervalli di 7-14 giorni. Massimo 3 trattamenti con questa materia attiva. (SPe). Solo con autorizzazione speciale.
Tignola della cipolla	XenTari	1 kg/ha	7	
Insetti succhiatori	Siltac plus	0,15 %		La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Tignola della cipolla	Audienz	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura. (SPe)
Mosca minatrice, tripidi	Audienz	0,4 l/ha	7	Massimo 4 trattamenti per parcella/anno/coltura. (SPe)
Afidi, mosca bianca	Piretro verde	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti par colture e anno. Trattare a intervalli di 7 giorni. (SPe)
Migliora la crescita.	Azofix plus	1,5 l/ha		Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Migliora la crescita.	Fosfix plus	1,5 l/ha		Aumenta il fosforo disponibile per le piante.

SPe = Prestazione delle acque (consultare tabella pagina 61 a 67)