

	Prodotti	Dosaggio	Osservazioni
Campi incolti e stoppie			
Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.			
Erbicidi: Maggese, prato, semina diretta	Glifonex TF	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 10 l/ha)
Maggese, prato, semina diretta	Landmaster Supreme 480 TF	3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Dicotiledoni annuali e graminacee Graminacee perenni Malerbe perenni (con convolvolo usare 7,5 l/ha)
Convolvolo, romice, cardo	Dialen	0,5 l/ha	Unicamente in miscela con 5 l/ha Glifonex TF o 4 l/ha Landmaster Supreme 480 TF. Ultima applicazione a fine settembre.
Lino			
Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.			
Erbicidi: Dicotiledoni	Effican SG	1,1 kg/ha	In post-emergenza. Allo stadio 2-4 foglie delle malerbe a partire da 5 cm di altezza delle colture.
Fertilizzante starter	Level 2	0,8 l/ha 	5 cm di altezza delle colture. Miscibile con gli erbicidi.
Nottue terricole o vermi grigi	Techno 10 CS	0,075 l/ha	Solo con autorizzazione speciale.
Prati e pascoli			
Erbicidi: a) Nuova semina	Azofix plus e Fosfix plus	1-2 l/ha 	Mescolabile con gli erbicidi e liquame.
Nuova semina con romice giovane	MCPB LG + Effican SG	2 l/ha 1,1 kg/ha	Nelle nuove semine, prima del primo taglio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche allattanti, 2 settimane per i bovini fuori dal periodo allattante.
Miscela trifoglio-graminacee	MCPB LG + Asulam LG	4 l/ha 1 l/ha	Il trifoglio deve avere due foglie vere. Non utilizzarlo in gemme di trifoglio alessandrino e trifoglio persiana. Periodo di attesa: 3 settimane per bovine allattanti, 2 settimane per gli altri bovini.
Erba medica	Lentagran	1 - 2 kg/ha	In autunno, dopo l'ultima utilizzazione. Periodo di attesa: 3 settimane. 2 settimane per bovini fuori dal periodo di lattazione.
Concime starter	Level 2	0,8 l/ha 	5 cm di altezza della coltura. Mescolabile con gli erbicidi.
b) Trattamento della superficie:			
Romice	Asulam LG + Concime liquido	4 l/ha 4 l/ha	Applicazione in primavera e autunno. Prima delle formazioni delle infiorescenze. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice alpino, felce	Asulam LG + Concime liquido	4 l/ha 4 l/ha	Il concime liquido favorisce l'effetto. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Romice giovane e altri dicotiledoni annuali	MCPB LG	4 - 6 l/ha	Nelle nuove semine, prima del primo sfalcio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche con latte, 2 settimane per le mucche e i bovini fuori periodo di lattazione.
Specie di cardi	Duplosan KV Combi	2,5 - 3,25 l/ha	
c) Trattamento pianta per pianta Romice e malerbe a foglia larga. Ortiche, senecio jacobea.	Blackex	rapporto di miscelazione 1:2	Colorato in rosso. Trattare pianta per pianta. Periodo di attesa: 3 settimane per vacche con latte. 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.
Senecio tossico, veratro comune	Deux 4-D	0,4 - 0,5 %	
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giapponese, cardi vivaci, romici.	Simplex	0,5-2,5 %	Polverizzatore a spalla / apparecchio manuale, fino in agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.
Superfici di compensazione della biodiversità			
Cardi, romici dei tetti, agropiro comune, vilucchio.	Glifonex TF Landmaster Supreme 480 TF	5 - 10 % 5 - 7,5 %	Applicazione con apparecchio manuale senza polverizzatore a spalla.
Arbusti di rovi, senecio tossico, convolvolo del giapponese, cardi vivaci, romici.	Simplex	0,5-2,5 %	Trattamento pianta per pianta fino agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.