

## Radies, Rettich, Meerrettich, Speisekohlrüben

	Radies	Rettich	Merrettich	Speisekohlrüben		WF = Wartezeit in Tagen	
Einj. Unkräuter/Ungräser				●	<b>Caravel</b> 0,25 l/ha		Voraufbau, unmittelbar bis 3 Tage nach der Saat.
Herbizid nach der Saat	●	●			<b>Trax</b> 1 l/ha		Speziell in Sommerkultur im Freiland. (GWS)
Falscher Mehltau, Weisser Rost (Teilw.)	●				<b>Bion</b> 30-60 g/ha	7	Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze				●	<b>Diagonal</b> 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Alternaria-Kohlschwärze Falscher Mehltau, Rost	●	●	●		<b>Diagonal</b> 1 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattfleckenpilze	●	●	●	●	<b>Flowbrix</b> 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Weisser Rost				●	<b>Mildicut</b> 4 l/ha	14	Max. 4 Behandlungen. Ab Beginn des Dickenwachstums.
Falscher Mehltau				●	<b>Revus</b> 0,6 l/ha	14	Max. 2 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) (GWS)
Falscher Mehltau	●	●			<b>Revus</b> 0,6 l/ha	14	Max. 6 Behandlungen im Stadium 12-49 (BBCH) (GWS)
Blattfressende Raupen	●				<b>Audienz</b> 0,2 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen. Anwendung nur Gewächshaus.
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	●	●	<b>Piretro verde</b> 2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlung im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	<b>Pirimor</b> 0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	<b>Siltac plus</b> 0,1-0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Thripse, Minierfliegen, Blattläuse	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b> 0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	<b>Vista</b> 2 %		Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●	●		●	<b>XenTari</b> 1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Schnecken	●	●	●	●	<b>Amilon 5</b> 5-7 kg/ha		Ab Keimblatt streuen.
Maulwürfe, Wühl- oder Schermaus	●	●	●	●	<b>Campa</b> 1-5 Gaspatronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.

## Rhabarber

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einj. Rispengras, Quecke					<b>Agil</b> 0,75 - 2,5 l/ha		2,5 l/ha gegen Quecken. Nach der Ernte.
Einj. Unkräuter/Ungräser					<b>Caravel</b> 0,25 l/ha		Im Frühjahr. Vor dem Austrieb.
Blattflecken					<b>Bogard</b> 0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen					<b>Piretro verde</b> 2,5 l/ha	3	Maximal 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von 7 Tagen (GWS).
Blattläuse					<b>Pirimor</b> 0,5 kg/ha	7	Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdräupen, Minierfliegen, Thripse					<b>Techno 10 CS</b> 0,1 l/ha	14	Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Eulenraupen					<b>XenTari</b> 1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Düngung					<b>Azofix plus</b> 1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Düngung					<b>Fosfix plus</b> 1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors