

Cultures maraîchères

Maladies / Ravageurs						DA = Délai d'attente en jours		
Radis, Radis longs, Raifort, Navets								
	Radis	Radis longs	Raifort	Navets				
Dicotylédones et monocotylédones annuelles				●	Caravel	0,25 l/ha		Prélevée, dans les 3 jours après le semis.
Herbicide après le semis	●	●			Trax	1 l/ha		Spécialement pour culture d'été en plein air. (SPe)
Mildiou, rouille blanche (effet part.)	●				Bion	30-60 g/ha	7	Max. 1 traitement par culture.
maladie des taches noires du chou				●	Diagonal	1 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture.
maladie des taches noires du chou, mildiou, rouille	●	●	●		Diagonal	1 l/ha	14	Max. 2 traitements par culture.
Maladie de feuilles	●	●	●	●	Flowbrix 	2,6 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture.
Rouille blanche			●		Mildicut	4 l/ha	14	Max. 4 traitements, à partir du début de la croissance de la racine.
Mildiou			●		Revus	0,6 l/ha	14	Max. 2 traitements, au stade 12-49 (BBCH) (SPe)
Mildiou	●	●			Revus	0,6 l/ha	14	Max. 6 traitements par an et par parcelle au stade 12-49 (BBCH) (SPe)
Chenilles noctuelles (défoliatrices) noctuelles, terricoles, mouche du chou, thrips	●			●	Audienz	0,2 l/ha	7	Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons, mouches blanches	●	●	●	●	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements par culture et année. Traitement avec un intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons	●	●	●	●	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Max. 2 traitements par culture.
Insectes suceurs	●	●	●	●	Siltac plus 	0,1-0,15 %		La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Pucerons, altises, noctuelles terricoles ou vers gris, thrips, mouches mineuses, pucerons	●	●	●	●	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Traitements à intervalles de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
Pucerons, acarions tétranyques	●	●	●	●	Vista 	2 %	7	Veiller à bien mouiller les plantes.
Noctuelles	●	●		●	XenTari 	1 kg/ha	3	Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaires.
Limaces	●	●	●	●	Amilon 5	5-7 kg/ha		Epandre à partir du stade cotylédons.
Campagnols terrestre, taupes	●	●	●	●	Campa 1-5 cartouches/colonie 			Bien refermer les galeries.