








Rhubarbe

Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.

Monocotylédones annuelles, chiendent.	Agil	0,75 - 2,5 l/ha		2,5 l/ha contre le chiendent. Après la récolte.
Monocotylédones et dicotylédones annuelles	Caravel	0,25 l/ha		Au printemps. Avant le débourrement.
Maladie des feuilles	Bogard	0,5 l/ha	14	Max. 3 traitements par parcelle et année.
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements par parcelle et année. Traitement à l'intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Après la récolte uniquement. Max. 2 traitements avec cette matière active. (SPe)
pucerons du feuillage, altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mouches mineuses, thrips	Techno 10 CS	0,1 l/ha	21	Traitements à des intervalle de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
Noctuelles	XenTari  	1 kg/ha	3	Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire.
Amélioration de la croissance	Azofix plus  	1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de l'azote.
Amélioration de la croissance	Fosfix plus  	1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de phosphore.