

Soja		Prima della semina	Pre-emergenza	Cotiledoni 2 foglie 10-12	3-4 foglie 13-14	Formazione dei boccioli fiorali	Osservazioni	
Erbicidi		<p>Aggiungere Silwet L-77 0,1 l/ha ad ogni applicazione per volumi di poltiglia ridotti a (100-150 l/ha), Migliora la distribuzione del principio attivo.</p>						
Contro le infestanti a foglia larga e le graminacee annuali, compreso il miglio.			Frontier X2 1.2-1.4 l/ha + Caravel 0.25 l/ha					
Pre-emergenza e post-emergenza. malerbe foglia larga (soprattutto amaranto e erba morella).			Bolero 1 l/ha				Trattamenti frazionati 2 x 0,5 l/ha Bolero e 2 x 0,55 kg/ha Efficax SG.	
Malerbe e graminacee annuali a foglia larga (poligoni e altaccamani), cipero .					Bolero 1 l/ha + Efficax SG 0,55-1,16 kg/ha		A complemento del trattamento in pre-emergenza. Malerbe in fase di germinazione fino allo stadio delle 4 foglie. Efficax SG non deve essere utilizzato nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2.	
Graminacee annuali, miglio, loietto, ricacci di cereali, gramigna.					Efficax SG 1.1 kg/ha		Applicazione a partire della prima foglia della coltura fino a quando si formano le prime gemme fiorali. Gramigna 2-2,5 l/ha.	
Parassiti								
	Lumache				Amilon 5 5 - 7 kg/ha		Non utilizzare più di 700 g di sostanza metaldeide attiva per ettaro sullo stesso appezzamento entro un anno.	
	Nottue				Techno 10 CS 0,075 l/ha		Massimo 1 trattamento per coltura e anno. Solo con autorizzazione speciale. (SPe).	
Detterenza					Penergetic b VV 0.7 kg/ha 		Riduce i danni ai pascoli e alle colture causati dagli animali selvatici.	
					Penergetic b WV 0.6 kg/ha 			