

WF = Wartezeit in Tagen

Spargeln

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	1 - 2,5 l/ha		Nach der Stechperiode.
Einj. Unkräuter / Ungräser	Caravel	0,25 l/ha		Ertragsanlage: Nach der Stechperiode. Vor dem Durchstossen der Kultur.
Einj. Unkräuter / Ungräser	Caravel	0,25 l/ha		Junganlage: Im Pflanzjahr. Vor dem Durchstossen.
Herbizid in Junganlagen	Condoral SC	0,75 l/ha		Vor und nach der Ernte. (GWS)
Breitblättrige Unkräuter	Lentagran	2 kg/ha		Nach der Stechperiode.
Blattschwärze, Rostpilze	Bogard	0,5 l/ha		Im Sommer. Max. 4 Behandlungen pro Jahr.
Blattschwärze, Spargelrost	Diagonal	1 l/ha		In Junganlagen oder in Ertragsanlagen nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Graufäule	Switch	1 kg/ha		Nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Spargelhähnchen, Spargelkäfer	Audienz	0,2 l/ha		Nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha		Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen.
Blattläuse (Röhrenläuse), Spargelkäfer, Erdräupen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha		Nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. Nur mit Sonderbewilligung.
Minierfliegen	Techno 10 CS	0,1 l/ha		Nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Eulenraupen	XenTari  	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Schnecken	Amilon 5	5-7 kg/ha		Ab Beginn Durchstossen streuen.

Spinat

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	1-2,5 l/ha	21	
Nachauflauf	Betam LG	2x1 l/ha Split	21	Im Keimblattstadium der Unkräuter. Nicht bei extremer Witterung behandeln.
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Caravel	0,15 l/ha		Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat.
Herbizid vor dem Auflaufen	Goltix 700 SC + Spark	1 l/ha 0,8 kg/ha		Frühjahr- und Sommerspinat. (GWS)
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Spark	1,5-2 kg/ha		In sehr humosen Böden höhere Dosierung. (GWS)
Falscher Mehltau, Papierfleckenkrankheit	Bion	30 g/ha	7	
Falscher Mehltau	Revus	0,6 l/ha	7	(Freiland) 2 Behandlungen.
			7	(Gewächshaus) 1 Behandlung.
Erdräupen, Eulenraupen	Audienz 	0,2-0,4 l/ha	7	Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Minierfliegen, Rübenfliege	Audienz 	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	Piretro verde 	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. (GWS)
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Erdföhe	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdräupen, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.
Eulenraupen	XenTari  	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Blattvergilbung	Fetrilon-Combi 1	1 kg/ha		Ab 4-6-Blatt-Stadium. Speziell später Frühlings- und Herbstspinat.
Wachstumsförderung	Flüssigdünger LG	5 l/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Wachstumsförderung	Kickstart 	0,15 l/ha		zur Startförderung.