






Tabac	avant la plantation	plantation	2 - 5 feuilles 12-15	dès le stade 6 feuilles 16	Note
	Herbicides	Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.			
Dicotylédones			Lentagran 1 kg/ha		2 - 4 semaines après la plantation.
Mono et dicotylédones annuelles		Galipan 2 l/ha			Avant ou immédiatement après la plantation.
Maladies			Ranman Top 0,5 l/ha		Maximum 3 traitements par année.
Mildiou (mildiou du tabac)			Revus 0,5 l/ha		Maximum 2 traitements par année.
Ravageurs					
Limaces			Amlon 5 5-7 kg/ha		Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
Chenilles			XenTari 1 kg/ha 		
Noctuelles			Techno 10 CS 0.075 %		
Effarouchement			Penergetic b VV 0.7 kg/ha  		Seulement avec autorisation spéciale. (SPe)
			Penergetic b WV 0.6 kg/ha  		
					Réduit les dommages causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.