

Maladies / Ravageurs		DA = Délai d'attente en jours	
Tomates			
Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.			
Graminées annuelles et chiendent.	Agil	1,5-2,5 l/ha	56 7-10 jours après la plantation. (SPe)
Herbicide en plein air.	Condoral SC	0,5 l/ha	Stade des graminées 2-3 feuilles.
Alternariose, oïdium, septoriose.	Bogard	0,05 %	Max. 3 traitements. (SPe)
En plus mildiou de la tomate.	Bogard + Ranman Top	0,05 % 0,05 %	3 Max. 3 traitements. (SPe)
Oïdium	Celos	0,1-0,2 %	3 Attention aux températures.
Oïdium	Carbyc	0,5-1 %	1 Application au stade BBCH 12-89.
Alternariose, mildiou de la tomate (effet partiel), moucheture bactérienne, chancre bactérien de la tomate	Cuproxat flüssig	1,3-1,8 %	3
	Flowbrix	0,45-0,7 %	3
	Kupfer Bordo LG	1,3-1,8 %	3
Alternariose, oïdium, mildiou de la tomate	Diagonal	1 l/ha	3 Max. 3 traitements par culture.
Botrytis cinerea, sclérotiniose (serre)	Pyrus 400 SC	0,125 %	3 Max. 3 traitements par culture.
Botrytis cinerea	Prestop	0,5 %	Max. 4 traitements par culture et année.
Fusarium spp., phytophthora, spp., pythium spp., rhizoctonia spp.	Prestop	0,5 %	Arroser. (sous serre).
Botrytis cinerea, sclérotiniose	Switch	0,1 %	3 Max. 2 traitements par culture. (SPe)
Mouches mineuses	Audienz	0,4-0,8 l/ha	3 (SPe)
Noctuelles terricoles ou vers gris, noctuelles, thrips	Audienz	0,03-0,04% 0,3-0,4 l/ha	3 (SPe)
Mineuse de la tomate	Audienz	0,03% 0,3 l/ha	3 Max. 2 traitements par culture et année. (SPe)
Acariens tétranyques	Acramite	0,25 l/ha	3 Applicable jusqu'au 11.07.2025. (SPe)
Acariens tétranyques	Credo	0,04 %	3 (SPe)
Pucerons, mouches blanches	Oikos	0,15 %	3 En cas d'infestation, 2-3 applications à l'intervalle de 7-10 jours.
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde	2,5 l/ha	3 Max. 4 traitements par culture et année.
Insectes suceurs	Pirimor	0,05 %	7 Ménage les auxiliaires. (SPe)
Pucerons, altises, mouches mineuses, thrips	Rapid	0,15 % 1,5 kg/ha	3 Max. 2 traitements. (SPe)
Mouches blanches	Siltac plus		La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Noctuelles	Techno 10 CS	0,01 % 0,1 l/ha	3 Traitements avec des intervalle de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active. (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
	Vista	2 % 20 l/ha	7 Température ne dépassant pas 25 °C pendant le traitement.
Carence en calcium pourriture de floraison	XenTari	0,1 %	En cas d'infestation, 2-3 traitements à des intervalles de 7 à 10 jours.
Insectes auxiliaires, voir plan d'introduction page 43 ou contacter le conseiller L+G régional.			
Carence en calcium pourriture apicale de la tomate	Basfoliar Combi STIPP	0,2-0,3 % (2-3 l/ha)	3-5 pulvérisations nécessaires ou 0,1 % arroser 5 l/m ² 2 fois pendant 1 semaine, selon le besoin.
contre les carences	Fetrilon-Combi 1	1 kg/ha	Engrais foliaire compatible avec les plantes.
Gestion du stress	Aminopower plus	1-2 l/ha	Miscible avec fongicides.