



## Fungizide

Wirkungsspektrum	Kulturen	Produkt	Hinweise
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	
		Buchsbäume (Buxus)	
		Rosen	
		Zier- und Sportrasen	
		Zierkürbisse	
Blattfleckenpilze Echte Mehltaupilze Falscher Mehltau Rostpilze Sternrusstau Botrytis cinerea	● ● ● ●	● <b>Flint</b> 0,05 %	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Echter Mehltau Helminthosporium Rasenanthrachnose Rhynchosporium Rost Rotfadenkrankheit Sommerflecken Talerfleckenkrankheit	● ● ● ●	● <b>Flint</b> 0,8 kg/ha	
Gummistengelkrankheit Echter Mehltau	● ● ● ●	● <b>Flint</b> 0,5 kg/ha	
Blattfleckenpilze Falscher Mehltau Schrotschuss Knospensterben	● ● ● ●	● <b>Flowbrix</b>  0,2-1 % ● <b>Flowbrix</b>  0,2-0,6 %	Nur Kirschlorbeer Nur Rhododendron
Knospensterben Rindenbrandkrankheit	● ● ● ●	● <b>Flowbrix</b>  2 % ● <b>Flowbrix</b>  0,2 %	
Echte Mehltaupilze	● ● ● ●	● <b>Nimrod</b> 0,1 %	
Ohrläppchenkrankheit Blattfleckenpilze Falsche Mehltaupilze Rostpilze Sternrusstau	● ● ● ●	● <b>Legan WG</b> 0,05 %	Nur Azaleen. (GWS) (GWS) (GWS) (GWS)
Krankheit durch pathogene Bodenpilze Botrytis cinerea	● ● ● ●	● <b>Prestop</b>   0,5 %	Im Gewächshaus. Anwendung: Stadium 13-65 (BBCH). Im Gewächshaus. Nach dem Pflanzen.
Krankheit durch pathogene Bodenpilze	● ● ● ●	● <b>Prestop</b>   0,5 kg/m <sup>3</sup>	
Echter Mehltau Falscher Mehltau	● ● ● ●	● <b>Quiz</b>   0,1-0,3 %	
Botrytis cinerea	● ● ● ●	● <b>Switch</b> 0,1-0,12 %	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. (GWS)
Cylindrocladium-Trieb- und Blattsterben	● ● ● ●	● <b>Switch</b> 0,1 %	Maximal 4 Behandlungen. Anwendung: Ab Mitte April bis Oktober. (GWS)
Schneeschnitz	● ● ● ●	● <b>Switch</b> 1,5 kg/ha	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.