









Zwetschgen / Pflaumen

															
BBCH-Stadien	51-52 Knospenschwellen	53-54 Mausohr	57 Rotknospen	59 Ballonstadium	60-65 Blüte	67-69 Abgehende Blüte	72 Haselnuss	73-74 T-Stadium	77 Fruchtwachstum	81 Beginn Fruchtreife	85 Fruchtreife	87-89 Erntereife	93 Laubfall		
Krankheiten			Captan 80 WDG 0,15 % 2,4 kg/ha												
Schrotschuss			Celos 0,75 % 12 kg/ha 				Celos 0,3 - 0,5 % 4,8 - 8 kg/ha  								
			Flint 0,025 % 0,4 kg/ha												
			Flowbrix 0,25 - 0,4 % 4 - 6,4 kg/ha 												
Narrenkrankheit			Flowbrix 0,25 - 0,4 % 4 - 6,4 kg/ha 												
			Legan WG 0,05 % 0,8 kg/ha												
Blüten- und Zweigdürre			Switch 0,06 % 1 kg/ha nicht bei Frostgefahr												
			Flint 0,025 % 0,4 kg/ha max. 3 Anwendungen pro Kultur und Jahr												
Fruchtmonilia			Bogard 0,02 % 0,32 l/ha (nur in Kombination mit Legan WG)												
			Switch 0,06 % 1 kg/ha nicht bei Frostgefahr												
Rost			Legan WG 0,05 % 0,8 kg/ha												
			Flint 0,025 % 0,4 kg/ha max. 3 Anwendungen pro Kultur und Jahr												
Schädlinge															
Austerschildläuse Frostspanner Gallmilben Napfschildläuse Rote Spinne															
Rote Spinne															
Rostmilben															
Spinnmilben															
Gespinnstmotten Frostspanner															
Blattläuse															
Pflaumenwickler															
Kirschessigfliegen												 0,02 % 0,32 l/ha (Notfallzulassung) (Falle + Lockstoff)			
Biostimulator															
Bodenbehandlung	 												 		
Blattapplikation															
															
Dünger															
Fruchtqualität															
Bor															
Wuchsförderung												<i>Bildquellen: Agroscope Schweiz</i>			

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst / Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge